101518

ПРОВЕРЕНО
1948 г.

ПРОВЕРЕНО
1958 г.

616.957.2 + 616.97-002

1025

Из госпитальной терапевтической клиники Томского У-та.
(Врем. зав. проф. И. М. Левашев).

Сифилитический медиастинит.

(Гиперплазия лимфатических медиастинальных желез на почвѣ сифилиса*).

М. П. Бенъко,
ординатор клиники.

Марія П. 48 лѣт, прачка, проживающая в г. Хабаровскѣ, поступила в клинику 16 декабря 1916 г. с жалобами на боль в груди, кашель, удушье, одышку, боли в ногах по ночам и постепенно нарастающую слабость. Больной она считает себя уже 4 года, когда она сильно простудилась во время стирки, слегла в постель и провела в ней 2 недѣли; болѣзнь началась знобом, колотьем в боку, был сильный жар, кровянистая мокрота и кашель.

Послѣ перенесенной болѣзни она уже не считала себя здоровой, боль в груди, кашель наблюдаются и в настоящее время, постепенно больная слабѣла, появилась одышка, бессонница и боли в костях по ночам; одышка иногда носила характер удушья при значительном физическом напряженіи. Из болѣзней, бывших у больной до настоящаго заболѣванія, слѣдует отмѣтить бывшую 30 лѣт тому назад гнойную рану на лѣвой ногѣ, длящуюся продолжительное время. Менструальная функція у больной установилась с 15-ти лѣт, была всегда правильна и нормальна. 17-ти лѣт она выходит замуж и от этого брака имѣет 6 дѣтей, из которых двое живы до настоящаго времени, а 4 умерло в младенческом возрастѣ. 43-х лѣт, послѣ смерти мужа, наша боль-

*) Доклад в научной конференціи врачей госпитальной клиники 10 февр. 1917 г.

ная выходит замуж второй раз и имѣет еще двоих дѣтей, но скоро послѣ рожденія умерших по причинѣ ей неизвѣстной. Двое дѣтей, оставшихся жить, вполнѣ здоровые и трудоспособные люди, равно как и второй муж. Родители ея умерли в преклонном возрастѣ; о состояніи здоровья перваго мужа большая затрудняется что-либо сказать („как будто был здоров всегда“).

Status praesens. Высокаго роста, правильнаго сложения и питанія.

Кожа и слизистыя оболочки блѣдны, кожа в области *sternum* рѣзко пигментирована, такая же пигментация кожи на лѣвой ногѣ (в области голени—слѣд бывшей раны).

На кожѣ груди видна расширенная сѣть венозных сосудов, особенно справа. Кожа живота очень дрябла, отвисла, легко приподымается, на ней видны рубцы беременности. На кожѣ лѣвой руки *leucoderma*. Костяк нормален, за исключеніем обѣих *tibiae*, на которых имѣются періоститы. Лимфатическія железы увеличены и прощупываются подчелюстные, шейныя, подмышечныя и паховыя; подчелюстные достигают величины голубиного яйца. Грудная клѣтка нѣсколько расширена эмфизематозно, плечи приподняты, правая подключичная ямка глубже лѣвой. При дыхательных экскурсіях правая сторона рѣзко отстает от лѣвой. Область *sternum* выпячена особенно на *manubrium*.

При форсированном дыханіи слышен свистящій оттѣнок его. При перкуссии груди имѣется притупленіе справа, начиная со 2-го ребра (в разстояніи 3-х пальцев от *sternum*) доходящее до 5-го ребра и переходящее в тупость *sternum*. Очень незначительное измѣненіе перкуторнаго звука имѣется и в правой верхушкѣ и сзади по всей поверхности легкаго сравнительно с лѣвой стороной, напоминая тимпаническій тон. Аускультация в области рѣзкаго притупленія дает ослабленіе дыхательных шумов и

голосового дрожанія. Над этой тупостью слышен выдох и бронхиальное дыханіе, тоже и сзади в соответствующей области. При освѣщеніи Рентгеном в полосѣ притупленія имѣется тѣнь, которая не смѣщается при дыхательных экскурсіях легкаго. Лѣвое легкое нормально. Сердце отѣснено вниз, верхняя его граница опредѣляется с нижняго края 5-го ребра, правая переходит в тупость sternum и с нею сливается, толчок в 6 ом межреберьѣ ближе к sternum; тоны глуховаты, на аортѣ особенно хорошо прослушиваются—яены и чисты; пульс правой руки отстает от лѣвой, что особенно замѣтно при поднятіи рук вверх. Печень перкуторно опредѣляется с 6 го ребра, при пальпаціи на 1½ палеца она выходит из под края ребер. Селезенка не прощупывается. У больной есть кашель и мокрота, которая выдѣляется по временам послѣ приступа кашля, характер ея слизисто гнойный. Кашель душій или свистяцій. Мокрота содержит гнойные элементы, слизь, отдѣльные эластическія волокноца в ничтожном количествѣ, тѣ бацилл в ней нѣт. Моча кислой реакціи, ни бѣлка, ни сахара не содержит, в осадкѣ оксалаты. Кровь: Нб—60% эр. 4000000, л. 13750; нейтр. 52%, эозин. 3%, лимф. 40 и переходных ф. 5. Реакція Wasserman'a на кровь дала++++.

В теченіе болѣзни за время пребыванія нашей больной в клиникѣ под вліяніем специфическаго леченія, как то: ртутных инъекцій и приѣмов іодистаго калия замѣчено рѣзкое улучшеніе. Боли в труди, одышка, отѣнок стенотического дыханія совершенно исчезли, мокрота сначала увеличилась в количествѣ, но потом ея стало все меньше и меньше, уменьшился и кашель; припадков удушья не наблюдалось.

Измѣнилась кровь больной: Нб—65%, эр. 4765000 л. 9000, а потом и 7187; нейтр. 6 2%, эоз. 1,5, перех. 5,0, лимф. 31,5. При освѣщеніи Рентгеном

тънь, получаемая на том же мѣстѣ, стала свѣтлѣе и на ней ясно можно было различить отдѣльныя железки; рѣзко уменьшились подчелюстные и паховыя железы, а подмышечныя уже не прощупывались.

Перкуторно область притупления значительно уменьшилась. Температура за все время пребыванія больной в клиникѣ была нормальна, за исключеніем двух-трех дней, когда у ней наблюдалась ангина. Неоднократныя изслѣдованія мокроты на туберкулез с антиформинном, по способу Mich'a не дали положительнаго результата.

Переходим к разбору нашего случая. Если сопоставить всѣ симптомы, полученные при объективном изслѣдованіи, то, повидимому их можно уложить в картину медиастинита. Литературныя данныя по этому вопросу свидѣтельствуют о крайней недостаточности литературы как в количественном, так и в качественном отношеніи.

Причина заключается в том, что всѣ пораженія средостѣнія часто не дают почти никаких явленій при жизни и узнаются только на вскрытіи, в других случаях их клиническая картина страдает отсутствіем патолого-анатомических данных. Относительно пораженія сифилисом лимфатических медиастинальных желез мнѣ удалось найти описанными 8 случаев; их клиническая картина весьма различна в зависимости от локализаціи процесса. В случаях рѣзко выраженных всегда имѣется притупленіе в области или вблизи sternum, застойныя явленія в видѣ отеков, синюхи, венных пульсацій—как слѣдствіе сдавленія v. сава superior, явленіями давленія бронха, трахеи в видѣ стенотического дыханія, бронхоэктази, боли в груди, одышки, парез или паралич голосовых связок—как слѣдствіе давленія n. recurrentis, давленіе пищевода, пучеглазіе, мозговья явленія, прижатіе ар. subclavia или анопума, что сказывается разницей пульса обѣих рук. К таким выраженным случаям медиа-

стинита относятся случаи Шаповаленко, Соколовскаго, Мамонова, Чумакова,—анатомически выражаясь гиперплазіей медиастиальных, паховых и других желез. Последний случай желез при наличности увеличенія подключичных анатомически выразился в разращеніи фиброзной соединительной ткани, среди пучков которой были увеличенныя железы туберкулезнаго характера; клинически он протекал при явленіях раздраженія мозговой коры. Но есть случаи, напримѣр Rüstera, когда діагноз сифилитическаго медиастинита был поставлен на основаніи одной только боли в области грудины без всяких других разстройств, данный случай был вызван гуммой средостѣнія.

Lazagus иллюстрирует картину медиастинита, вызванную сифилитической опухолью *mediastinum* с большим пакетом гиперплазированных желез непосредственно сзади *sternum*, выражающейся одышкой вслѣдствіе сдавленія трахей и параличем лѣвой голосовой связки вслѣдствіе сдавленія п. *recurrentis*.

Интересен случай Schava, дающій также картину сифилитических гиперплазированных желез, из которых одна проросла в бронх и послужила причиной бронхоэктазіи. Приведенные случаи, мнѣ кажется, достаточно иллюстрируют всю разнообразную картину медиастинита.

В нашем случаѣ имѣется ограниченное притупленіе справа и в области грудины, притупленіе это соотвѣтствует мѣстоположенію тѣни, которую мы получили при освѣщеніи лучами Рентгена и на которой можно различить отдѣльныя железки. Железы эти находятся в *mediastinum* между *v. cava superior* и трахеей, на которую и производят давленіе,—этим объясняется затрудненіе вдоха и особый дыхательный шум в области 2-го ребра под ключицей, напоминающій шум *Williams'a*. Онѣ сдавливают и *v. cava superior*, слѣдствіем чего является коллатеральное кровообращеніе путем расширенія

и развитія подкожных вен. Такой случай сдавливанія *v. cava sup.* приводит Вагнер в своей статьѣ о непроходимости ея, сопровождающійся расширеніем кожных вен на груди и обусловленный исключително прижатіем *v. cava sup.*, что подтвердилось аутопсіей. Кромѣ прижатія трахеи и *v. cava sup.* мы имѣем еще сдавленіе *art. аnonyma* правой и этим объясняется несоотвѣтствіе пульса правой и лѣвой рук, что особенно замѣтно при поднятіи их вверх; несоотвѣтствіе пульса, вызванное прижатіем *анонума* было в случаѣ Шеноваленко и объяснено им аналогично.

Боль в груди и одышка, наблюдаемая у нашей больной, также были объяснены в случаѣ *Lazarus'a*, приведенном выше, давленіем на нервы и трахею. Одышка, по мнѣнію *Hoffman'a*, может зависѣть во первых от сдавленія трахеи и бронхов, во вторых—от сдавленія сердца и легких, в третьих—от застоя крови, и в четвертых—от паралича нервов, расширяющих голосовую щель или от раздраженія суживающих ее. В нашем случаѣ одышка зависит от первой и отчасти от третьей причины.

Delafoi говорит, что гиперплазированные железы давят на *n. vagi* и вызывают одышку и приводит случаем астма, вызванный сдавленіем *vagus'a* сросшимися с ним гиперплазированными железами. Бронхіальной аденопатіей, вызывающей сдавленіе *n. vagi* объясняет он и кашель. Если допустить, что в *mediastinum* у нас имѣется пакет гиперплазированных желез, оказывающих давленіе на сосѣдніе органы и вспомнить, что у нас процунываются еще паховыя, подключичныя и подмышечныя железы,—то можно предположить гиперплазію и бронхіальных желез, по крайней мѣрѣ праваго бронха, котораго его сдавливают. Тогда будет понятен особый оттѣнок кашля и наличность гнойной мокроты,—как слѣдствіе бронхоэктази на почвѣ сдавливанія бронха; возможно даже, что одна из таких желез про-

росла в бронх и вызвала его эктазию, как было в случаѣ Schav'a. Существованіе таких гиперплазированных желез по ходу бронхов объясняет и наличность бронхіальнаго дыханія, как слѣдствіе сдавленія легкаго и измѣненіе звука на почвѣ венозной гипереміи,—как слѣдствіе сдавленія венозных стволон легочныхъ сосудов; за первое предположеніе как будто говорит и Рентгеновскій снимок, на котором видны, кромѣ указанной тѣни, еще отдѣльныя железки, разбросанныя справа и слѣва sternum. Тимпаническій оттѣнок перкуторнаго звука праваго легкаго можно объяснить еще иначе—а именно: наличностью плевритическихъ сращеній, если вспомнить из анамнеза, что наша больная 4 года тому назад перенесла плеврит, или плевропнеймонію, возможно что и смѣщеніе сердца вправо и вниз объясняется сращеніями плевры с перикардом. При наличности гиперплазированныхъ желез между v. cava superior и аортой станетъ понятна усиленная проводимость сердечныхъ тонов на аорту во 2-омъ межреберномъ промежуткѣ, что мы имѣемъ в нашемъ случаѣ.

Нашъ случай отчасти напоминаетъ описанный в литературѣ проф. Малковымъ, относящійся къ гиперплазированнымъ медиастиальнымъ железамъ и гуммѣ при наличности подключичныхъ, шейныхъ, ваховыхъ и железъ грудной полости. Онъ сопровождался притупленіемъ в области sternum, вправо и слѣва от нея, сзади справа в межлопаточномъ пространствѣ и спереди слѣва в области 2-го ребра; наблюдалось удушье временами, креститирующіе хрипы в легкихъ, гнойная мокрота, шум тренія плевры, венозная сѣть на груди. Малковъ объясняетъ все эти явленія давленіемъ гуммы и железъ на v. cava superior, что вызвало разстройство кровообращенія в легкомъ, наличностью железъ грудной полости объяснялись отдѣльныя фокусы притупленія. Гольпернъ описалъ случай злокачественной опухоли средостѣнія, исходящей изъ

бронхіальных желез, находящихся под sternum и вправо от нея, давящих на v. cava superior, что сказалось в легкой отечности, синюхѣ и кожной венозной сѣти, давящей на art. subclavia sinistra, что выразилось отставаніем лѣваго пульса. Притупленіе над и под ключицей и вправо от sternum, бронхіальное дыханіе и мелкіе хрипы под ключицей — объяснялись наличием метастазов в надключичныя железы и в верхнюю долю праваго легкаго. Итак, на основаніи приведенных мною случаев, клинической картины и Рентгеновскаго снимка я думаю можно заключить, что мы имѣем дѣло с луэтическим поражением лимфатических желез, расположенных в mediastinum, сдавливающих v. cava superior, art. aponyma и трахею, а также гиперплазироваанныя железы и в грудной полости, что сказалось сдавленіем легкаго и измѣненіем дыхательных шумов и перкуторнаго звука, и желез по ходу праваго бронха, чѣм обусловились бронхоэктазия и особый отгѣнок капли. За луэтическую природу даннаго заболѣванія говорят три плюса реакціи Вассермана, наличие періоститов, лейкодермы, dolores osteoscori posturni, ясно выраженное малокровіе и лейкоцитоз, который, как и остальные явленія, значительно улучшился под влияніем специфическаго леченія.

Можно было бы предположить такое увеличеніе желез на почвѣ лейкеміи, но против нея говорит отсутствіе увеличенія селезенки и изслѣдование крови. Против туберкулеза желез говорит отсутствіе исхуданія, ночных потов, колебаній температуры, измѣненій соответствующих в легких, отсутствіе нахождения туберкулезных бацилл. Возможно предположить в данном случаѣ гумму средоствѣнія, аневризму аорты или злокачественное новообразованіе. Против аневризмы говорит отсутствіе пульсаціи, шума, выпячиванія sternum и соответствующаго ему притупленія. Против новообразованія длитель-

ность течения, отсутствие кахексии, отсутствие повышения температуры по мнѣнію Hoffmann'a и успѣшность от специфическаго леченія.

Наличность гуммы кромѣ гиперплазіи желез можно и допустить, хотя явленія сдавливанія и прижатія были-бы выражены сильнѣе. В виду Рентгеновскаго снимка, наличности и других увеличенных желез, клинической картины, мнѣ кажется что мы имѣем дѣло с гиперплазіей лимфатических желез медиастинальных и бронхіальных на почвѣ сифилиса.

Литература. Малков. Больничная газета Боткина 1900. Чумаков. Медич. Обзор. т. XI. 1914 г. № 15. Мамонов. Сифил. забол. груд. клѣтки. — Русскій журнал кожных и венер. болѣз. т. X 1908 г. Шеповаленко. Русск. врач 1904 г. № 40. Вагнер. Русск. врач 1914 г. №№ 2, 3, 4, 5—о венер. верхней полов. вены. Гольперн. Медич. Обзор. 1900 LIII. Schay Transactions of the Pathol. Society of London vol. XVII. ст. 152 1866 г. Lazarus. Deut. med. Wochenschr. 1893 № 18 с 427. Frid. Hoffmann. Erkrankungen des Mediastinum Spec. Pathologie und Therapie, herausgegeben von pr. Nothnagel XIII Bd. III Theil II abtheilung Wien 1896 г. Küster Zür Behandlung der Geschwülste des Sternums und des forden Mediast. Berl. Klin. Wochenschr 1883, № 9 ст. 127. Соколовскій. Болѣзни органов дыханія. 1913 г. III. Delafoi. Патология и терапия внут. болѣз.

Отд. оттиск из „Сиб. Врача“ №№ 33—34, 1917 г.

Томск. Губернская Типографія.