

Animadversiones systematicae

ex Herbario

UNIVERSITATIS TOMSKENSIS.

Editio Sectionis Tomskensis Societatis Botanicae Rossicae.

Систематические заметки

по материалам

ГЕРБАРИЯ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

Издание Томского Отделения Русского Ботанического Общества.

№ 1.

Апрель 1927 г.

№ 1.

П. КРЫЛОВ и Б. ШИШКИН.

Новый вид *Typha* L

*Typha Veresczagini**) Kryl. et Schischk. sp. n. Rhizoma repens superne ascendens, stolones longos subterraneos emittens. Caulis erectus, 70—115 cm altus, basi 6—8 mm. crassus. Folia alterna in toto caule aequaliter disposita, anguste linearia crassiuscula leviter canaliculata, superne subplana, 40—60 cm. longa 2—4 mm. lata. Spicae anguste-cylindricae, inter se ad 1,5—5 cm. remotae; masculina 9—13 cm. longa et 2,5—3,5 mm. lata, flores masculi nudi 1—6-andri, filamentibus ad apicem usque plerumque connatis, antherae 1,2—1,3 mm. longae, filamentibus subaequilongae vel parum breviores. Spica feminea 3,5—6 cm. longa et 5—8 mm. crassa, flores ebracteolati, pistillum circa 1,5 mm. longum, ovario sessili vel subsessili et stigmatе anguste-elliptico vel lineari-spathulato stylo aequilongo; pili, pistillum cingentes, eum subduplo breviores.

Species nostra floribus minoribus (ca 1,5 mm. long.), ovario subsessili nec in gynophoro plus minus longo insidente, spicis femineis anguste-cylindricis et aliis notis a *Typha Laxmanni* Lepech. et alteris speciebus affinibus diversa est.

*) Nomen in honorem amicissimi Victoris Veresczagini, Florae Altaicae exploratoris diligentissimi, datum.

Habitat in paludibus circa lacus stepposos „Saimisce“ vocatur, in deserto Barabensi (Provinciae Tomsk) inter pag. Kasatkul et urb. Tatarsk (2/vi 1910 fl. legit P. Krylov), prope pag. Koshurla (14/vii fl. leg. O. Smirnov), inter pag. Raskasova et Astradym (27/vi fl. leg. L. Utkin).

Корневище ползучее, в верхней части восходящее, дающее длинные стелящиеся подземные побеги. Стебель прямостоячий 70—115 см. выс. и при основании 6—8 мм. толщ. Листья очередные, довольно равномерно расположенные по всему стеблю, серовато-зеленые, толстоватые, узко-линейные, 40—60 см. дл. и 2—4 мм. шир., полого желобчатые, в верхней части плосковатые, при основании переходящие в длинные расколотое влагалище. Соцветия узко-цилиндрические, отставленные одно от другого на 1,5—5 см.; мужское более длинное—9—13 см. дл., женское—3,5—6 см. дл. и 5—8 мм. шир. Мужские цветы состоят из 1 свободной или нескольких (2—6) тычинок, более или менее высоко, обыкновенно до самых пыльников, сросшихся своими нитями. Пыльники 1,2—1,3 мм. дл., почти одинаковой длины с нитью или немного ее короче. Женские цветы без прицветника, состоящие из пестика около 1,5 мм. дл., с сидячей или почти сидячей завязью и столбиком почти равным продолговато-эллиптическому или линейно-лопатчатому рыльцу; пестик окружен многочисленными волосками, равными его половине или немного превышающим ее.

От *Turpha Laxmanni* Lepesch. и др. близких видов *T. Veresczagini* отличается более мелкими цветами (около 1,5 мм. дл.), почти сидячей завязью, не имеющей заметной ножки, узко-цилиндрическим женским соцветием и нек. др. признаками.

Растет на болотах, так назыв. займищах, окружающих степные озера в Барабинской степи в пределах бывш. Каинского у. Томской губ.—между д. Казаткулем и Татарском, около д. Кожурлы и между д.д. Рассказовой и Астрадымом. Цв. во втор. полов. июня и первой полов. июля.

