НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО БОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Проблемы изучения растительного покрова Сибири

Труды VII Международной научной конференции,
посвященной 135-летию Гербария им. П.Н. Крылова
Томского государственного университета
и 170-летию со дня рождения П.Н. Крылова

(Томск, 28–30 сентября 2020 г.)

Томск
Издательство ТГУ
2020

Закономерности сопряженности развития *Rhopalosiphum padi* (L.) (Hemiptera, Sternorrhyncha, Aphididae) с первичными и вторичными растениями-хозяевами

Е.С. Гандрабур, А.Б. Верещагина

Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений, Санкт-Петербург – Пушкин, Россия;
helenagandratur@gmail.com

Аннотация. На примере черемухово-злаковой тли проведен анализ сопряженности развития в системе «растение – фитофаг» у гетероциклических видов тлей в условиях сезонной смены древесного хозяина на травянистые. Показано сходство в фенологии колонизации тлями первичных и вторичных хозяев. Отмечаются особенности этапов органогенеза растений и формирования численности тлей в связи с их вредоносностью. Моделирование сдвигов в синхронизации работы этой трофической системы способствует ее дестабилизации.

Ключевые слова: черемуха, пшеница, тли, развитие, этапы органогенеза, сопряженность.

Patterns of coordination of the development of *Rhopalosiphum padi* (L.) (Hemiptera, Sternorrhyncha, Aphididae) and its primary and secondary host plants

E.S. Gandrabur, A.B. Vereschagina

All-Russian Research Institute of Plant Protection, Russian Federation, St. Petersburg – Pushkin, helenagandratur@gmail.com

Abstract. For example of the bird cherry-oat aphid, the analysis of the timing of development in the “plant-phytophage” system in heterocyclic aphids with alternation of the primary (winter, arboreal) host plant to the secondary (summer, herbaceous) ones was done. The similarity in the phenology of colonization by aphids of primary and secondary hosts was shown. The features of the stages of plant organogenesis and the formation of the number of aphids in connection with their harmfulness are noted. Modeling shifts in the synchronization of the work of this trophic system contributes to its destabilization.

Key words: Bird-cherry, wheat, aphids, development, stages of organogenesis, phenology.

Виды рода *Padus* Mill. (сем. Rosaceae Juss.) широко используются в садово-парковом строительстве и плодоводстве, а также представлены в ботанических садах на различных континентах. В настоящее время известно около 20 видов черемухи (Безменова и др., 2010). Среди них черемуха обыкновенная (*Padus avium* Mill), виргинская (*P. virginiana* L.) и пенсильванская (*P. pensylvanica* L.) известны как первичные (зимние) хозяева черемухово-злаковой тли *Rhopalosiphum padi* (L.) – гетероциклического (двудомного) вида. Значимость вредителя возрастает, поскольку *P. avium* и *P. virginiana* наиболее пригодны для проведения селекционных работ (Симагин, Локтева, 2015). В качестве вторичных кормовых растений для *Rh. padi* указываются растения 110 видов из 7 семейств, среди которых к наиболее типичным относятся виды сем. Мятликовых (Poaceae Barnhart), в меньшей степени – сем. Осоковых (Cyperaceae Juss.), Ситниковых (Juncaceae Juss.), Ирисовых (Iridaceae Juss.), и Рогозовых (Typhaceae Juss.) (Finlay, Luck, 2011). Тли в массе размножаются на растениях всех указанных семейств, но особенно известны в качестве вредителей злаковых культур.

Особенности и степень вреда, наносимые вредителями, находятся в тесной связи с их вмешательством в развитие растений, находящихся на тех или иных этапах органогенеза. В этом случае синхронизация развития тлей и их хозяев имеет большое значение и в настоящее время изучена еще недостаточно.

Целью работы было выявление закономерностей в сопряженности развития *Rh. padi* с этапами органогенеза первичных и вторичных растений-хозяев.

Согласно Ф.М. Куперман (1977) жизненный цикл всех покрытосеменных растений, в том числе Розоцветных и Мятликовых состоит из 12 последовательных этапов органогенеза, составляющих фазы развития и отличающихся комплексом функциональных и морфологических изменений в тканях растений в зависимости от биологических особенностей вида или внутривидовой формы растений, а также погодных условий. Следовательно, повреждение растений фитофагами на различных этапах органогенеза также будет иметь свои особенности влияния на развитие растений, их внешний вид и урожайность.

Если весной гетероциклические виды тлей выходят из зимовавших яиц на первичном (зимнем) хозяине с началом его вегетации, и в дальнейшем не распространяются между деревьями, то после эмиграции

по мере роста численности могут расселяться между травянистыми растениями, заселяя их на различных этапах органогенеза.

Выход личинок *Rh. padi* из яиц начинается, когда у черемухи проходит вегетативная фаза развития побега, появляются зеленые конусы листьев (I–II этапы органогенеза). Это иногда конец марта, а как правило – первая декада апреля. Если личинки тли появляются раньше наступления этой фазы хозяина, то погибают из-за недостатка питания и укрытия от непогоды. Репродукция основательниц начинается через 17–20 дней после выхода личинок из яиц. Первые эмигранты тли появляются на яровой пшенице в начале кущения (II этап органогенеза) и сразу начинают репродукцию. Это конец мая.

На III этапе органогенеза на черемухе начинают распускаться почки, формируются оси соцветий, наблюдается массовый выход основательниц из яиц, но колоний еще нет (середина апреля). На пшенице на III этапе заканчивается кущение и начинается выход в трубку. Происходит сегментация конуса нарастания (закладка будущих колосков), усиленный рост нижних междоузлий. Заканчивается лёт *Rh. padi* с первичного хозяина. Иногда на зерновых уже появляется *Metopolophium dirhodum* Walk. (розово-злаковая тля), мигрирующая с шиповников. Численность и вредоносность тлей в данный период (вторая декада июня), как правило, еще незначительны. При холодных и дождливых погодных условиях (2017 г.) происходит задержка в развитии растений и насекомых. Если численность тлей на черемухе в период эмиграции была высокой и погодные условия благоприятны, вредитель может быстро достигнуть экономического порога вредоносности (ЭПВ) на пшенице, вызывая у нее задержку роста и закладку плодоеlementов.

На черемухе IV этап органогенеза сопровождается образованием зачатков будущих цветков на оси соцветия, ростом листьев, массовым распусканьем почек (конец апреля). В этот период все личинки тли уже вышли из яиц. На пшенице (первая половина июня) этап характеризуется закладкой и формированием колосковых бугорков, выходом в трубку; в местах наиболее интенсивного роста растения и притока ассимилятов образуются небольшие колонии (5–15 особей) *Rh. padi*. Неустойчивые образцы пшеницы могут страдать из-за недостатка питания.

На V-ом этапе органогенеза у растений формируются органы цветка. На черемухе все почки распускаются к концу апреля – началу мая. Основательницы находятся еще на личиночных стадиях. На пшенице усиленно растут листья, заканчивается фаза выхода в трубку. *Rh. padi* продолжает питаться в зонах роста междоузлий и листовых пластинок, нарушая процессы закладки органов цветка, что в дальнейшем оказывает влияние на оплодотворение и формирование зерновок. *M. dirhodum* питается на верхних листьях, образуя небольшие малоподвижные колонии. В благоприятные годы на посевах появляется *Sitobion avenae* F. (большая злаковая тля), которая заселяет листовые пластинки.

Далее происходит формирование спорогенной ткани пыльцевых зерен и пестика (VI этап органогенеза). На черемухе начинается бутонизация. У тлей появляются первые самки-основательницы. На пшенице отмечается усиленный рост колосковых и цветковых чешуй, тычиночных нитей. Усиливается рост средних междоузлий стебля, листовых пластинок и влагалищ листьев. Начинается фаза стеблевания. Колонии тлей увеличиваются на растущих участках стебля, влагалищах листьев и листовых пластинках. Перехватывая ассимиляты тли подавляют рост и развитие хозяина. На данном этапе растения чувствительны к засухе и повреждению тлями.

На следующем этапе происходят образование мужского и женского гаметофитов, усиленный рост органов цветка и соцветия в целом. На черемухе наблюдается бутонизация, появление белых бутонов, рост листьев. Основательницы начинают репродукцию (первая половина мая), но повреждения растений пока не заметны. На пшенице происходит усиленный рост всех органов колоса. Заканчивается стеблевание. Численность тлей при благоприятных условиях быстро нарастает. В результате генерализованного воздействия колоний тлей на растения, колос может не выйти из влагалища или выйти деформированным, со сниженным количеством колосков и цветков. В этот период также нарастает численность *M. dirhodum*, которая питается на верхних листьях и может достигнуть значений ЭПВ. В нашей зоне, как правило, появляются крылатые самки *S. avenae*.

На VIII–IX этапах органогенеза (конец мая – начало июня) на черемухе наблюдается полное облиствение, рост листьев заканчивается, завершается гаметогенез, происходит цветение и оплодотворение (вторая половина мая – начало июня). В результате питания тлей появляются первые свернутые листья. Самки основательницы быстро размножаются, нарушая процесс плодобразования. Листья желтеют и усыхают, в условиях массового размножения тлей могут усыхать однолетние побеги, плоды не образуются. В колониях можно увидеть первых эмигрантов и личинок с зачатками крыльев. При продолжительном цветении черемухи лёт эмигрантов может быть более длительным. На VIII этапе

у пшеницы завершается формирование колоса и цветков, из влагалища верхнего листа появляется колос, усиленно растут листья и стебли. Недостаток влаги в почве, сухая и жаркая погода в этот период приводят к нарушению формирования генеративных органов, растения очень чувствительны к повреждениям тлями. Численность *Rh. padi* приближается к максимальной. Она в массе заселяет листовые пластинки, влагалища листьев, проникает за влагалища листьев, стебель, в узел кушения, иногда образует смешанные колонии с другими видами злаковых тлей на колосе, флаговом и предфлаговым листьях. Нарастает численность *M. dirhodum* на двух верхних листьях, ответственных за питание колоса, *S. avenae* перемещается на колос. В результате повреждения тлями (поглощения ассимилятов и воды) происходят нарушения в формировании генеративных органов и появление в колосе большого числа недоразвитых и стерильных цветков. Через 2–3 дня после колошения начинается IX этап органогенеза – цветение, оплодотворение, образование зиготы, который длится приблизительно 3–7 дней. В этот период численность тлей максимальна. Тли нарушают процессы оплодотворения, из-за чего снижается количество и качество зерновок.

X–XII этапы характеризуются ростом и созреванием плодов и семян. На X этапе органогенеза черемухи заканчивается лёт эмигрантов *Rh. padi* на яровые культуры. На пшенице угасают процессы роста. Численность тлей начинает быстро снижаться. К XII этапу их уже нет. До ремиграции на черемуху тли мигрируют на многолетние злаковые травы, а позднее – на озимые культуры. У других видов растений сходная схема взаимоотношений с тлями. На корневищных многолетниках *Rh. padi* может питаться в узле кушения в течение всего сезона.

Таким образом, на первичном хозяине *Rh. padi* весной обитает около 70 дней, на яровой пшенице – примерно столько же. Нарастание численности тлей на черемухе и на пшенице происходит при прохождении ими VI–VIII этапов органогенеза с пиком на VIII–IX этапах. Осенняя ремиграция тлей на черемуху начинается в третьей декаде августа и продолжается до конца листопада (третья декада октября – начало ноября), также несколько более 2 месяцев.

Научно-обоснованное вмешательство во взаимоотношения вредителей и хозяев, путем изменений сроков прохождения наиболее уязвимых этапов развития растений, а также этапов, снижающих численность вредителя (например, сроки распускания почек у черемухи, длительность цветения, сроки листопада) может быть использовано как экологически безопасное средство защиты растений.

ЛИТЕРАТУРА

- Безменова М.Д., Сорокопудов В.Н., Резанова Т.А. Некоторые аспекты адаптации видов черемухи (*Padus* Mill) в условиях Белогорья // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. 2010. № 15, вып. 12. С. 66–71.
- Куперман Ф.М. Морфофизиология растений. М. : Высшая школа, 1977. 287 с.
- Симагин В.С., Локтева А.В. Селекция черемухи как декоративной культуры для севера и востока России // Плодоводство и виноградарство Юга России. 2015. № 36 (06). С. 1–14.
- Finlay K.J., Luck J.E. Response of the bird cherry-oat aphid (*Rhopalosiphum padi*) to climate change in relation to its pest status, vectoring potential and function in crop-vector-virus pathosystem // Agriculture, Ecosystems and Environment. 2011. Vol. 144. P. 405–421.