НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**Природопользование и охрана природы:
Охрана памятников природы,
биологического и ландшафтного
разнообразия Томского Приобья
и других регионов России**

**Материалы IX Всероссийской с международным участием
научно-практической конференции**

Томск, 21–23 апреля 2020 г.

Томск
Издательство Томского государственного университета
2020

5. Айдаров И.П. Комплексное обустройство земель. М. : МГУП, 2007. 208 с.
6. Орлова И.В., Рыбкина И.Д., Стояцева Н.В. Оценка интегральной антропогенной нагрузки на территорию Алтайского края // Ползуновский вестник. 2006. № 4-2. С. 123–130.
7. Орлова И.В. Оценка уровня экологической сбалансированности структуры земельных угодий аграрно-развитых регионов Западной Сибири // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15, № 3 (3). С. 1003–1008.
8. Будаева О.Д., Квасникова З.Н. Геоэкологическая оценка ландшафтов Мухоршибирского района Республики Бурятия // Современные проблемы географии и геологии : материалы III Междунар. научно-практической конф. с элементами школы-семинара для студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 2014. С. 279–283.
9. Тюлебекова Р.Р., Квасникова З.Н. Ландшафтно-экологическая оценка Акмолинской области (Республика Казахстан) // Экосистемы центральной Азии: исследование, сохранение, рациональное использование : материалы XIII Убсунурского Международного симпозиума. Кызыл, 2016. С. 229–232.
10. Глуховская М.Ю. Анализ экологической устойчивости и стабильности региональной территории на примере Оренбургской области // Вестник Оренбургского государственного университета. 2017. № 4 (204). С. 53–61.

DOI: 10.17223/978-5-94621-954-9-2020-72

О ПОЛЕЗНЫХ ФУНКЦИЯХ ЗАПАДНО-СИБИРСКИХ ЛАНДШАФТОВ И НЕОБХОДИМОСТИ ИХ ОХРАНЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ABOUT USEFUL FUNCTIONS OF WESTERN SIBERIAN LANDSCAPES AND THE NEED FOR THEIR PROTECTION AND WISE USE

С.Н. Кирпотин, Н.М. Семенова
S.N. Kirpotin, N.M. Semenova

*Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск
kirp@mail.tsu.ru, nmsemnv@mail.tomsknet.ru*

Рассматриваются важные экосистемные функции западно-сибирских ландшафтов в связи с высокой заболоченностью территории. Определяются основные направления для повышения репутации западно-сибирских болот как в России, так и на мировом уровне.

The important ecosystem functions of West Siberian landscapes, where there are many peatlands, are considered. The main directions for improving the reputation of West Siberian peatlands both in Russia and at the world level are determined.

Ключевые слова: торфяные болота, водно-болотные угодья, углеродный цикл, климатические изменения, Западная Сибирь, Большое Васюганское болото, Конвенция об охране Всемирного наследия, Парижское соглашение, охрана болот.

Key words: peatlands, wetlands, carbon cycle, climate change, Western Siberia, Great Vasyugan Mire, World Heritage Convention, Paris Agreement, protection of peatlands.

Западно-Сибирская равнина – уникальный географический регион планеты, в ландшафтной структуре которого широко представлены разные типы торфяных болот и других водно-болотных угодий. Болота Западной Сибири представляют более 40 % площади всех болот России и примерно столько же мало нарушенных болотных экосистем Мира. На территории Западной Сибири, занимающей всего около 1,6 % поверхности суши, хранится более четверти мировых запасов торфа.

Развитие болот и формирование торфяной залежи в последнее время соотносят с процессами депонирования углерода. По разным оценкам, от 51,7 [1] до 70,2 [2] миллиардов тонн углерода хранится в западно-сибирских торфяниках, что составляет до 26 % углерода, накопленного экосистемами суши со времени последнего оледенения [2]. Таким образом, болота Западной Сибири – это гигантских размеров естественное хранилище углерода на планете [1–4].

На протяжении тысячелетий углерод связывался и накапливался в торфяном теле болот. Благодаря способности изъятия углерода из глобального цикла и длительного хранения, экоси-

стемы болот играют большую роль в поддержании газового состава атмосферы. Это и есть их основная глобальная биосферная функция, которая в связи с глобальными климатическими трендами и вмешательством человека в ход природных процессов находится в последние годы в сфере пристального внимания ученых.

В этой связи целью нашего сообщения является способствовать повышению экологического реноме болот Западной Сибири в интересах устойчивого развития данного региона. Основными задачами стали следующие:

1) обозначить новые подходы к оценке экологической и природоохранной ценности природных систем;

2) привести аргументы в пользу принципиальной необходимости сохранения и рационального использования западно-сибирских болот как мирового феномена;

3) показать основные направления охраны болот и других водно-болотных ландшафтов Приобья на национальном и наднациональном уровнях.

Роль болот, обладающих уникальной способностью депонировать углерод, в биосфере огромна. Тем не менее, в вопросах поддержания экологического благополучия планеты пальма первенства, как правило, отдается лесам. В свое время лесные экосистемы были включены в расчетные механизмы квотирования Киотского соглашения, затем оценивались в рамках Парижского соглашения, которое подписала и наша страна. На Климатическом саммите в Париже в 2015 г. В.В. Путин отметил: «В новом соглашении (Парижском) должна быть зафиксирована важная роль лесов как основных поглотителей углекислого газа. Для России, которая обладает колоссальными лесными ресурсами и многое делает для сохранения лесов, это особенно важно».

Действительно, леса – это легкие планеты. И Россия много делает для охраны лесов на своей территории, в том числе с использованием инструментария территориальной охраны природы. Однако, роль лесов, как депонирующих углерод ландшафтов, менее значима, чем роль болот. В бореальной зоне болота в расчете на 1 га содержат в семь раз больше углерода, чем любая другая экосистема. При достижении климаксового состояния леса перестают депонировать углерод и затем превращаются в его источник. Если в лесах умеренных широт цикл углерода длится в среднем 150 лет, то болота изымают углерод из природных круговоротов, по меркам человеческой жизни, навечно. И эта особенность болот должна приниматься во внимание при оценке глобальной роли природных экосистем в разных географических регионах и странах. И если Амазонская низменность по праву считается важнейшим кислородопroduцирующим регионом планеты, то Западно-Сибирская равнина заслуживает особого внимания как мировая кладовая длительного хранения углерода [5]. И в том и в другом случае природные ландшафты одновременно выступают и как объекты регионального природопользования, и как объекты разноуровневой интегрированной охраны с высокой долей незатронутых хозяйственной деятельностью экосистем.

Постепенно формируется понимание того, что сохранение запасов углерода в торфяных залежах – важная экосистемная услуга болот. Отсюда, совершенно справедлива постановка вопроса об оплате экосистемных услуг болот, способных компенсировать текущие выбросы парниковых газов [6]. Включение торфяных болот в механизмы квотирования Парижского соглашения становится важнейшей стратегической задачей. В этом случае Западная Сибирь, как высоко заболоченный и мало нарушенный регион, и Россия в целом получают огромные геополитические дивиденды.

В условиях Западной Сибири сложилась уникальная ситуация, когда торфяники долгое время сами себя охраняли, эффективно регулируя распределение хозяйственной деятельности в регионе. Традиционная нагрузка на болота была связана с собирательскими промыслами и охо-

той. Непреднамеренная трансформация болот во все времена определялась необходимостью прокладки транспортных коридоров по кратчайшим расстояниям, а в последние десятилетия связана с размещением инфраструктуры нефтегазодобывающей отрасли. Целевая эксплуатация торфяных ресурсов в Западной Сибири никогда не имела существенного экономического значения. Осушительная мелиорация здесь не была особо масштабной и выполнялась преимущественно в южных сельскохозяйственных районах. Тем не менее, справедливо отметить, что лесомелиоративные работы затронули не только отдельные болотные массивы на юге региона, но и весьма значительные площади в отрогах Васюганской болотной системы, занимающей господствующие отметки на обширных пространствах Обь-Иртышского междуречья [7].

В целом на планете болота не менее, чем леса пострадали в результате вмешательства человека. Во многих европейских странах они превратились в весьма редкие «явления» со всеми вытекающими отсюда последствиями. В частности, в Ирландии было осушено примерно 84 % верховых болот [8], находящихся ныне в числе приоритетных местообитаний для сохранения в Евросоюзе и вполне обычных в условиях Западной Сибири.

На территории сухопутной Европы торфяные болота некогда занимали почти 100 млн. га или 20 % [9]. Влияние человека затронуло приблизительно 60 % их первоначальной площади [10]. По состоянию на 2017 г. суммарная площадь осушенных торфяников только шести европейских стран бореальной зоны составила 12,7 млн га [6].

Деградация еще нетронутых торфяных экосистем непосредственно связана с угрозой дальнейшей утраты биоразнообразия на глобальном и национальном уровнях и негативно влияет на климат. Поэтому в разных частях планеты определенный интерес приобретает восстановление деградированных торфяников. Причем, если до недавнего времени восстановление нарушенных торфяников в основном осуществлялось с целью восстановления биоразнообразия и экологических процессов, то сейчас все больше внимания уделяется повторному увлажнению богатой углеродом почвы для смягчения последствий изменения климата [11]. Повторное заболачивание деградированных торфяников представляет собой серьезную проблему, и в некоторых случаях интродукция мохообразных (типичных, к слову, для естественных верховых болот Сибири) может оказаться более сложной задачей, чем снижение выбросов парниковых газов [8].

Торфяники содержат более четверти углерода в почве планеты, но покрывают только 3 % поверхности суши. Осушенные торфяники ежегодно выбрасывают миллиарды тонн углекислого газа. Сохранение и восстановление естественных биосферных функций торфяников и режима их функционирования становится мировой проблемой, так как в большинстве случаев для того чтобы претендовать на выполнение компенсаторных экосистемных услуг в биосфере торфяники сначала должны компенсировать себя [6].

В связи с угрозами изменения климата ученые и политики определяют торфяники как идеальные инструменты для сокращения выбросов и поглощения углерода. И в использовании этих инструментов мы видим две стратегии – восстановление (реставрация) и сохранение (консервация).

Неожиданным лидером по восстановлению нарушенных торфяников стала Шотландия, более 20 % площади которой занято покровными болотами (*blanket bogs*). К 2030 г. в стране намечено восстановить 250 тыс. га нарушенных болот, использовавшихся в сельском и лесном хозяйстве и для добычи торфа. В планах на 2020 г. – восстановить 50,0 тыс. га, находящихся большей частью на государственных особо охраняемых природных территориях и лесных угодьях. Так, путем восстановления торфяников, Шотландия намеревается к 2045 г. достичь нулевого выброса парниковых газов [12].

Все же нет абсолютной гарантии, что подобные титанические усилия достигнут ожидаемой цели. Любую экосистему легко сломать, но трудно вернуть в исходное состояние. Трудно

воссоздать что-то из прошлого, но в наших силах сделать все возможное, чтобы разумно распорядиться имеющимся и сделать устойчивым будущее.

Это абсолютно справедливо по отношению к Западно-Сибирской равнине с ее бескрайними болотами, где ведущей стратегией по отношению к болотам можно принять их сохранение. В отличие от сильно освоенных регионов планеты современные стратегии восстановления торфяников и поэтапного отказа от добычи торфа здесь не особо актуальны. Угрозы западно-сибирским торфяникам связаны с другими процессами, однако это не противоречит общей идее их эффективного использования в политике противодействия глобальным климатическим изменениям.

По мере развития региона болота так или иначе вовлекались в состав формирующейся здесь системы особо охраняемых природных территорий. Они автоматически включались в состав особо охраняемых природных территорий регионального и национального уровней, В крайне редких случаях позиционировались как самостоятельные особо охраняемые природные территории в ранге региональных памятников природы, и то в основном на юге региона. Уже в 90-е годы прошлого века развиваются новые инициативы по охране болот [7], позволившие трактовать западно-сибирские болота как природоохранные объекты международного значения.

Так, в 1998–1999 гг. на территории Томской и Новосибирской областей был реализован крупный международный проект (Россия, Германия, Нидерланды) по охране минеротрофных болот на юге Западной Сибири, практически уничтоженных в других странах Северной Евразии. По результатам этого проекта Большое Васюганское болото на Обь-Иртышском водоразделе приобрело широкую известность как ценный природоохранный объект [13–15], а на его территории был создан первый в России крупный по размерам заказник для охраны болот [16], ставший прообразом крупного болотного заповедника.

Большое Васюганское болото впечатляет своими размерами, занимая в общей сложности, по разным оценкам [17–19], от 5,5 до 7,5 млн га. Болото возникло в результате объединения 19 отдельных центров болотообразования, постепенно в течение голоцена слившихся в единый массив. В современном виде болото состоит из 158 относительно обособленных безлесных, лесных и слабо облесенных массивов.

Это уникальный и весьма сложный в ландшафтном и гидрологическом отношении природный объект с запасами торфа (в пересчете сухое органическое вещество) около 18 млрд т, из которых на долю олиготрофных торфов приходится 50,2 %, мезотрофных – 18,1 %, евтрофных – 31,7 %. Запасы депонированного углерода составляют 9,3 млрд т, в том числе в олиготрофных залежах 49,4 %, в мезотрофных – 18,2 %, в евтрофных – 32,4 %. Болото занимает 6,7 % общей площади западно-сибирских торфяников, содержит 16,5 % запасов торфа Западно-Сибирской равнины и 17,2 % органического углерода [18, 20], внося существенный вклад в С-депонирующие показатели лесоболотных комплексов Западно-Сибирской равнины.

Большое Васюганское болото вошло в перечень наиболее известных болотных систем Мира [15], признано мировым сообществом объектом международной охраны и включено в Теневой список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО [5]. 16 декабря 2017 г. Председателем Правительства Российской Федерации подписано постановление № 1563 «Об учреждении государственного природного заповедника «Васюганский» на стыке Томской и Новосибирской областей.

Учитывая реальные угрозы экосистемам Большого Васюганского болота со стороны хозяйственной деятельности человека, необходима разработка адекватной проектной документации по Васюганскому заповеднику и подготовка номинационного досье для включения природного объекта «Большое Васюганское болото» в основной список объектов Всемирного

наследия ЮНЕСКО. Кроме того, необходимо сосредоточить усилия на разработке стратегии предотвращения изменения климата и смягчения его последствий с помощью эффективного управления особо охраняемыми природными территориями в субъектах Российской Федерации в Западно-Сибирском регионе с большой площадью болот и других водно-болотных угодий.

Таким образом:

1. Болота – широко распространенный тип ландшафтов Западной Сибири.
2. Совокупность западно-сибирских болот представляет собой мировой феномен.
3. В охране и использовании болот Западной Сибири необходимо учитывать глобальные и региональные приоритеты.

Работа выполнена при поддержке грантового проекта РГО «Уникальные памятники природы Томского Приобья – вклад сибирской природы в сохранение природного наследия России».

Литература

1. Yefremov S.P., Yefremova T.T. Present stocks of peat and organic carbon in bog ecosystems of West Siberia // Carbon Storage and Atmospheric Exchange by West Siberian Peatlands / eds. by W. Bleuten, E.D. Lapshina. Tomsk, 2001. P. 73–78.
2. Smith L.C., MacDonald G.M., Velichko A.A., Beilman D.W., Borisova O.K., Frey K.E., Kremenetski K.V. and Sheng Y. Siberian peatlands a net carbon sink and global methane source since the Early Holocene // Science, 2004. № 303. P. 353–356.
3. Botch M.S., Kobak K.I., Vinson T.S., Kolchugina T.P. Carbon pools and accumulation in peatlands of the former Soviet Union // Global Biogeochem Cycles, 1995. V. 9, № 1. P. 37–46.
4. Cheng Y. et al. A high-resolution GIS-based inventory of the west Siberian peat carbon pool // Glob. Biogeochem. Cycles. 2004. V. 18 (3). doi: 10.1029/2003GB002190.
5. Semenova N.M. Western Siberia in the context of global nature conservation concerns // The international journal of environmental studies, 2014. V. 71, № 5. P. 595–604. doi: 10.1080/00207233.2014.950525.
6. Ojanen P. Peatland rewetting and climate regulation. Tampere, 2018. 19 p. URL: https://www.metsa.fi/documents/10739/20408995/20180928_P_Ojala-restoration.pdf/1db9ae97-ff14-4ed6-9c81-67fce4fc1c7b (дата обращения: 13.04.2020).
7. Семенова Н.М. Состояние, использование и охрана ресурсов торфяных болот в Томской области // Охрана природы : сб. статей. Томск : изд-во НТЛ, 2001. Вып. 2. С. 69–86.
8. Renou-Wilson F., Wilson D., Rigney C., Byrne K., Farrell C., Müller C. EPA Research Report 236: Network Monitoring Rewetted and Restored Peatlands // Organic Soils for Climate and Biodiversity Benefits (NEROS). 2019. URL: <http://www.epa.ie/pubs/reports/research/biodiversity/research236.html> (дата обращения: 15.04.2020).
9. Global Peat Resources / ed. by E. Lappalainen. International Peat Society and Geological Survey of Finland. Jyska, 1996. 366 p.
10. Joosten H. European mires: a preliminary status report // International mire conservation group members newsletter. 1997. V. 3. P. 10–13.
11. Dinesen L. and Hahn P. Draft Ramsar Technical Report on peatland restoration and rewetting methodologies in Northern bogs // Ramsar Convention on wetlands, 22nd Meeting of the Scientific and Technical Review Panel Gland, Switzerland. 18-22 March 2019. URL: https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/strp22_7.2_draft_rtr_peatland_restoration_e.pdf (дата обращения: 25.09.2020).
12. Gewin V. Bringing back the bogs // Nature. 2020. V. 578. P. 204–208.
13. Joosten H. and Clarke D. Wise use of mires and peatlands – Background and Principles including a framework for Decision-making. Publishers International Mire Conservation Group and International Peat Society, 2002. 304 p.
14. Tanneberger F., Hanne W., Joosten H. Far and wide as the eye can wander: mires, mire research and mire conservation in Western Siberia // Telma. 2003. № 33. P. 209–229.
15. Semenova N.M. Land use and Conservation of the Great Vasyugan Mire // Moore von Sibirien bis Feuerland / Stapfia 85: diverse. Linz, 2005. P. 304–309.
16. Семенова Н.М., Валуцкий В.И., Баженов В.А., Огурцов Н.Е. Создание ландшафтного заказника в системе Большого Васюганского болота // Большое Васюганское болото. Современное состояние и процессы развития. Томск: изд-во ИОА СО РАН, 2002. С. 218–228.
17. Геологическое строение и полезные ископаемые Западной Сибири. Новосибирск : Изд-во СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1998. Т. 2. 254 с.
18. Ваганов Е.А., Ведрова Э.Ф., Верховец С.В., Ефремов С.П., Ефремова Т.Т., Круглов В.Б., Онучин А.А., Сухинин А.И., Шибистова О.Б. Леса и болота Сибири в глобальном цикле углерода // Сибирский экологический журнал, 2005. № 4. С. 631–649.

19. Kirpotin S., Berezin A., Bazanov V., Polishchuk Y., Vorobiov S., Mironycheva-Tokoreva N., Kosykh N., Volkova I. et al. Western Siberia wetlands as indicator and regulator of climate change on the global scale // International Journal of Environmental Studies, 2009. V. 66, is. 4. P. 409–421.

20. Vaganov E.A., Vedrova E.F., Verkhovets S.V., Efremov S.P., Efremova T.T., Kruglov V.B., Onuchin A.A., Sukhinin A.I., Shibistova O.B. Forests and swamps of Siberia in the global carbon cycle // Contemporary Problems of Ecology. V. 1 (2). P. 168–182.

DOI: 10.17223/978-5-94621-954-9-2020-73

ОЦЕНКА РИСКОВ, СОПРЯЖЕННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ПОЧВЕННОГО И СНЕГОВОГО ПОКРОВА НА ТЕРРИТОРИИ ЙОШКАР-ОЛЫ ASSESSMENT OF RISKS RELATED TO CONTAMINATION OF SOIL AND SNOW COVER ON THE TERRITORY OF YOSHKAR-OLA

И.В. Леухин¹, Е.Г. Язиков¹, Е.А. Гончаров²
I.V. Leukhin¹, E.G. Yazikov¹, E.A. Goncharov²

¹ *Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск*

² *Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола*
ilia-konkistodor@yandex.ru, yazikoveg@tpu.ru, GoncharovEA@volgatech.net

В тексте представлены результаты полевой, лабораторной работы и камеральных исследований, посвящённых рискам, исходящим от почв и пылеаэрозолей, аккумулируемых в снежном покрове города Йошкар-Олы.

The text presents the results of field, laboratory work and office research on the risks posed by soils and dust aerosols accumulated in the snow cover of the city of Yoshkar-Ola.

Ключевые слова: почвы, снеговой покров, риск, оценка риска, пылеаэрозоли.

Key words: soil, snow cover, risk, assessment of risk, dust aerosols.

В городах проживает 74 % населения страны. Конкретно в Йошкар-Оле живёт около 260 тыс. человек. Город является важным транспортным и промышленным узлом, несёт ключевое административное значение, является важным звеном в распределении потоков туристов.

Знания о рисках для населения на территории города являются необходимыми при планировании различных мероприятий и определении стратегии его развития.

Целью нашей работы является: оценка рисков для населения города, исходящих от почв и пыли, аккумулируемой в твёрдом осадке снега.

Для её достижения поставлен ряд **задач**:

- провести обзор литературных данных по теме;
- выбрать подходящие методики исследования;
- набрать эмпирический материал: провести полевой, лабораторный и камеральный этапы исследования почв и твёрдого осадка снега;
- с помощью выбранных ранее методик оценить риски для населения исследуемой территории.

Объектами исследования служат почва и твёрдый осадок снега на территории г. Йошкар-Олы – столицы Республики Марий Эл, расположенной на берегах левого притока Волги – реки Малой Кокшаги. Предмет исследования – риски, исходящие от содержащихся в почвах тяжёлых металлов и пылеаэрозолей [1].

Материалы и методы. В ходе атмогеохимических исследований, проведенных с учётом РД 52.04.186–89 [2] и методики, изложенной в «Геохимии окружающей среды» [3], была рассчитана общая пылевая нагрузка, а также методом палетки [4] определено процентное соотношение минеральных составляющих в твёрдом осадке снега. Одна из проб пылеаэрозолей была