НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**Природопользование и охрана природы:
Охрана памятников природы,
биологического и ландшафтного
разнообразия Томского Приобья
и других регионов России**

**Материалы IX Всероссийской с международным участием
научно-практической конференции**

Томск, 21–23 апреля 2020 г.

Томск
Издательство Томского государственного университета
2020

Таким образом, для определения антропогенной трансформации стока взвешенных наносов рек исследуемой территории целесообразно использовать зависимости средних годовых расходов взвешенных наносов и воды.

Литература

1. Швебс Г.И. Формирование водной эрозии, стока наносов и их оценка. Л. : Гидрометеиздат, 1974. 183 с.
2. Walling D.E., Webb B.W. Material transport by the worlds river // JAHS Publ. 1987. № 164. P. 313–329.
3. Narayana D.V., Babu R. Estimation of soil erosion in India // JIrrig and Drain end. 1983. V. 109, № 4. P. 419–434.
4. Прыткова М.Я. Географическая зональность осадконакопления в малых водохранилищах // Тр. V гидрол. Съезда. Л., 1988. Т. 10, кн. 2. С. 69–75.
5. Эрозия почв и русловые процессы. М. : Изд-во МГУ, 2004. Вып. 14. 201 с.
6. Абдуев М.А., Эюбова Ф.А. Влияние антропогенных факторов на сток взвешенных наносов рек Большого Кавказа (в пределах Азербайджанской Республики) // Известия Академия наук Азербайджана. Серия наук о Земле. 2000. № 3. С. 53–56.
7. Абдуев М.А. Об изменении стока взвешенных наносов и мутности горных рек Азербайджана под влиянием хозяйственной деятельности // Географический вестник. 2015. № 1 (32). С. 29–37.
8. Абдуев М.А., Габиев Т.Дж. Трансформация стока наносов при антропогенных воздействиях на горных реках Азербайджана // Материалы международной научной конференции. Казань, 2019. С. 457–460.

DOI: 10.17223/978-5-94621-954-9-2020-61

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ИРТЫШ-ОБСКОГО АРТЕЗИАНСКОГО БАСЕЙНА В РАЙОНЕ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА THE HYDRODYNAMIC REGIME OF GROUNDWATER IN THE IRTYSH-OB ARTESIAN BASIN IN THE REGION OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT

А.А. Балобаненко², Д.И. Васильев^{1,2}, А.С. Манухина²
A.A. Balobanenko², D.I. Vasiliev^{1,2}, A.S. Manukhina²

¹ *Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск*

² *Филиал «СРЦ ГМСН» ФГБУ «Гидроспецгеология», г. Томск*
vaslev_h@mail.ru

Естественные условия формирования гидрогеодинамического режима подземных вод характерны для большей части Сибирского федерального округа и определяются ландшафтно-климатическими факторами, особенностями геологического строения, гидрогеологических условий и геокриогенной обстановки территории.

The natural conditions for the formation of the hydrogeodynamic regime of groundwater are characteristic of most of the Siberian Federal District and are determined by landscape and climatic factors, features of the geological structure, hydrogeological conditions, and geocryogenic conditions of the territory.

Ключевые слова: гидродинамический режим, подземные воды, сибирский федеральный округ.

Keywords: hydrodynamic regime, groundwater, Siberian Federal District.

Данные о режиме уровней подземных вод могут быть получены только на основе периодических наблюдений. Интерпретация многолетних наблюдений по большому числу наблюдательных скважин становится серьезной задачей, решение которой, зачастую, не под силу даже опытным экспертам. Таким образом, формализованная типизация режима уровней по данным наблюдений является исключительно актуальной.

Исследование режима является важной составной частью проблемы формирования подземных вод. В традиционной постановке режим трактуется как естественно-исторический процесс, характеризующий изменение во времени свойств и состава подземных вод, включая уровни, напоры, расходы, скорости фильтрации, температуру, химический, газовый и микробиологический состав. При этом основным аналитическим методом исследований является анализ одно- и многомерных временных рядов.

Методы и материалы. Выделение территорий с естественным режимом подземных вод базируется, главным образом, на наличии синхронности с климатическими и гидрологическими факторами, соотношении многолетней и внутригодовой амплитуды распределения уровней, а также зависимости амплитуды от мощности зоны аэрации для грунтовых вод и глубины залегания водоносного горизонта – для напорных. Основным фактором, определяющим состояние подземных вод в краткосрочной перспективе, в частности в годовом цикле, является климатический. За период 2016–2019 гг. на основе данных Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН в таблице приведены количественные данные о месячных аномалиях осадков, осредненных по площади физико-географических регионов и федерального округа в целом.

Месячные относительные аномалии осадков

Регион	Год	Аномалии осадков ² (мм/месяц) (% от нормы)											
		дек	январь	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сентя	окт	ноя
Сибирский ФО	2016	<u>7,2</u> 131	<u>-8,4</u> 53	<u>6,9</u> 153	<u>3,0</u> 121	<u>6,6</u> 131	<u>-3,3</u> 91	<u>-2,5</u> 95	<u>4,6</u> 106	<u>-7,8</u> 89	<u>-15,1</u> 66	<u>-7,7</u> 77	<u>4,2</u> 115
	2017	<u>5,6</u> 124	<u>1,5</u> 108	<u>1,7</u> 113	<u>0,0</u> 100	<u>4,8</u> 122	<u>5,6</u> 116	<u>-0,3</u> 99	<u>4,3</u> 106	<u>-0,8</u> 99	<u>11,2</u> 125	<u>-7,8</u> 77	<u>2,0</u> 107
	2018	<u>7,4</u> 132	<u>0,7</u> 104	<u>-0,2</u> 99	<u>8,5</u> 160	<u>1,9</u> 109	<u>13,6</u> 138	<u>-2,8</u> 95	<u>8,0</u> 111	<u>2,5</u> 104	<u>5,6</u> 113	<u>3,1</u> 109	<u>8,5</u> 131
	2019	<u>-1,3</u> 94	<u>-0,9</u> 95	<u>-1,9</u> 85	<u>0,4</u> 103	<u>8,3</u> 136	<u>-2,5</u> 93	<u>16,5</u> 132	<u>-2,1</u> 97	<u>-9,2</u> 86	–	–	–

Примечание. Зеленым цветом выделены месяцы, когда осадков выпало выше нормы, красным – ниже. Жирным курсивом выделены аномалии, попавшие в 5 % максимальных значений за период с 1936 г.

Прогноз уровней подземных вод на 2020 г. подготовлен на основе данных срочных наблюдений за гидродинамическим режимом по пунктам ГОНС. Прогноз рассчитан с применением программного комплекса Statistica 10. При прогнозировании первоначально проводится экспоненциальное сглаживание рядов по методу Холта-Винтерса. При этом учитывается внутригодовая сезонность и многолетняя цикличность. Соответствующие коэффициенты подбираются автоматически так, чтобы относительная ошибка находилась в пределах 10 %. Если ошибка не попадает в заданный интервал, подбор коэффициентов проводится вручную с заданным шагом от минимального до максимального. Единичные пропуски в рядах данных восстанавливались с применением метода линейной регрессии.

Территория Иртыш-Обского бассейна относится к провинции с устойчивым сезонным промерзанием зоны аэрации, основное питание подземных вод осуществляется весной за счет инфильтрации снеготалых вод. В структурно-геологическом строении бассейна выделяются фундамент и перекрывающий его мезозойско-кайнозойский осадочный чехол, состоящий из двух гидрогеологических этажей, разделенных мощным региональным водоупором верхнемел-палеогенового возраста мощностью до 400–800 м. В краевой восточной и юго-восточной частях бассейна региональный водоупор выклинивается, и отложения чехла представляют собой единую водоносную толщу.

Верхний гидрогеологический этаж характеризуется, в целом, свободным водообменом. Питание подземных вод верхнего этажа осуществляется в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков на приподнятых участках междуречных пространств, особенно на правобережье р. Оби, отличающихся преимущественно песчаным разрезом, отсутствием выдержанных в пространстве водоупоров, приподнятостью территории. Зоны разгрузки бассейнов стока приурочены к руслам рек-дрен Обь, Иртыш, Омь и их крупных притоков.

Подземные воды нижнего этажа находятся в обстановке затрудненного и весьма затрудненного водообмена, отличаются высокой минерализацией. Они преимущественно термальные, минеральные и технические для ППД.

Подземные воды четвертичного комплекса используются для водоснабжения мелких потребителей, деревень, сел, небольших городов. Воды комплекса в основном пресные гидрокарбонатные, но в южной части бассейна на территории Алтайского края минерализация достигает 4 г/л, и состав вод комплекса становится сульфатно-гидрокарбонатным, сульфатно-хлоридным, гидрокарбонатно-сульфатным.

Воды неогеновых отложений для хозяйственно-питьевого водоснабжения больше всего используются в Алтайском крае и Новосибирской области. Водообильность отложений неогенового водоносного комплекса относительно высокая, удельные дебиты скважин 0,1–2 л/с. Химический состав подземных вод неогеновых отложений весьма разнообразен, минерализация вод колеблется от 0,07 г/л в Томской области до 5 г/л – в южных частях бассейна. В Новосибирской области и Алтайском крае подземные воды становятся гидрокарбонатно- и сульфатно-хлоридными, на юге Омской области и западе Новосибирской области – хлоридными натриевыми с минерализацией более 5 г/л.

Воды палеогенового комплекса эксплуатируются наиболее широко. Ими обеспечивается как централизованное, так и децентрализованное водоснабжение мелкими водозаборами и одиночными скважинами в Томской и Новосибирской областях и Алтайском края. Водообильность комплекса изменяется в значительных пределах по площади и по разрезу в зависимости от литологии и мощности водовмещающих отложений. Удельные дебиты скважин колеблются от 0,1 до 6,1 л/с, составляя преимущественно 0,4–1 л/с. Химический состав вод также весьма разнообразен, минерализация колеблется от 0,1 г/л в Томской области до 5 г/л – в южных частях бассейна. В Новосибирской области в водах появляются в значительных количествах хлориды, в Алтайском края – хлориды и сульфаты. В центральной части Алтайского края отмечаются воды сульфатно-хлоридного, хлоридно-сульфатного или смешанного, преимущественно магниево-натриевого состава. На юге Омской и западе Новосибирской областей воды хлоридные натриевые с минерализацией более 5 г/л.

Результаты и обсуждение. Уровненный режим подземных вод для всех наблюдаемых водоносных подразделений имеет схожие циклические сезонные колебания, а также аналогичные сроки наступления характерных уровней. Минимальные предвесенние уровни обычно наблюдаются в марте, затем начинается их резкий подъем, достигающий максимума – в апреле-мае, в северных районах бассейна – в июне, что связано с весенним снеготаянием и прохождением паводка на реках. Далее уровни подземных вод начинают плавно снижаться. При наличии осадков в октябре часто происходит небольшой подъем уровней (рис. 1).

В 2017–2018 гг. среднегодовые уровни *подземных вод четвертичных отложений* отмечались на глубинах 0,41–22,73 м. Более низкое их положение наблюдается на территории Алтайского края и в юго-восточной части Томской области на правобережье р. Чулым.

На графиках внутригодового распределения уровней подземных вод прослеживается их более высокое положение на 0,16–0,38 м относительно среднегодовых значений (рис. 1).

При этом аналогичные тенденции отмечены для всех трех характерных уровней (предвесенних минимальных, весенних максимальных, осенних минимальных), за исключением зимних уровней 2016–2017 гг., приблизившихся к отметкам нормы. Так, в течение осеннего периода 2016 г. наблюдалось малое количество осадков (–4,8 мм/мес.), особенно в сентябре (–5,1 мм/мес.), что привело к низкому положению уровня подземных вод.

Рис. 1. Графики уровней подземных вод в пределах Иртыш-Обского АБ (Западно-Сибирский САБ) в 2017–2019 гг. и прогноз на 2020 г.

В 2017–2019 гг. предвесенние минимальные уровни подземных вод устанавливались на глубине 0,29–22,82 м, фиксируясь в среднем на 5,51–5,61 м. В 2017–2018 гг. они находились в пределах нормы с отклонениями от нее до $\pm 10\%$ многолетней амплитуды на большей части территории Иртыш-Обского АБ (рис. 2). Однако, в 2018 г. за счет аномального количества осадков, выпавших весной и осенью, особенно в марте (19,3 мм/мес.) и сентябре (14,7 мм/мес.), произошло повышение уровня (табл. 1). Тем самым на значительной площади бассейна устанавливалось высокое положение предвесеннего минимального уровня подземных вод, превышающее норму на 10–50 % многолетней амплитуды (рис. 2).

Самое низкое его стояние относительно среднеемноголетней глубины на 10–30 % и более многолетней амплитуды отмечалось в долине р. Оби на севере Томской области, в юго-западной части Новосибирской области на границе с Казахстаном, на востоке Алтайского края на стыке с Алтае-Саянской СГСО, на границах Томской, Кемеровской областей и Красноярского края. В отчетном периоде на некоторых пунктах наблюдения были зафиксированы самые низкие отметки минимумов за многолетний период ($\lambda = 0$): в юго-западной части Красноярского края (д. Куваршино), в пределах г. Омска и на юго-востоке Алтайского края (с. Точильное).

Высокое положение предвесенних минимальных уровней, превышающие норму на 30–50 % многолетней амплитуды с коэффициентом относительного положения более 0,8 фиксировалось на юго-востоке Омской области (г. Омск и Большереченский район), в центральной части Новосибирской области, на юго-востоке Алтайского края на стыке с горно-складчатыми структурами и в его центральной части на левобережье р. Обь и ее долины.

Рис. 2. Схематическая карта предвесенних минимальных уровней подземных вод четвертичных отложений в пределах Иртыш-Обского АБ в 2017–2019 гг. [1]

В 2017–2019 гг. весенние максимальные уровни фиксировались на глубинах от 0,17 м выше поверхности земли до 22,71 м, в среднем составляя 4,39–4,51 м. Аномальной с точки зрения и климата и гидродинамического режима подземных вод являлась весна 2017–2018 гг. Отличительной чертой режима подземных вод являлось более высокое положение весенних максимальных уровней относительно предшествующего 2016 г. и нормы в целом. Этому способствовало достаточное количество осадков зимой 2016–2017 гг., обусловившее высокие запасы воды в снеге (+44,33 мм в поле и –0,26 мм в лесу) и весной 2018 г. (8,9–19,3 мм/мес.).

По многим пунктам наблюдения зафиксированы самые высокие отметки максимумов подземных вод за многолетний период ($\lambda=1$): в Алтайском крае (сс. Волчиха, Мамонтово, Хабазино, Михайловское, Ребриха), в Омской области (г. Омск, с. Большеречье), в Новосибирской области (пгт. Коченёво, сс. Убинское, Здвинск, г. Чулым) и в г. Томске по единичному пункту (ббар) (рис. 3).

Самое низкое положение уровня ($\lambda < 0,4$) отмечалось в южной и юго-восточной частях Омской, Новосибирской областях на границе с Казахстаном и в восточной части Алтайского края на стыке с Алтае-Саянской СГСО (рис. 3). На большей части Иртыш-Обского бассейна устанавливалось положение уровня подземных вод, близкое к норме или превышающее ее на величину 10–30 % многолетней амплитуды.

Весенний подъем уровней подземных вод по времени чаще всего совпадает с периодом половодья рек, а его амплитуда в значительной степени определяется характером изменения речного стока. Максимальная ее величина, как правило, присуща для приречного типа режима подземных вод. Для 2017–2018 гг. были характерны высокие амплитуды колебания уровня между минимальными зимними и максимальными весенними величинами, которые изменялись от 0,06 до 4,71 м и

в среднем составили 1,17–1,20 м, превысив среднемноголетние значения на 0,23–0,60 м. В 2019 г. ее величина приблизилась к многолетним значениям, и была на уровне или выше на 0,03–0,05 м.

В летне-осенний сезон подземные воды получали достаточное питание, что не привело к четко выраженному спаду уровней и формированию летне-осеннего минимума, который плавно перешел в осенне-зимний, минуя меженный период. В 2017–2018 гг. летне-осенние минимальные уровни отмечались на отметках 0,75–22,74 м, и в целом были выше нормы на 0,09–0,34 м. Отличительной чертой естественного режима подземных вод четвертичных отложений являлось более высокое их летне-осеннее стояние в 2018 г. В сентябре-октябре прослеживается осенний подъем уровней грунтовых вод, связанный с выпадением в этот период обильных дождей и происходящий одновременно с подъемом рек. Летне-осенние минимальные уровни фиксировались на отметках 0,43–22,61 м, в среднем устанавливаясь на глубине 5,20 м, то снижаясь, то повышаясь с амплитудой 0,05–1,99 м.

Наблюдения за состоянием подземных вод на пунктах, оборудованных на *неогеновый водоносный комплекс*, проводятся в юго-восточной (п. Белый Яр) и центральной частях (с. Подгорное) Томской области, в центральной части (с. Усть-Чарышская Пристань) Алтайского края, в юго-восточной (г. Татарск, пгт. Чистоозерное) и центральной частях (сс. Убинское, Довольное) Новосибирской области, а также на территории Омской области. Значительных изменений в колебаниях уровня во внутригодовом распределении за отчетный период не выявлено. Данные полностью коррелирует с уже накопленным материалом. Отличительной чертой режима подземных вод за анализируемый период являлось более высокое положение весенних и летне-осенних уровней в 2018 г. относительно предшествующих лет и нормы в целом, что обусловлено климатическими условиями года.

В 2017–2018 гг. среднегодовой уровень подземных вод неогеновых отложений отмечался на глубинах от 0,33 м до 53,40 м, в среднем фиксируясь на 8,62–8,78 м, и в целом был выше нормы на 0,03–0,23 м. В 2017–2018 гг. предвесенние минимальные уровни наблюдались в марте на отметках 0,31–53,57 м, в среднем фиксируясь на 9,04–9,22 м. Несмотря на то, что на некоторых пунктах отмечалось повышение предвесенних минимальных уровней, относительно нормы уровни были ниже. Так, в центральной части (с. Подгорное) Томской области, в юго-восточной (г. Татарск, пгт. Чистоозерное) Новосибирской области и в западной части (гг. Называевск, Тюкалинск) Омской области, уровни устанавливались ниже среднемноголетних значений на 0,11–0,40 м. За счет обильных осадков весной и осенью 2018 г. предвесенний минимальный уровень 2019 г. фиксировался на отметках больше на 0,11–0,50 м чем в 2017–2018 гг., и на всех наблюдательных пунктах был выше нормы на 0,04–1,09 м.

Весенний максимальный уровень наблюдался в июне. В отчетном периоде прослеживается постепенный его подъем. Если в 2017 г. его положение отмечалось на отметках 0,10–53,53 м (среднее 8,32 м), в 2018 г. – 0,18–53,08 (среднее 8,28 м), то в 2019 г. уровень фиксировался на +0,03–53,0 м (среднее 8,13 м). Амплитуда колебания уровня в половодье составляла 0,72–1,03 м и была в 2 раза больше ее среднемноголетней величины, что вероятно обусловлено подъёмом уровня зимой, и резким повышением его на фоне обильных весенних осадков.

В отличие от рассмотренных особенностей гидродинамического режима подземных вод четвертичных и неогеновых отложений, воды *палеогенового водоносного комплекса* не претерпели значительных изменений. В 2017–2018 гг. среднегодовой уровень подземных вод палеогеновых отложений наблюдался на отметке 0,16–35,56 м, в среднем фиксируясь на глубине 11,69–11,81 м. Для сезонных уровней характерны те же особенности, что и для годовых – уровни в 2018 г. увеличились относительно 2017 г., и превысили среднемноголетние значения.

Рис. 3. Схематическая карта весенних максимальных уровней подземных вод четвертичных отложений в пределах Иртыш-Обского АБ в 2017–2019 гг. [1]

В отчетном периоде прослеживается тенденция подъема предвесенних минимальных уровней. Так, в 2017 г. уровень фиксировался на глубинах 0,23–35,82 м (среднее 12,15 м), в 2018 г. – 0,20–35,64 м (среднее 12,06 м) и к 2019 г. он достиг отметок 0,19–35,42 м (среднее 12,05 м). По мере подъема уровня происходило его увеличение относительно нормы: в 2017 г. на 0,20 м, в 2018 г. – 0,29 м, в 2019 г. – 0,31 м.

Весенние максимальные уровни наблюдались от 0,12 м выше поверхности земли до глубины 35,23 м, фиксируясь в среднем на 10,92–11,20 м. Наибольший подъем уровней отмечался в весенний период 2018 г. за счет накопления достаточного запаса воды в снеге и аномального количества осадков (149 % нормы). Амплитуда колебания уровня в половодье 2017 г. была в пределах нормы и составляла 0,02–1,42 м. В 2018–2019 гг. ее величина увеличилась в 2 раза, тем самым превысив норму.

Литература

1. Аналитический обзор состояния недр территории Сибирского федерального округа Российской Федерации за период 2017–2019 гг. Томск : Филиал «СРЦ ГМСН» ФГБУ «Гидроспецгеология», 2019.