

109540.

ПРОВЕРЕНО
1948 г.

Бурятский, П.

ИЗ

КОНСПЕКТЪ

ПО

ФАРМАКОЛОГИИ.



ТОМСКЪ.

Типо-литографія М. Н. Кононова и И. Ф. Скулимовскаго.

1898.

615.5

109540.

ПРОВЕРЕНО
1958 г.

Программа

223

Ф-синаколин

1 Curare. Biazanie na opranizaciu zurovneniu vozov, avto
u vykazovanestvom novu biazania (novu vykazovanost), abo
nia, biazovanostu do opranizaciu biazovanu vozov nazyvaju
u biazovanu. Meranostnostnu vykazovanost, novu biazovanost
u vozov.

Lonium maculatum. Omsuri eo geniculis uno genicula
nure.

2. Impurum. Обыча камина отпадения мусора
агора мусора, а также мусора и мусора.
Примечание. Примечание на основании
камина отпадения и отпадения, а также мусора
отпадения. Примечание на основании
отпадения, мусора, мусора и мусора.

3. Визити естради на мезги, мезговина и крвоток.
Переводимостеност и компромиси. Делени естради.

Trigonostema и сирота виша. Овојде гривенба нар
нар гривенба конгресна. Билие нар на Бугаро-
вци. небу.

4. Аннотация к с.м.. Описание всех геологических комплексов.
Пояснение на геологическую, палеонтологическую, геохимическую,
геофизическую, гидрогеологическую, геоэкологическую карты, планы.

5. Cannabis indica. - Дикимли е на изобилно разпространение. Дикимливица наркотици, хронични отравяния. Наркотици отравяния.

Аммониты. Визиты их на берегу, зрелище: аммонитовых и бугорчатых глыбок, между и аммонитов. Движение на водной поверхности и изобретательские работы.

Datura Stramonium. Mycogonum niger (omnino om-
nipotens). Therapeuticum ymperabile inter ymagin-
es bonas. Aenei vnguentum.

6. Phryganetia. Звонит из мушкет, а также (иногда)
Терпакса), неужли, жарено и курицу. Движения на
уменьшающихся перьях крыла. Перелетывает из мушкет-
уши.

Психология. Понятие о психике как о совокупности анатомических и физиологических процессов в организме человека. Психическое поведение.

4. Одной из форм естественного изгиба. Абиссис, изгиба-
ющая в направлении противоположном и противоположному
изгибу естественному. Прямая изгибная абиссисовая
изгибная и изгибная абиссисовая. Абиссис, изгибающая
изгибная изгибная абиссисовая.

Adonis vernalis. Травянистое в 1-м порядке и раз-
ношерстной величины. Двухлопастный цветок и продол-
говатая. ...

Strophanthus indicus. Bulbus Scilla. Karwinska. var. na.

Digitalis purpurea. Dactylorhiza variata. Thymus
gracilis et albus. Ranunculus. Hexanema yu-
mense.

9. Косоротово. Измененная группа из. Визит на
мелких, изобилии и обилии мелкой мажорной
ноты; на мелкой, мелкой и 4-й минорной; на гласной
ноты, а также, а также, а также. Движение из
на ноты; на изобилии азов. Кос. Из.
Измененная группа.

[illegible]

11 Hydrastis Canadensis. Dicentra variosa. Bai.

ани горючих веществ на пробные горения и изысканиях
нефтевых скважин (Изыскания Пермского, Московского,
Самарского и Архангельского). Переносимые
устройства.

Историческое и Теоретическое.

12. Анализ-испытание. Общие сведения. Изыскания в про-
бных горениях и изысканиях новых изысканиях; изыскания,
1°. Движение из на проб. Пробные скважины. Переносимые
устройства.

Испытание-испытание. Сведения о горении. Движение
на скважине и пробные горения. Переносимые устройства.

Анализ-испытание. Сведения о горении. Движение
испытание-испытание. Движение на скважине. Переносимые
устройства.

13. Синтетическое топливо. Общие сведения - на пробные и на-
блюдения. Пробные изыскания пробных скважин.
Движение на пробных, изысканиях и изысканиях
нефтевых скважин; на пробные скважины, скважины, скважины,
скважины скважины, скважины скважины. Пробные
на скважине скважины скважины, скважины скважины
скважины скважины? Пробные скважины скважины
и скважины. Переносимые устройства.

14. Анализ-испытание. Методы. Общие сведения о скважинах,
изысканиях скважин скважины скважины (скважины)
Движение из на пробные скважины, скважины (скважины
скважины); на изысканиях и изысканиях скважины,

Kogerus. Naegerrum. Naegerus. Mesurus.

- 16 Вопросы социализма. Мировое хозяйство на конке, не-
уравнов. Развитие на конке, на перекрестках
уравновешенности, а также, развитие. Перекрестки
уравновешенности. Развитие, развитие, развитие.

Лихорадка. Возбудителем болезни являются бактерии. Проявляется на ссадины, на кровавые габусы, на ожоги. Протекает обычно остро и быстро. Могут быть осложнения в виде гангрены или сепсиса.

Подобная горючести непереносима. Исходою отбавления не
близкая одна непереносима. Греховность горючести
и непереносима непереносима и непереносима. Мертвосты
и непереносима.

Зачем азона. Обыч горючести. Визити на азона.
Како изобретение непереносима? Давение азона, непереносима
и непереносима. Мертвосты непереносима.

17. Зачем-непереносима. Обыч горючести. Горючести не-
переносима горючести: непереносима непереносима и непереносима
непереносима не. Визити на непереносима непереносима непереносима
и непереносима непереносима; на непереносима, на непереносима непереносима
и 4. Мертвосты горючести. Мертвосты непереносима.
Обыч непереносима и непереносима не. Горючести непереносима.
Мертвосты непереносима.

Параметры. Учтан. Горючести. Мертвосты и
Мертвосты.

18. Горючести непереносима. Горючести на непереносима не-
переносима. Одна непереносима одна горючести, одна непереносима
и? Горючести непереносима непереносима. Горючести непереносима.
Мертвосты непереносима.

Зачем-непереносима. Мертвосты горючести на непереносима и не-
переносима непереносима; на непереносима непереносима непереносима. Горючести
непереносима непереносима, непереносима, непереносима, 4 и непереносима.
Мертвосты непереносима.

19. Зачем. Горючести непереносима не. Визити на непереносима
непереносима непереносима непереносима. Мертвосты непереносима

be rubras opamizno. Marenne gniembi na kony, em
zennia oboron. Obye gniembi (nepena mrenia).
Irenie omgabesii. Mepanbimereke ynompidenie

Kpuzome.

20. Thypocnemis, pezomys u myromys. Irenie
reka opmoga mo. Thiankou. Irenie no npi

mydermyzno mrenia u mepagomereke zubanbania.

Folia mae mbi: gniembymye mrenia.

Thypocnemis. Irenie no. Irenie no na opamizno.
Mepanbimereke ynompidenie.

Thypocnemis a u p.

Thypocnemis. Irenie na opamizno (mpe
mye mrenia, to, mepanbimereke obionto). Mepanbimereke
ynompidenie.

21. Thypocnemis. Irenie na opamizno (mpe
mye mrenia, to, mepanbimereke obionto). Mepanbimereke
ynompidenie.

Thypocnemis. Irenie na opamizno (mpe
mye mrenia, to, mepanbimereke obionto). Mepanbimereke
ynompidenie.

Thypocnemis. Irenie na opamizno (mpe
mye mrenia, to, mepanbimereke obionto). Mepanbimereke
ynompidenie.

22. Thypocnemis. Irenie na opamizno (mpe
mye mrenia, to, mepanbimereke obionto). Mepanbimereke
ynompidenie.

Thypocnemis. Irenie na opamizno (mpe
mye mrenia, to, mepanbimereke obionto). Mepanbimereke
ynompidenie.

мученик утробе.

Борная кислота. Буря.

23.

Буря. Буря это на изгнание, как
моча человека и т. Комплексная кислота, изго-
вание CO² и азотистый водород при брожении муч-
ны. Брожение на мучебных (гниение на хлебе,
хлебах, гниении, хлебах и т.д.)

Мучебная кислота. Буря это при брожении муч-
ны.

Борная кислота. Азотная кислота. Азотная нит-
рат. Магний Бисмит.

24.

Магний. Кислота азотная при броже-
нии в мучебной? Азотная кислота при броже-
нии. Кислота азотная при брожении муч-
ны? (при брожении мучны). Бро-
жение это на хлебе, хлебах и т.д. мучебных,
хлебах, гниении и хлебах. Мучебная кислота
мучны. Брожение гниения.

Cortex radicis Granati. Flores Rubi.

25.

Магний. Магний при брожении муч-
ны. Азотная кислота при брожении. Буря муч-
ны т. Брожение это на хлебе, хлебах и т.д., х-
лебах, гниении.

Магний. Брожение это. Мучебная кислота
мучны.

Rhizoma ylicis maris. Брожение мучны.

9
26. Риане на нелепопобуване. Общи горице на изобилие. Риане на ерже и лубане габение; на брана карбане мана; на перепорнуе габение; на нелепо, б. и нелепо габение. Риане габение.

Lamphora monobumata. Риане габение. De. camphoricum.

27. Безгарибана габение. Лампоре. Общи горице (мание от лампоре). Мана габение на нелепо габение, на нелепо, бране, нелепо габение; на бране б. нелепо габение. Общи габение: на нелепо габение (мание бране и бране); на ерже, лубане габение и габение; на бране габение и нелепо. Бране габение на габение. Риане габение.

Herba Absinthii. Herba Tanacetii. Herba menthae piperitae. Herba valerianae officinalis. Herba chamomillae. Herba liliae. Herba S. semina anisi. Herba. Herba.

28. Риане. Риане габение. Риане габение на бране габение: габение габение. Риане габение на бране габение. Риане габение на бране габение. Риане габение на бране габение. Риане габение на бране габение.

29. Риане. Риане габение на бране габение.

33. Площадный казенный. Обращение помещиков к помещикам. Значение
в то время, означенное в документах, незначимо. Помещики казенные,
неблизко к казенным. Перебродившие из помещиков.

Rach. Senigae u Grillaja Seymouria.

Ученые конференции. Издание на английском языке
есть, на англ., нем., франц. языках, изданы нем.

35. Група. Каким образом она происходит в организм?
Присоединение H_2O на Азот. Термодинамическое уравновешивание. Сре-
дняя вода.

Кураре.

Стрелочный яд индейцев - кураре приготавливается из многих растений см. Структурно. Кураре представляет выделенным из него аморфным алкалоидом курарином (растворимым во воде и спирте и не растворимым в эфире). Действие кураре довольно ограничено: оно поражает почти исключительно окончания двуглазчатых нервов, и уже первые изыскания показали, что парализующий производимый, не распространяется на двуглазчатые центры и первые стволы, а только на самые первые окончания. Впрочем в отдаленных местах парализуются и первые центры.

Синдромный опыт подтверждает сказанное о действии кураре: если взять лягушку (напр. *Rana lessonae*) и проваггировать в ней нерв и затем будем раздражать прерывистыми токами нерв, или лягушку, то получим сокращение лягушки. Если же лягушку будем раздражать непрерывным током, или нерв после отравления кураре, то сокращение мы получим только при раздражении.

ни самой мимусы, но не приращивает
перво. Однако из этого становится совер-
шенно ясным, что парализуется перво.

Но возникает вопрос, где парализуется
перво: до входа в мимусу, или в самой мим-
усе; парализуется ли это перво, которое
имеет мимусову оболочку, или именно
ее, и наконец, парализуется ли генеральная
мимическая пластинка, или наоборот из
этой пластинки происходят первые раз-
ветвления!

Потому кажется, что от гнейсвиза кударе
парализуется только окончание первого в про-
извольном мимусе, а всякая мимическая со-
ловка, не имеющая генеральной пластин-
ки, гнейсвиза кударе не подвергается, застав-
ляя предполагать, что парализуется пластин-
ка.

Но можно быть, парализуя это забв-
ение от поражения того первого разветв-
ления, которое бывает из этой пластинки?

Вопрос этот решается так: если мы возьмем кударизованный Sar-
torius лезвие и подвергнем разное огнев-
е этой мимусе гнейсвиза тогда, то ока-
жется, что только огнев Sarториуса, где пер-

Умалю, все это, безусловно ясное, прояв-
лено в вопросе в том смысле, что именно
органом, подвергнувшись насилию от гни-
ения кура, является государственная машин-
ка.

Но мож. быть, развивается и сиринг. стеноз? Это это не так, доказано можно анат. образом: оторван ~~артерия~~ у лягушки п. ichthyodermis и в то же время перевязана у нее арт. femoralem в подкожной артерии. Временные затеняются лягушки в анатомический микроскоп курае, и в состоянии аорты и артериях в виде в виде отрезков, за которыми остаются мышцы перевязки. Если разрезать мениск п. ichthyodermis, то в перевязанной части можно наблюдать сокращение мышц; значит, сокращение самого стеноза ichthyodermis не переносит разрывания не нарушена; но так как первоначальное разрывание, оторван от него до перевязки артерии поразившая аорта, то сокращения до места перевязки артерии не наблюдается! Мало того, оказывается, что

у лангетки, при такой обстановке опыта, можно получить газы распада с одной стороны на азот, и с другой на то, что сами центры оживаются азотом.

Особенно удобительным для доказательства того, что происходит не первый сток, а первая оканчивая, является опыт Кн. Тернари. Он взял два равных стекла, наполненных раствором купры и поместил в каждую по минеру с палочкой при ней первой, но при этом так, что на первом стекле была погружена в раствор минер, и оставался свободным перо, а на втором наоборот.

Когда Кн. Тернари раздвинул перо минеры, оставшей на первом стекле, то оказывалось, что минер не сокращался, хотя перо и не оживалось азотом. Во втором случае, хотя само перо и была пропитана купры, он все таки сохранял способность пригибать раздвигание, и раздвигание не вызвало сокращения минеры. Но когда устанавливалось, что во первом случае минер не сокращался или наоборот же, то это был парализован непосредственно и самое, или не, что парализованы были отходы

отъ стволу первона разорывания. И гнѣ
снѣтнѣе, когда онъ разбрасывалъ аминѣ,
то сокращеніе надвигалось, и такъ. вѣр. нѣско-
лько парами аминѣ.

Теперь обратимся къ вопросу: пораня-
ется ли курае, погодно окончаніемъ форми-
тельныхъ переловъ, и чувствительны ли нѣ?
?

Нимногочисленные случаи отравленія курае
изогнѣ, хотя и показываютъ, что сознание
и чувствительность при этомъ не наруша-
ются, но факты эти не являются абсолютной
убѣдительностью потому, что самая глаза
легко была однократно не абсолютно извѣстно
на. Вспомогательные же въ этомъ от-
ношеніи опыты, сдѣланный въ первый разъ
Кв. Бернаромъ на курае язычковой. Опытъ со-
стоитъ въ томъ, что язычку перебива-
ется такъ, что передняя часть ее приподни-
мае отъ основания отъ заднихъ, а задняя и
выпрямляется довольно крутой разворотъ
курае. Когда это, приподнявшись въ
перебазанной части приподнима, произведетъ
свое дѣйствіе (что извѣстно потому, что ко-
гда язычки опускаются книзу, тогда и за-
крывающа, а передняя часть невольно
остановится разставившись въ сторону), то на-

Мановѣ абенія, бузубаеніа въ описаніи,
вбегеніа въ нро кнзаре.

Если газы куражи становятся ос. значительными, то в организм попадают замкнутыми и другие более сложные вещества: кровяное давление падает (это обусловлено, по всей вероятности, паразитическим сосудо-гипертоническим перелом); может возникнуть н.п. увеличивается; 4° в первое время повышается, очевидно, белокосное сокращение сосуда в кожном, а затем и в прозо падает; у людей выделение уменьшается: выделение из носа, уменьшается отнюдь из носа, равно как уменьшается и количество выделяющейся мочи, причем в почках не выделяется сахара (если ли это выделение сахара физиологично или

опищского двойствия кураре, или, может быть, оно обуславливается двойственным кураре, как монотонного, пока не выяснено)

Данные наблюдения (Памутина, Паранова, Дроздова, Лещенко и в последние время Михальсона) показали, что кураре обладает монотонным двойствием.

Газовый, при отравлении кураре, падает несомненно низко, так что только самая низшая доля кислорода, сравнительно со его обычным потреблением, идет окислению, и даже животные как бы находятся в летаргическом сп. сердце сокращается слабо, дыхание отсутствует.

Остается сказать еще несколько слов относительно двойствия кураре, введенного в организм не прямо через кровь, а пер ос. Действие кураре в этом случае оказывается более слабым. Зависит это от того, что адр разрушается вл желудка и ферментами кишечника; или во 2) может быть, кураре быстрее всасывается почками, и лишь частично из желудка, всасывается во в крови и не получает того оптимального двойствия кураре, какое нужно для

приведения первою въ состояні парализа.

Второе приращение должно считать болѣе вѣроятнымъ въ виду того факта, что пилуф-ина, у которой арт. каналъ перерванъ, скоро помираетъ отъ того количества кукрае, выходящаго въ мундоко, которое легко переноситъ безъ этой перевозки.

Это обстоятельство указываетъ на значеніе того, или другого состоянія въ отправленіи пищи при дѣйствованіи сильно дѣйствующаго вещества.

Что касается терапевтическихъ примѣненій кукрае, то въ этомъ отношеніи кукрае значенія не имеютъ. Правда, были попытки примѣненія его при спазмахъ, а также при энтеритѣ, но безвѣдно употребленія при этомъ случаевъ кукрае все-таки не имѣлось. Объясняется это съ одной стороны тѣмъ, что для указанныхъ выше случаевъ терапия имѣетъ въ своемъ распоряженіи болѣе вѣроятныя и болѣе дѣйствительныя средства, а съ другой стороны и самимъ кукрае является препаратомъ нечистымъ и не имѣющимъ опредѣленнаго состава.

Кромѣ кукраина кукрае содержитъ еще кукринъ (Boekm) — вещество, не обладающее свойствомъ кукрае, но дѣйствующее на серффе
• перевозанъ

(Julie 1890)

Conium maculatum.

Conium maculatum — наркотический яд, при-
надлежащий к яду макушки лекарственных
бифесов, употребление которых было извещено
уже в древности. Сократ был отрав-
лен им. Другая указание на то, как
на поминание по поводу погребения, нахо-
дятся у Платона. Плиний утверждает, что яд
изготавливается из семян и корней. В 1761 году
Störck (в Brecht) издал трактат о яде
омерз.

Древние яды на основании почти анало-
гично макушке на кувшине; хотя в древности
яды это парализует не только окончания
двигательных нервов, но также и чувствитель-
ные; окончания чувствительных нервов
парализуются особенно при сильном употребле-
нии.

Употребляется яд, хотя и особенно редко,
как болеутоляющее (напр. при боли мышц)



Воздухоносные ады.

Когда мы имеем воздухоносные ады различны-
ся такие вещества, которые, будучи выданы
в организм, в высшей степени возбужда-
ют отправления центральной нервной си-
стемы. Это все явные действия; но дей-
ствия это не единственные: ады эти, и во-
зможно скрытые, возбуждают не только ген-
еральные центры, но и самые перифериче-
ские ланганы, возбуждают, дамы,
мелкую мышечную ткань и даже лигнелю.

Понятно, что ады эти, какъ ценнѣй-
ше жизненные процессы, имеютъ большое
значение и заслуживаютъ подробнаго изу-
чения какъ в фармакологическомъ, такъ
и терапевтическомъ отношеніяхъ.

Слѣдуетъ по тому, что наблюдается
первый стадіи возбужденія, при употребле-
ніи этихъ адовъ, они могутъ быть раз-
дѣлены на 3 группы:

- 1) Ады, дѣйствующіе преимущественно на
спинной мозгъ;
- 2) Ады, дѣйствующіе преимущественно на

преобладающий мозг;

3) Язы, двисловушье преимущественно
на головной мозге.

Изучение судорожных ядов мы начинаем
со стрихнина.

Стрихнин.

Для изучения влияния стрихнина на нерв-
отомный организм мы поставили два опы-
та: один с плазматическим животным,
(лягушкой), другой - с теплокровным (собакой),
и затем попытаемся разобрать и дать
объяснение тем явлениям, которыми сопро-
вождается отравление стрихнином.

В первом опыте лягушка выдана
в аморфический порошок 0,0001 гр. стрихни-
на; при этом мы наблюдаем следующее:
В самом начале отравления лягушка си-
дит покойно и постоянно моргает; затем
поступает усиление рефлексов: ма-
лое прикосновение вызывает подергивание лап;
лягушка старается перевернуться мордой, но
движения ее не совсем обычные: конечности

напряжению и разетавлению непрерывно, на-
бавительная перепонка значительно раста-
нутой; лангунка не прыгает, а естается
показом; скоро наступают Силкий приступ
кловнической судороги, который сменяется по-
коем. Покой продолжается впрочем недол-
го: скоро начинается новая выразительная
приступов. Вскоре продолжительнейшей судороги,
интенсивная уже характере столбняка, а
затем, после краткого периода покоя,
второй удар (сострашения) по столу, на-
ступают полный столбняк (tetanus); го-
лова лангунки отклонена вперед, задние ко-
нечности вытянуты и не способны сдвигать-
ся в естественное; движения нет. Такой
столбняк продолжается долго, или менее
продолжительные время в зависимости от
введенной дозы стрихнина. Улзгун-
ка наступают продолжительные покоя, со вре-
мя которых животное издает мурмурный
по новой раздражение вызывает снова столб-
няк. Наконец судороги сменяются по-
льным параличом центральной нервной си-
стемы и окончаний двигательных нер-
вов.

Во втором опыте, после выработки
вены морфинизированной собакой 0,002 гм
стрианина, наблюдаются следующие соба-
ка беккаивается, онемевает, как бы
пропадает от морфинного онемения.
Но затем она скоро ложится; удары по
спине вызывают рефлекторные сокраще-
ния конечностей и вздрагивание всего туло-
вища; рефлексы эти угасают, наступ-
ляет судороги клонического характера,
и затем ступор: ноги ее вытянуты,
глаза на выкате и не подвижны, из рта
течет пена, зрачки судорожно сжаты, го-
лова сильно запрокинута назад.

Если доза стриианина не особенно велика,
то собака может много оправиться, но
достаточно резкого звука свиста или ме-
ткого стука в лапы, прикосновения ко
желудку, а также получения второй сто-
пы, после которого может наступить
опять некоторый перерыв, и наконец, со-

функций приступу столбняка может
быть существенное значение.

Откуда зависят эти явления? На ка-
кой именно стадии функционального аппарата
происходит акт?

Если у лягушки предварительно отклю-
чить проглатывательный механизм мозга от спин-
ного и затемнить вырванному спинному, то
эта предварительная операция не устранит
наступления столбняка.

Перевязка артерии, питающей конечность,
также не предотвращает развития судорог
в этой конечности. Но перерезка ганглио-
ного нервного сплетения тотчас прекращает
судороги.

Вывод из этого факта может быть
только тот, что акт поражается не голов-
ной мозго и не периферический окончания
нервов, а та часть нервной системы, кото-
рая находится между головным и прола-
торным мозгом с одной стороны и
мозгом в основании головного мозга
с другой стороны, т. е. таме мозга, в
данном случае поражается спинной
мозг.

Но на какие элементы спиноного
мозга действительно спинальному непосредствен-
но?

Многие исследователи, по этому по-
воду, высказывают различные мнения.

Одни полагают, что спинальное спиноное
мозг возбудительным образом на функции
и клетки спинного мозга.

Другие исследователи, придерживаясь того
мнения, что спинальный нерв развивается,
или головной и продолговатый мозг от-
деляется от спинного, думают, что это
объясняется несколько иначе, а именно,
что спинальное раздражает задерживаю-
щие спинные центры.

Третьи представляют дело еще несколько
иначе: они полагают, что спинальное
спиноное в том направлении, что
ускоряет передачу импульса от возбуж-
денных клеток, находящихся в спин-
ном мозге, к мозговому и ганглионному.

Но такие как опыты показывают,
что с одной стороны задержка рефлексов
наблюдается и при удалении спинных
центров, а с другой стороны возбудитель
показывает, увеличивается он, при раздражении

стрианином, Гренновские центры, или наоборот устанавливается связь между чувствительными и двигательными клетками (по крайней мере истологические отчасти после отравленными клетками не дают никаких результатов), то вольновольно парамколовы склоняется в настоящее время к тому утверждению, что стриями возбудаются ганглиозные клетки, находящиеся в строном беломом переднем роге спинного мозга.

Непосредственное раздражение спинного мозга лагушки электрическим током вызывает спазмы, между тем как раздражение тем же током продолговатого мозга дает судороги клонического характера. И это обстоятельство также до некоторой степени может служить доказательством в пользу преимущественного воздействия стриями на спинной мозг. Как бы то ни было, судороги, вызываемые стриями, имеют резко выраженный рефлекторный характер.

Изучим теперь действие стриями на продолговатый мозг и прежде всего рассмотрим влияние его на сосудодвигательный центр.

Все яды, действующие на изменение кровяного давления, или порождают только сосудо-дilatационный центр, или же действие их распространяется и на ниссе-дilatационный центр спинного мозга.

Но чему каковы же яды принадлежат стрессинг?

Для решения этого вопроса, собаки средней величины мы вправляем предварительно куклу (чтобы предотвратить появление стрессинга, который может оказать влияние на изменение кровяного давления), а затем вводим ей 0,002 раствора стрессина. Через несколько секунд кровяное давление поднимается чрезвычайно высоко (выше нормы) и держится на этой высоте продолжительное время. Теперь отнимаем проглазговатой мозг от спинного. Давление, после перерезки, падает сразу почти по вертикальной линии, и уже новая доза стрессина повышения кровяного давления не вызывает. Из этого мы заключаем, что стрессинг возбуждает исключительно центр, лежащий в проглазговатом мозгу, и не оказывает заметного влияния на ниссе-дilatационный центр спинного мозга.

Продолжение

Во втором опыте с кровяным давлени-
ем у собаки был отмечен прогнатованный
мозг от спинного за несколько минут до
оплошности и затем вприсынутое снупанье.

При этом у собаки кровяное давление не повы-
силось, между тем как судороги наступили.

Следовательно, аппарат, возмущение которого
ведет за собой повышение кровяного давления,
лежит в базе перерезки (в прогнатованном
мозгу), а при этом, возмущение которого вызы-
вает появление судорог, — ниже перерезки
(в спинном мозгу).

Изменение кровяного давления, в связи
с значительным повышением (в нашем опыте
с собакой давление выросло до 144 мм. ртут-
ного столба до и 310 мм. после вприскивания
снупанья), представляется, м. бр., вторичным
явлением, наблюдаемым при отравлении снупан-
ном. Наша задача, в данном случае, бу-
дет состоять в том, чтобы выяснить, что
является фактором вызывающим это повы-
шение, т. е. обуславливается ли оно уменьше-
нием тонуса сердца, или является результатом
сокращения сосудов.

К первому вопросу разницы артериаль-

они относятся различно: одни совсем благодаря
малому вопросу о границах сращения на
сердце, другие признают его во сращиваемо-
сти, иными, тем же признаком, как и это
подтверждением и подтверждением кинематическим,
что сердце тонизируется, т. е., что ссра-
ние во совершается эрихтисом. Нужно замечать
также, что вилание сращения на
сердце зависит от величины самой глыбы
ада. Малая глыба несколько замедляет ссра-
жение ссражения, при большой глыбе повто-
рится замедления сильное ускорение ссра-
жения.

В качестве доказательства того, что
границы сердца уменьшаются под влия-
нием сращения, можно привести опыты
Рункина, которые состояли в ссражении:
он вскрыл грудную полость собаки, у ко-
торой предварительно был отрезан про-
дольный мост от спинного и передне-
го изгибов первой, разрезавшись сердечную
воронку вверху и края ее пришиваясь к краям
отверстия грудной клетки.

Обыкновенно на набухшую сердцу удержива-
ется небольшой стеклянный цилиндр с свободной
двигавшейся во нем ссражением и пером,

нервно-мускульную систему на закон-
ной основе. Если двустороннее сердце пред-
варительно узнано, а именно, и потому
зубчатому вырывается ступень, то
сердце, не смотря на перерыв, продолжатель-
но и в дальнейшем и.н., начинает уст-
раиваться, а разная часть сокра-
щений становится свободной. Движение ступа-
нина на сердце (своеобразно выражение в сво-
ей двусторонности) не происходит, следовательно,
но, никакому сокращению. Таким же образом по-
вышение кровяного давления под влиянием
ступенки нельзя отнести на счет умень-
ной двусторонности сердца; но крайний случай
в том случае, когда ступенка выдвигает
нормальную функцию, а не наоборот, в кото-
ром случае. Ибо, если мы предварительно
не перерываем ступенки, то перерываем
н. Splanchica, то повышение кровяного давления
не происходит, хотя движение ступенки
на сердце в этом случае и не уменьшается.
Следовательно, заключаем мы, под влиянием
ступенки сокращается только та часть,
которые иннервируются указанными нервами,
т.е. артерия брюшной области, а не все
артерии тела.

Кровь из внутренних органов устремляется ^{на периферию} к периферии и обуславливает то явление кровотечения из ран, которое мы наблюдаем при отравлении стрихнином.

В связи с кровообращением тесно стоит, как известно, и изменение температуры, а потому, раз стрихнин влияет на кровообращение, то мы должны ожидать, что влияние его, так же, как и анале, отразится и на температуре тела отравленного животного.

Какие же изменения в можно наблюдать в данном случае?

Оказывается, что здесь может быть, как повышение температуры, так и понижение ее. Первые наблюдаются тогда, когда мы видим явление судорог (которыми сопровождается и вызывается это повышение), вторые же тогда, когда судороги будут устранены (напр. введением кураре). Понижение температуры в пострадавшем животном становится совершенно полным, если мы вспомним, что кровь из внутренних органов устремляется к периферии, а вследствие этого, как известно, должна уменьшиться и теплоотдача.

Кроме возбуждения судорожно-гиперемического

центра, изъясняя необходимость при отправле-
нии срочных, немедленно отпустить ва-
гон на главный центр. Но иногда
законом это решение государственного
центра, немедленно проформировано
поэтому парализовать работу (это
государства, вверженное анархии, или анарх-
изма); в противном случае наступит
стойкость, и акция гласия будет не воз-
можна. Даже при проформировании могут от-
лучаться от центра, но и тогда, после
ввержения срочных, работы гласия не-
сколько государственного движения, обусловленные
возбуждением государственного центра,
находящегося в ступорной позе.

Что касается государственного центра
общего вида (независимые центры), то
многообразие признаков в этом отношении
можно рассмотреть: тогда как один центр
имеет такое же влияние срочных на указан-
ные виды центра, другие полагают, что он
помогает на государственность, а не на
нижестоящих, государственность эта возбужда-
ется. На основании в подобных разномыслиях

млекопитающих, замечено только, что
все они работают с известными поруче-
ниями, вводят стриженым или прямо в
кровь, или скармливают или мозговую кору.
Опыты Гункевича показали следующие:
он вводит собаке алкоголь и вызывает
состояние двигательных центров; угнетение
последействия алкоголя производится до того
пока, пока прерывистый тонус совсем не
вызывается, при раздражении центров, сокраще-
ния соответственных конечностей. Пытаясь
это он вводит собаке камфару, кото-
рый вызывает возбуждение двигательности центров,
но возбуждение это скоро опять падает. Если
не вводить собаке стриженым, возбужденность
быстро падает. Опыты, т. е. др., как
бы подтверждают мнение о возбуждении центров.

Но против этого опыта можно было со-
лгать по возражению, что сами центры, может
быть, и не возбуждаются, а все дело ограни-
валось только тем, что уменьшалась спо-
собность проводимости в спинном мозгу.

Однако дальнейшие опыты Гункевича по-
казали, что и центры, возбуждения движений
было, также evidently возбуждаются стриженым.
Следовательно, с введенным долом было

относительности или иными правами при этом по-
тому заключено, что стрессовые возмуща-
ются психоэмоциональные центры непосредственно.

Восприимчивые нервные центры, при отрав-
лении стрессовыми, возмущаются значи-
тельно. Мыслительные способности, по вы-
сшему, ухудшаются: всякая умственная рабо-
та совершается гораздо хуже.

При отравлении стрессовыми, душевный
тонус резко падает, и человек чувствует
приступы чрезвычайной тоски.

Это касается окончаний чувствительных
нервов, то результатом влияния на них
стрессовых является то, что чувствитель-
ность кожных нервов у человека резко
повышается. Полное асептическое состояние ста-
новится гораздо хуже, для естественной сопротив-
ляемости в продолжение 24 часов и более. Это
явление стрессовых может окончательно
прекратить только на 6^{ой} день. Острота зря-
ния также повышается. Обоняние ухудша-
ется не только острота, но изменяется и ка-
чество, причем дурной запах кажется
и столь противоположным, как при обычных
условиях. Вкусовые органы во рту налива-
ются даже при самых минимальных дозах

спринжину. Справа также изображена

Влияние спринжину на мозг.

Здесь мы рассмотрим влияние спринжину на чувствительность почек, панкреатической железы, печени и спинного мозга.

Известно, что для нормального оттока мочи необходимо известное давление кровяного давления. Если почкам между прочим, после перерыва продолжительного мочеотделения почти прекращается.

При излучении влияния спринжину на мочеполовую, и почечную систему мочеполовую, в нас вызываются трудности, которую артерию почечного соединяют с мочеполовой кишкой и на кривой, изображающей кровяное давление, отмирает количество мочи, соответствующая изотонному кровяному давлению.

Вот и все главные различия опыта по данному вопросу.

Если мы будем определять одновременно кровяное давление и количество мочи, вытекающей из мочеполовой в единицу времени, - мы заметим, что наибольшая точка равновесия кровяного давления (под влиянием спринжину) совпадает с полным прекращением

кровообращения

мощного племени.

Если предположительно отнять прагматический мотив от его сущности, или ввести симметричную реакцию мирной-идеи (окалационной, или парализующей сосудо-гематический центр), то стрессовый уже не только не ограничивается, но, наоборот, увеличивается мощное племени.

Почему такой же эффект получается и в том случае, когда удар из уровня н.н. переносится (при условии прагматического мотива), т. е. количество лопи из точки, связанной иннервацией, резко ограничивается стрессом, а удар точки на стороне перенесенного уровня перед, наоборот, является увеличением.

Отсюда мы заключаем, что ограничение мощного племени под влиянием стресса не есть результат непосредственного воздействия стресса на отолитовые элементы нерва, но это явление зависит от силы сосудово-гематической полости (см. выше), а прагматически, и сосудово-нервной, - ответственно, которое и обусловлено резким повышением кровяного давления.

Таким образом, рассматриваемое явление есть

результатом загроможденного кровообращения в
печень вследствие спазма печеночных сосудов.
Это обстоятельство наиболее доказывается в
том случае, когда печеная вена отключена
и в ней не наблюдается канюля. Введение сприн-
жа, в момент появления кровяного габитуса,
до такой степени загромождает печеное крово-
обращение, что вытекание крови из вены
почти прекращается. Спонтанно развивающ-
ийся спазм, как следствие спазма печеных сосудов
геморрагическо-гипертонического в предсудорожном состоянии,
может из печенной вены вызвать паралич крово-
тока.

Итак ясно и то не секретно можно ска-
заться и ограничивающемся кровообращением и
мочевым в зависимости от того или
другого состояния предвостан артериального
давления (печеных сосудов геморрагическо-
гипертонического)

Следовательно, если мы будем иметь забо-
левание, при котором сосуды брюшной пол-
ости расширяются, при этом кровообращение габитуса
и спонтанное количество моче почечного притока
понижается, то спринж, в известной мере,
может оказывать мочевым средством.

Периодическое исследование
состояния по панкреатической функции.

Изучение этого вопроса в 1893 г. англий-
ским врачом г. Ариксонским (в изд. Павло-
ва) и ирландским доктором Томлинсом. Основаны
эти исследования на различных резуль-
татах.

Исследования панкреатической функции в хроническом
оппортунном и измученном состоянии выделительной
системы за определенный промежуток времени,
Ариксонский находит в среднем из опи-
санных исследований: сначала выделение равносильно 3,1 с.с.
сока, в субдугальной равной промежуточной 6,9 с.с. и
затем опять 6,9 с.с.; после введения дозы азотно-
кислого стрептогена при 0,5 дозы получено
исследования: 7,9 с.с., 6,8 с.с., 2,1 с.с., 3,2 с.с., 5,2 с.с.,
5,2 с.с. При введении малых доз стрептогена
под кожу, какого-л. характера Ариксонский
не получает сведений, но на основании первого
опыта он заключает, что стрептоген повышает
отделение панкреатического сока.

Недостаточность опытов Ариксонского
состояла в том, что он не учитывал в
виду то существенное сокращение выделений,
которые неизбежно вызывается стрептогеном,
а потому естественно, что не употребляет и

срѣдствѣ для преобразованиемъ изъ сна.
Движеніемъ, у Томира, при иномъ
обстановкѣ сна, получены и иные резуль-
таты. Проводимъ зрѣло то, что иномъ
Томиръ въ остромъ изъ сна сна:

Количество напр. сока
за равные промеж. врем.

2,6 с.с.

2,6 с.с.

2,3 с.с.

2,0 с.с.

1,9 с.с.

1,6 с.с. {

0,9 с.с. {

0,8 с.с. {

0,4 с.с. {

Кровяное
давленіе

96 м.м.

90 —

96 — Стр. $\frac{1}{4}$ м.м.

100 — Стр. $\frac{1}{4}$ —

110 — Стр. $\frac{1}{2}$ —

160-170

180

Изъ этихъ данныхъ видно, что въ то время
какъ у нормальнаго зубатнаго количества
высказывалось напреженическое сокъ за опре-
деленный промежутокъ времени равнялось
2,6 с.с., а кровяное давленіе выростало 96-90
м.м.; при введени снѣжанна у того же
зубатнаго количества сока, наметено нагладъ
до 0,4 с.с. и въ то же время кровяное давленіе

погружалось до 180 м.м.

Но когда Томидъ ввертывался в
панель-нагнетатель, и кровяное давление стало на-
гнетать, то он получил следующий:

Кров. сока

Кровяное давление

7,0 с.с.

76-56 мм.м.

8,9 с.с.

56-44

9,0 —

44-25

7,3 —

12-10

Прозное падение давления сока с 9,0 на 7,3
объясняется, конечно, тем, что при давлении крови
было уже слишком низкое, а это говорит
о том, что организм, отрегулировавшись на данную
степень жизни. И действительно, когда давление
не опускалось до 25 мм.м., то и Томидъ
получал 10,0 с.с. и даже более панкреати-
чески сока.

Следовательно, при кровяном давлении не
слишком высоком, но и здесь организм спо-
собствует выделительной функции, или, как
не способствуя, то ни в каком случае
не ограничивается.)

Почему именно, выясняющий влияние
стресса на функцию печени, то; но
Рейна подвигает значение отклонения
жизни во время повышения кровяного давления

отъ стриганина. Провиантъ набивуясь
то же у кураризованнаго предарнико
собаки (Vulpian. Les Substances tarques de. p. 519)

Насколько, что касается отгнания сви-
нной желчи, то оно сильно уменьшается
послѣ билиарнаго стриганина.

Еще кураризованной собаки вывели от
Вартонова протокъ желчи, но это можно
заключить изъ наблюдений свиньи какъ
разъ по время нагнания кровавого галленна
(Vulpian.)

Это уменьшеніе отгнания свиной можно
объяснить прежде всего тѣмъ же причиною, ко-
торая вызываетъ уменьшеніе кровоотеченія изъ
кожного сосуда послѣ введенія стриганина,
т. е. расширеніемъ периферическаго сосуда.

Вліяніе стриганина на желчный
и почки.

Мало какъ стриганинъ способствуетъ
вытѣсненію протѣкающей изъ почекъ
мочи а priori можно было бы думать, что вы-
тѣсненіе желчного сока, при введеніи стрига-
нина, значительно понижается. Однако, про-
изведеннаго изъ желчи галленна галленнаго вопро-
са, надѣясь извѣстнаго не было, но то, кото-
рое произведено было надѣясь извѣстнаго и во-
вѣ

наши опыты, показали, что стрихнин, напротив, усиливает отугление сока, но усиление отугления наступило не сразу, а через 6-8 суток после начала его употребления. Приведем здесь данные по этому вопросу, взятые из работы Тамнера.

Давая совершенно здоровому животному стрихнин, Тамнер нашел, что нормальное отугление мышечного сока таково:

До введ. стрихн.

Сутки 6-8 дней
после пр. стрихн.

у одного	70 с.с.	160 с.с.
у двух	20 с.с.	180 с.с.
у третьего	60 с.с.	140 с.с.
при интрукции	370 с.с.	450 с.с.
при судорогах		
катариса мышца	25 с.с.	40 с.с.

Так как это усиление отугления могло произойти и на счет излития воды (в мышечном соке), то Тамнер произвел особый ряд анализов на кислотность сока и нашел у одного, напр. до того 0,127%, у другого 0,138% до введения стрихнина и 0,177% у первого и 0,183% у второго после введения стрихнина (при судорогах

катарры стрипанно не давало повышения кислотности)

Не соответствует этим результатам, Тимпер произвел анализ ряда количественных определений свободной НН в мышечном сок (также как повышение кислотности сока после ввода в организм и НН, но молочной кислотой) и нашел следующие:

Количество НН до введения стрипан.	Количество НН после введения стрипанна
у здоровых 0,126%	0,176%
" " " 0,129%	0,181%
при интрукр. 0,215%	0,248%

При отсутствии катарры увеличения НН не наблюдается.

Исходя из выше описанной способности желудка, а также бактериальной, Тимпер нашел, что стрипанно понижает желудок и вызывает всасывание.

Понижающее же действие проявляет стрипанно по отношению к кислым и молочным пузырям. Таким образом, впрочем, такое действие стрипанна на кислые, до сих пор не выяснено: перерезка нервов, но крайний случай, ^{не даем} озабочивающего характера, в виду, очевидно, того, что кислые и молочные центры

не функционируют

свои собственные.

Терапевтическое употребление стрих-
нина.

Изъ свойств характерных судорожного
агента и изъ того что известно о свойствах и свойствах
нашъ видимъ, что стрихнинъ есть веще-
ство, вызывающее различные жизненные процессы.
Следовательно, онъ долженъ быть показанъ
въ случаяхъ возбуждающаго при коматозе,
состоя гнательности сердца, всякого гнатель-
наго и гнательнаго действия и гнательнаго
для продолжения жизни. Правда, до сих поръ
применяли судорожное, кинизирующее и др. свой-
ства и гнательнаго вещества употребляютъ его, но это
въ томъ, что стрихнинъ можетъ возбуж-
даться и гнательнаго на гнательнаго свойства,
и не только при гнательнаго.

Если же будутъ возражать, что терапевти-
ческие дозы не вызовутъ, можетъ быть, то по-
вышения гнательнаго свойства, какое наблюдается
при гнательнаго, то и на это мы
должны будемъ ответить, что такой взглядъ
на гнательнаго стрихнина не веренъ. Опытъ
Андреевскаго и некоторых кинизирующихъ
показываетъ, что терапевтические дозы повы-
шаютъ, но все въ гнательнаго, можетъ быть

состоянии, не вызывая удара. Можно также, по субъективной чувствительности, дать понятие и тонуса сердца, и силой легкого тогда не будет несомненно неприятного напряжения легких.

Что касается лично нас, то нам кажется, что при остром припадке болезни, наз. возбудительной (при коматозе), необходимо много во время болезни нас вызывать к некоторым первичным функциям.

Одни болезни возбуждают некоторые функции мозга и сердца, но одновременно с этим двоякостью функций происходит до полного парализа сознания. Следовательно, кратковременное возбуждение может в результате привести к неправильному виду.

Другие болезни возбуждают медленные и слабые первичные, но возбуждение, вызванное ими, длится более продолжительное время, и это возбуждение не приводит к некоторым функциям.

Далее необходимо принять, что степень и продолжительность возбуждения первичных функций зависит также и от нас предварительного состояния, т.е. необходимо предположить, что или какой-нибудь функции находится

в состоянии ослепленной гнательности (команд)
в агонии агонии от ага брочно-тигрозного;
в брочно-агонию, в тигрозно-агонию,
но естественность такого центра в воз-
мужении подв брочной агонии и тигрозно-агонию
возмужающего брочной брочной развита.

В состоянии агонии, при командной от агонии
множественная агония естественная брочной
повышается брочной агонии, естественная
гнательность гнательности и агонии. Но ес-
ли естественная агония в командной, возмужающей
гнательности агонии агонии, то повторные
введение естественной агонии короткой промежут-
ки времени не только не уменьшает состояние
гнательности, но, наоборот, увеличивает состояние
командной и естественной брочной агонии это не-
большое в брочной развита.

Эти естественные вопросы брочной, брочной ко-
торую агонии брочной командной брочной,
есть не естественная брочной агонии и, агонии, до
брочной и агонии брочной брочной агонии
командной, брочной брочной, о брочной
гнательности естественности брочной агонии
при брочной агонии.

Что касается естественной в агонии,
то возмужение, возмужение и агонии агонии

воткнув, Держунца вела проглатывающая
спина, медузу только как-то другие удорожные
яды (пикриновое, NH_3 и его соли) употребляют
(парализуют) центральную нервную систему
всего организма животного.

Вот примеры употребления снотворного
в качестве возбудителя:

1) показание. При брюшном тифе (американ-
ский врач Керманс в сочинении, опубликован-
ном в 1895 г., сообщает о том, что из 54
случаев было выздоровевших *Statu typhosi*,
что уже при первом вводе снотворного, через
два часа в 3 случаях, при вводе дозу
больной умирал от менингита и габс от
перепарализации тканей)^(*)

2) показание. При параличах (в состоянии
по Нанкин'у, при гипотермическом и си-
мультанном)

3) При запоре.

4) Как средство Stomachicum (медуза)

5) Как мотильное средство кишечника и мочевого
пузыря.

6) При спазмах желудка ^(*)

^(*) Доза, которую габс Керманс перос, не сообщал, но
концы. Доза была 2-3 мгм.

^(*) Бреннес при лечении дозах обильным габсом
1-2 канн на прием 7-ми *Strychni*.

Дозы сироповина и со сгущением
препарата.

Максимальная доза сироповина, гонимая
нашим препаратом, 0,006', при этом масса
доз, можно дать дозному 3, что составляет
0,018' (в сиропе)

Из сгущения препарата сироповина
наиболее употребительны миски, напр.

Rx. Starch. nitrici

0,05

Solve in aqua gelida
acida

Pulu. liquor

Extr. liquor. aa. q. s

ut fiant pilulae N 25
ds.

Максимум сироповина употребляют по 1-2
уносу и берем. Этого можно получить
при этом, что сироповина сироповина
сироповина в сироповина, а поному, что
не сироповина сироповина, сироповина
макс: сироповина, напр., сироповина в сироповина
ни сироповина сироповина, а поному сироповина
сироповина и т.д.

Для приготовления сироповина сироповина
применяется в количестве 1 мгм на сироповина
пир.

Rp. Strychn. nitrici

0,01

Aq. destill. 10,0

M. D. S. По 1 капсуле под язык

(Смесь по надобности можно приготовить
растворив в 10 мл воды 0,01 г стрихнина
и газа вытесненного углекислым в камере
и вращении (первый прием газа mixture
взять из препарата уксуснокислого брома).
напр.

Rp. Strychn. nitrici

0,02

Aq. destill.

20,0

M. D. S. По 15 н.

на прием (1)

Rp. Strychn. nitrici

0,03

Succi liquor.

Pulv. liquor. aq. q. s.

ut fiant pilulae N 30

D. S.

Добавить углекислым газом и смешать
смазанная, газом вытесненным, 0,045

Rp. Extr. Strychni

0,3

Succi liquor.

Pulv. liquor. aq. q. s.

ut fiant pilulae N 30

D. S.

(1) необходимо помнить, что в 1,0 воды содержится
от 15-16 капелек. Смесь, если не надобности по 15 н.

Медалью, выдана из уважения, но
своему достоинству не оправдан совершенно
академическим списанию.

После некоторого отдыха, наступает вто-
рой приступ, более продолжительный, затем
3^{ий}, и снова из таких приступов убыва-
ет отравленного животного, или же смерть
наступает от истощения центральной
нервной системы.

Первои загареи впраа в дааном сугав
на приеи, то в 20,0 вави зугеи 20 приеи и. с. м.
в каигои приеи з.д. савркамбав 0,001 сирани-
на приеи зугеи.

является быстрые промывание желудка посредством
желудочного зонда и ослабление судорог введением 0,4-0,6
морфин-идрата или непосредственно под кожу
или в правую кишку (в кровь вприски-
вать морфин-идрат не рекомендуется, чтобы
не получить свертывания крови). Помимо ослаб-
ления судорог ^{важно} также еще и помнить, что, ус-
ливая асфиксию, она только самым спо-
собствует введению стрихнина через почки.

Микротоксин.

Это инфузориальное животное есть гвием-
оний начало растения Аманута Cocculus
(3. Menispermum. Cocculus) и по своему наруж-
ному виду представляет кристаллический
блестящий порошок, трудно растворимый в воде
и хорошо — в спирте. Сравнительно давно
известный, как средство для отравления рыбы
и для приготовления приятной горечи табаку (то и
другое законом воспринимается), микротоксин
только недавно был извлечен из аризонско-
го и до сих пор не получил еще права
гражданства в медицинскую практику.

Поэтому стрихнину, микротоксин представ-

Родосенс

насто судорожный акт. Период вбегания рта во время судороги наступает значительно позже, нежели при спазматике, резко отличающейся в то же время по своему характеру от судорог, вызываемых спазматиком. Судороги эти настолько своеобразны, что Luchsinger не без основания называет их спазматическим "удивленным актом".

При отравлении микротоксинами, на животном (ла-
рушка) можно проследить следующие стадии ~~судорожного~~ ^{спазматического} первого из них имеет характерные наклон-
ности животного к совершенному покою: ларушка,
которой выписывается микротоксином, сидит непод-
вижно и несомненно реагирует на раздражения (отме-
нивая лару поднимается от земли, или остается
в том же положении, какое ей придало, и наконец, по-
ложившись на спину, лежит без всякого движения,
как бы парализованная); за этой стадией, длиня-
щейся 10-20 минут (если доза не особенно значительна)
наступает стадия клонико-тонических судорог: со-
суды начинают совершать свои движения и ларушка на-
значается, но конечности ее судорожно подергиваются,
затем закидываются вверх, часто судорожные движения
животного характерны ныряние, движения назад, или
вперед, или вращения тела вокруг осей. За этой
стадией следует третья стадия спазматика, когда конечности
ларушки в сильной вынуждаются, и наконец в состоянии

стадии наступают паралич первого центра.

Отличие судорог при микротоксикоме от вызываемых стрихнином заключается уже а priori в том, что действие микротоксина (в начале отравления) простирается не на тот элемент, на который действует стрихнин.

И действительно, все наши приготовления оправданы установками против того факта, что действие микротоксина прежде всего обнаруживается на судорожном центре Гейдена и вообще на продолговатом мозге, и только, при сильном дозе, действие его переходит и на спинной мозг.

Подтверждение этому взгляду можно найти в экспериментах: если перебранным током раздражать продолговатый мозг (в месте тесного пера), то получают клонические судороги, весьма близкие к тем, какие вызываются микротоксином; если же раздражать спинной мозг, то получается спазм, наблюдаемый при стрихнине. Кроме этого, если в отравлении отравить продолговатый мозг от спинного, то микротоксикомы судорог не наступают, а развивается спазм.

Таким же мы доказали, что действие микротоксина обнаруживается на продолговатом мозге, и отсюда можно, что действие микротоксина, направленное в судорожные центры, поворачивается:

и центральный, и сосуд-гематический.
Так, в свою очередь, должно сопровождаться и соот-
ветствующими изменениями, уже знакомыми нам
из того, что мы знаем о сепсисе.

Опыт с собакой подтверждает это, как
мы уже знаем. Сам же, после введения в кро-
вь, вместе с микробами, то кровяное давлени-
е постепенно повышается, но не достигает той
высоты, которая наблюдается при сепсисе,
поскольку вены закупориваются, но сердце сокра-
щается в то же время медленнее.

Сравнительно значительное повышение кро-
вного давления объясняется тем, что сердце удержи-
вается в своей деятельности: стоит только
перерезать на миг дуги кровообращения, как дав-
ление возрастает весьма значительно. Т. е.,
при отравлении микробами, оказывается,
что, кроме указанных выше центров, возбужда-
ются еще и другие центры кровообращения.

Хлорид-натрий по отношению к микро-
бам является таким же антибиотиком,
как и по отношению к сепсису, но для
того, чтобы парализовать совершенно действие
микробов, доза хлорида натрия должна
быть очень значительна: в нашем опыте с собакой по-
требовалось почти 100 с.с. 10% раствора хлорида,

применяю только после вбояния насморка Б.с.с.
созака только же пошла. Сирог., повороты,
отравления судорожными агами, могут пере-
нести от. Золотая доза аспира.

Терапевтического значения микротоксина, как
мы сказали, в настоящее время еще не известно;
причина этого та же, что и указанная отно-
сительно терапевтического значения стрихнина.

Мурел превосходит микротоксин против
пора у работорни.

Сенатор назначил, при походе работорни,
15-20 капель раствора микротоксина 0,1: 200,0
на агно прием. Но мы располагаем го-
стой у нас другим средством, не столь сильно
гипотензивным на центральную периферия си-
стему.

Употребляем микротоксин также против
pediculos.

Некоторые из судорожных агон, по своим гви-
сбию на агонизм, совершенно аналогичны микро-
токсину. . . Наиболее агонизм имеют: *Coriaria myr-
tifolia*, растение, гвиенбушное *Coriaria myrtifolia*
(краснолиственное, ингушское растение вместе с ро-
дом баяса) и *Centa viridis*.

Послеуговая представляет довольно распростра-
ненное растение, но своим биологическим видом (мелко-
го изветной степени напоминающее *Conium maculatum*). Довольно токсичен, с характерными
перепорожками внутри, сладковатый корень ун-
бунны вызывает знакомые уже нам судороги.

Отличительное начало функции, выделяемое Бё-
лисом, есть адиарное абсолютное безделье, наз-
ванное им функционированием.

Продукты распада глицерина и глице-
рина - глицерин и токсичный глицерин
также на походе токсичности.

Вопрос аммония.

Из препаратов аммония терапевтические при-
ложения имеют: водный раствор NH_3 , со-
леводная, уксусная и уксуснокислая (Зроти-
стая и изветная со-и глицеринные вещества
образом Зроти- и извет). Мы развешивали
эти со-и одновременно, так как глицерин
на-и на организм совершенно одинаково: ве-
рно является судорожным ядом.

Отличие этих ядов от только что нами
развешиваемых заключается в-1) в том, что

стадии покоя при отравлении этими солями
мочеиспускания и проглатывания, а во-2) в
том, что инкубация за этими стадиями суждено,
всплески подвешены вступают в состояние агона
первого фетуса, весьма короткое. Уже малая
доза достаточно для того, чтобы, по истечении первоначаль-
ного периода спадения, наступил ^(мгновенно) процесс в по-
кой состояние разложения, что разложение не
может снова возбудить метаморфоз, и только от-
дельные сокращения разлагаются и инертная
группа показывает еще, что рефлекторная
сподность находится в возмущенном состо-
нии. Отравление из большой дозы ага пропе-
кается настолько быстро, что стадия покоя
почти непосредственно сменяется стадией
обширного паралича.

На мышечные ага действует различ-
но, в зависимости от способа введения покров-
ного, а потому, смотря по различию введения
ага в организм, мы получим и различные
задержки. При введении, напр., интравенного ам-
мония под кожу собак, мы можем мы ви-
дим только повышение рефлексов; при введе-
нии же в вену — хотя и интравенное, но
по способу введения. Если этот метаморфоз
введение новой дозы вызывает вторично, то он,

во взаимодействии сугубо, возбуждают эпилептические припадочки эпифиз парамиды (в которых принимают участие гипоталамический и висцеро-гипоталамический центры в промежуточной мозге). Миконизм при введении эдга рет об, как это известно, напр., при самостравлении водным раствором NH^3 , наблюдается неолетическое возбуждение, переходящее в сопорозное состояние, кибитические судороги и заторм парамиды гипоталамической первой системы. Периодическая эдга по-материю первично возбуждается эпифизом в области эдга, а эдга в 10-30 гм. 10% liquor ammonii caustici через 10 минут могут вызвать команеро и смерть.

Самые судороги, которые возбуждаются аммиачными солями, различными органическими раз-мешиваются различно: по форме, они рефлекторного характера, по другим - автоматическим. Более бурные, какется, считают как за судороги автоматического характера, т.е., по мнению материю, сначала возбуждаются судороги автоматического характера, когда эдга возбуждают гипоталамические центры эпифиза и промежуточного мозга, а потом гипоталамический по разно-страивается эпифиз и на спинной мозге.

Это, гипоталамическое, сои аммония возбуждают

первичные центры, ввиду их непосредствен-
ного участия в раздражении нервной воз-
бужденности до и после введения ага. При ма-
лой адекватности опыта Раммон (1893) наме-
тил, что адекватная аммония (NH_4Cl) повышает возбу-
ждаемость нервной коры.

Из этого следовало прибавить, что и в опытах
Раммонна с этим же ага доказывалось, что
только сподвигает NH_4Cl повышение возбудимости
первичных центров, но и повышает на-
в.

В самом деле, если первичному введению
адекватного до опыта поре, пока первичные
центры не будут совершенно парализованы,
а потом ввести аммоний, то возбудимость
центров повышается; но это повышение раздра-
жимости возможно только до некоторой
степени: дальнейшее введение раствора NH_4Cl
снова вызывает понижение возбудимости и
уничтожает ее до 0.

Данные опыта показывают, что при вве-
дении введения аммонийного повышения раздражи-
тельности даже в том случае, если централь-
ные у лангана отожжены от раздражителя,
и наоборот, после извлечения в глицерин (глице-
рин становится более удобным и более удобен
становится для всякого соединения то адекватно
это, что при введении аммонийного соли не усилит

и наоборот

чем и проглатываемый мозг.

На этом же основании становится совершенно понятным, почему при паттирии наблюдается явление. Также как и интрузия мозга в дупло сугаро по спинному мозгу и передается через Splanchnici, то можно думать, что явление наблюдается на счет сокращения артерия сосудов. Но нельзя установить без сомнения и того вопроса предположения, что при этом воле энергично сокращается и самое сердце. Предположение это только воле вопроса, что мимика (поперечно-полосатая) энергично возбуждается солями и самими NH_3 , и в мимике интрузия, поперечной под копеек со раздражением NH_3 , начинаются даже артериальная подергивания и быстрые сокращения.

Чтобы закончить изложение гниения аммиачных солей на организм, мы отметили способность нас возбуждать поперечная интрузия, гниение нас интрузия волокна бронхов и перитонии и наконец указать на способность поперечной интрузии раздражения печени.

Припараты аммиака. Самым лучшим препаратом аммиака, употребляемым в качестве отхаркивающего, при хроническом катархе бронхов, является liquor ammonii

anisatus, pronunciatus, odonobrenno br kon-
rektor 15,0 или 30,0 (по 5 канам ^{на 1000} и более 3-4 па-
за в ген)

Менее хороша в карею отаривающаго
и при камарраа мизука (Томские ситаны
особенно полезны аммиак при камарраа м-
изука и пванифу) микетуря парамара (0,3 и
припару) Перенно маюи микетуря (или про-
мислен 180,0 и припару в бумажане, что из-
такого количества мизука мизука в
средне 12 сторовою розека) Зуге маюи.
Рр. Ammon. chlorat.

Aq. destill.

150,0

Sir. Simplic.

30,0

M. f. mixtura. D. S. По 1 сторовою
розека.

Добавлено расто сторовою в параме м-
хорошою забориваніи (особенно, если отариваю-
павленіи ситан, напр. коревои) парамара уде-
нокисли аммиак в водно-liquid ammonii
acetici (S. Spiritus Mindereri)*. Перенно того

* Liquid ammonii acetici есть 15% водный раствор
уксуснокислого аммония ($\text{NH}_4\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2$) - мизука мизука
или азда кнаноу пванифу (Liebreich)

нунарарна (br наемонге брера узманнаро
узе нунери пармаконен) аргыууфий.

Rp. Liq. ammonii acetici

25,0

Inf. florum Sambuci

(x 20) - 150,0

Sir. Simplic.

30,0

M.D.S. По составу составу упрощен

(qua quoniam no rationi составу)

Dryos perennans

#

Rp. Liq. ammonii acetici

20,0

Aq. cinnamoni

150,0

Sir. Simplic.

30,0

M.D.S. По составу составу.

Уже аминированная мази оминированная упрощенная: Linimentum volatile, Linimentum
Sedano-ammoniatum.

Поэтому оминированная мази оминированная упрощенная
мази оминированная, мази оминированная упрощенная
мази оминированная, а мази оминированная мази оминированная.
Поэтому мази оминированная мази оминированная
Оминированная мази оминированная, мази оминированная мази оминированная

перерабатывается организмом в мочевину и выводится с мочой выделяется почками. (*)

При отравлении аммиаком brainy придегг very сильно страдает интракраний аммиака. Для этой цели можно считать даже разведенный уксус.

Мы изложили результаты изучения гниения при различных условиях роста агон на организм и выводу, между прочим, что при раннем сдвиге наступают скорее, при другом позже. Сдвиги стадии преимущественно замедляются в отношении роста, а при раннем при отравлении отравленным и резко выраженным при отравлении нитро-токсинами и препаратами аммония.

Этот этап роста не может быть выражением парамета центральная первая единица, но при дальнейшем развитии ага он должен быть в том же направлении и при этом некоторые то есть. Но в то же время на самом деле этап роста является этапом сдвигов. Выводительно, разрыв этого явления приходится ксенте в задерживающей интификации.

Мочевина - $\text{CO} \begin{smallmatrix} \text{NH}_2 \\ \text{NH}_2 \end{smallmatrix}$. В моче, под влиянием бактерий (micrococci моча), мочевина превращается в нитратный уксусный аммиак, присоединяя 2 молекулы воды (аммиачное брожение мочи). $\text{CO} \begin{smallmatrix} \text{NH}_2 \\ \text{NH}_2 \end{smallmatrix} + 2 \text{H}_2\text{O} = \text{CO} \begin{smallmatrix} \text{OHNH}_2 \\ \text{OHNH}_2 \end{smallmatrix}$

Принимая, что известные нервные центры и владения их функциональной, и чувствительной функций, но проявляют только задерживающее влияние. Эти задерживающие способности принадлежат не только мозговскому центру, но во известное время принимают также, что почти всякая часть нервной системы может оказывать задерживающее влияние на прочие части.

Д-р В. Рунский сравнивает результаты отравления парами ртути и ртути с йодом с известными свойствами и с известными последствиями. Оказалось, что стадия покоя не наблюдается во известном случае, т. е. когда ступень может возникнуть от влияния ртути.

Л. Вилсон, для объяснения разлития крови при отравлении угарным газом, предлагает теорию интоксикации и объяснения всего процесса разлития. Сущность этой теории заключается в следующем: Если при первом контакте с газом между собой, то вследствие этой из-за может быть или возбудительное, или задерживающее на кровь.

Если первые разлития состоят в колебаниях, периодического колебания света, или звука, то воина, из которого состоят разлития состоит в том, что

В организм человека аммоний превращается в моче-вину и в моче отходит у него вода.

подробности, или не интерпретировать первые
минуты.

Путь развития агров. индустрии развивается кон-
кретно ионизм производится свои пути развития, и
некоторые, при этом можно образоваться в
своем виде (перм. 2) и как индустрии покая,
и первой (перм. 1) и как индустрии земных
сохранении, сдвигов.

Утомление вызвано и то же болезненное состояние вызывается явлениями покоя (раздражения) нервной и абдоминальной судорогой. Этого же, можно быть, объяснение до некоторой степени употреблении старыми врачами (Крушение, Пинель и др.) припарывания аммония при эпилепсии и столбняке (Foussier, Benedict, Fodovian и в новейшее время употребляют стрихнину с ароматическим уксусом при некоторых судорожных спазмах)

Капюшонъ въ болыишъ количествахъ вызываетъ
интенсивныя приступы и, такъ же какъ и менте, по-
те капюшонъ съ усилеишемъ признается при судо-
розахъ, причина которыхъ локализируется въ в-
исшомъ мозгу.

Возможно, что в этом случае термическое
воздействие объясняется возбуждением запертых атомов

операций, по имени: такти и друия абстракции,
напр., изменение головного кровообращения, восстано-
вление функционально возбудительного центра приливной
новой возбудимости и прор.

Урагическая конопия (Cannabis Indica)

Сам существующий язь, способный вызывать возбу-
ждение функционального центра в спинном мозгу, про-
должается и сейчас, сам по себе вызывает
особые изменения в функциональном центре, но не
найдется ли и такое вещество, которое может
быть связано на уровне центра психического отпора-
жения?

Такое вещество от. много. Оно из-за своей
возбудимости психическую деятельность, усиливает
мнение идей, увеличивает производство логических
операций и прор.; друия - главным образом уси-
ливает психическую деятельность, повышает и до-
водит, до полной потери сознания. Но и первая ве-
щество (возбудитель) может быть конифи конифи
всего, так сказать, в паранорму сознания.

Друием может быть и такое вещество, которое
может вызвать различные виды. Оно адв. вызы-
вают различные настроения, раздражения, раздра-

участие в развитии, дружбе, сотрудничестве, переосна-
щении учебного процесса, науки.

Кроме этого, многие идеи находят воплощение во на-
учно-исследовательской, не подпадающей во нормативной
педагогической теории, это - инновации и интуиция.

Вполне очевидно, что жизнь и творчество не могут без-
различно относиться к центрам педагогических отклонений в
то время, как парализует дружбу. Отсюда кризис-
ная ситуация и разнообразные отклонения от
нормативной педагогической теории.

Несомненно, что приемы изобретения совершенно
новой экспериментальной педагогической теории имеют
в эту же совершенно новую область педагогическую те-
орию и практику. Если на основании теоретического анализа
попытки уже совершены в этом направлении,
и, наоборот, если интуиция, представляющая
собой творческие факторы на педагогическую те-
оретическую, педагогическую и педагогическую практику
се, сама отчасти, в творческой педагогической
практике.

Интуитивная теория есть также и в интуи-
тивной, но в отличие от теории и науки интуи-
тивная есть интуиция.

По научному виду она не отличается от науч-
ной, но отличается от научной своей сущностью.

Интуитивная интуиция имеет несколько фаз.
Интуитивная интуиция имеет несколько фаз.
Интуитивная интуиция имеет несколько фаз.

Промышленное отравление дает большой % губительных заболеваний. Во Франции для губительных заболеваний во Франции из 232 случаев губительных заболеваний во 76 случаев можно было обвинить иодистую кислоту, как причину. И только 34 из этих 76 бездуровых.

1) Уго препаратов конном употреблении:
 1) Extractum Cannabidis indicæ, употреблений в
 качестве снотворного (препарат неиндустриальный
 в виду возможного возмущения). Внутренний прием,
 по нашим наблюдениям, 0,1 на одну прием и
 0,31 на одну. Условно употреблений в мис-
 лях по 0,01 и 30 мг в одной миске.
 2) Tinctura Cannabidis indicæ | внутренний прием 20
 капель — 60 капель в одну

Adm

расширяющей и суживающей значень.

Язы, по изучению которых мы сейчас приступаем,
язы, заимствованные в Тибет от монголов: во-1) язык,
распространенный в Тибете, языке анималистический для
язы, существительных, т.е. первые языко-
знание языки в тибете относятся к языкам

и во-2) для какаго-либо изъяснения антропогенности надвигается в настоящее время еще не выясненные вопросы: почему какакой-либо изъяснитель на земле, в то же время изъясняется и по периметрической линии пути. Вот почему всякий раз, когда мы находим висящую, висящую на земле, мы должны изъясняться и висящую по периметрической линии, а также и обратно.

Кто знает характеристики этого ядра мы должны признать, что еще и то, что было оно изъясняется на земле, находившаяся в нем нами были, как-то: на земле, на земле, на земле, на земле, на земле, на земле и т.п.

Вот почему изъяснение явлений, надвигающихся при управлении ориентации этого ядра, мы будем изъяснять какакой-либо изъяснителью от его антропогенности.

Антропогенность.

Вот почему изъяснение явлений, надвигающихся при управлении ориентации этого ядра, мы будем изъяснять какакой-либо изъяснителью от его антропогенности.

14 см, 15 см.) , или же сокращения сержа замедлится, если спираль будет намотана одна от другой значительно дальше (22 см.)

Такой же приблизительно эффект мы получаем и в том случае, если замкнутое разрядное индукционное первичное течение переключено индуктора, или ариканда. Доза ариканда, равная 0,0005, произведет в данном случае то, что мы уже наблюдали, именно, такое сферическое сокращение в спираль в момент разряда индукционного, не смотря на то, что оба индукционных первичных переключателя на нем. Если теперь в возбуждении магнитов, вызванному арикандом, мы прибавим еще прерывание возбуждения течения при размотке спираль 220 м.м., то вместо прерывания замедления получим обратный эффект, именно, остановку сфера, которая прекращается спустя некоторое время после угасания электрода. Индуктор и ариканда, следовательно, возбуждают прерывистые токи магнитов (микротокены и поминутно возбуждают токовые токи индукционных первичных)

Собственно другая картина получается в том случае, когда, после отравления арикандом, мы будем наблюдать аморфизм. Такое сферическое сокращение значительно больше, но является только на время кинематографа угасания, т.е. угасания

насе или отклонения в развитии. Данные, разбра-
нение которых не было еще и только восстанов-
но даны и замечания в развитии при искомом поло-
жении эмбриона (в нашем случае развитие эмбриона
эмбрионального периода 220 м.м., 150 м.м., 140 м.м., 90 м.м.
и наконец 0)

Умное анормальное развитие эмбриона в эмбри-
ональном периоде. Эмбриональный период
необходимо различать и кратковременное возмуще-
ние эмбриона, если есть анормальное развитие.

В развитии с нарушением развития эмбриона крово-
носная система развивается, как и в развитии эмбри-
онального периода, так и в развитии эмбрионального
периода-гематического центра в продолговатом мозгу.

Это первое явление анормальное.

Второе явление не замечается в том, что оно
распространяется, как и в развитии эмбрионального
периода.

Опыт показывает, что эмбриональный период
при этом и парализован, а что явление
его распространяется ^{на продолговатый} по первым элементам. Это посто-
янное явление анормальное имеет значение и независимо
от первого явления мозга. В пользу этого
убеждения служат следующие факты: 1) распу-
хание эмбрионального периода, когда мозг
напр. эмбриона, эмбриона и эмбриона в развитии эм-

Данные опытов Н. Дюва и Бернштейна показывают, что раздражение зрительного возбуждающего нерва вызывает паралич оculo-motorii (он разгибается oculo-motorius в зрительном нерве и не может выйти из зрительного нерва и вызвать движение зрачка) и не вызывает оного возбуждения Sympathici, так как если раздражать зрительный нерв или симпатический нерв, то обнаружится во всем ряду перерождений; таким же образом, не исключено, что это относится к нервному Sympathici), а именно возбуждающее раздражение зрачка.

Взвешивают сырое, после выливания аспиртина, взвешивают и в составлении извешивают всего прибузну; не-
стигают मात्र поз. парами аккомодации, из-
вешивают 2-3 гна.

Наконец, математические работы, произведенные
в Москве 2-м полем Тарбунским (1895 г.), показывают,
что амплитуда весьма значительно превышает ма-
жоры явление при максимуме (изначальное увеличение

губления наблюдается и в нормальном мозге), при-
чем антагонизм с глицерином в направлении
обратное.

Двойные антропы на мышце.

Наблюдения над глицерином антропа на мышце бы-
ли сделаны в лаборатории Павлова.
Особенно подробно были изысканы вопросы о биоло-
гии антропа на мышце. При этом по-
казано, что при мышечном выносе наблюдается
мышца, состоящая из антропа, белок и холестерина
и протекать через антропа паренхимы сердца,
кровоносную кровь, но мышца сохраняется при этом
мышечной тканью даже в виде. Разделение зара-
женной антропа при такой антропии очень
как и при антропии мышечной, выносе мыш-
цы антропа. Если мышца выносе антро-
па в кровь, протекать через мышцу, при
выносе в виде мышечной мышцы, но разра-
жение мышцы зараженной антропа не дает ни каких
смыслов: антропа в этом случае паренхимы
окончания антропа мышечной, и антропа мыш-
цы антропа мышечной мышцы уже не в состоянии.

Также же глицерин антропа оказывает на по-
тобную мышцу, мышца мышечной антропа при вы-
носе мышечной мышцы и при.

Опыты Павлова и Павлова показали, что, при выносе

ниже упомянуто, значительно ограничивается брожение мучного теста и т.д., а Аспирин и Тальк и, в некоторых случаях, Eosin доказали то же самое для отложения панкреатической слизи. Одним из основных оснований в том, что это излучение ком-
мунально бродящего теста в присутствии за 5 минут
1) и нормального зрелого, 2) после введения мик-
картина и 3) после введения аспирина. Упомяну,
полученный мик, имеет следующие:

Нормальное отделение сока	После введения миккартина	После введения аспирина
1,4 с.с.	5,4 с.с.	2,2 с.с.
1,4 с.с.	5,3 с.с.	2,0 с.с.
1,8 с.с.	3,5 с.с.	2
1,4 с.с.	3,2 с.с.	1,0 (minimum)

Отсюда видно, что аспирин только ограничивает,
но не прекращает отложения панкреатической
слизи.

Что касается действия аспирина на мочевыводящие,
то, наоборот, и нормального зрелого он огра-
ничивает отделение мочи (Walt. 1895); однако ас-
пирин может и увеличивать бродячество функции
почек, если организм предварительно был отравлен
другим ядом. Также после миккартина, который
увеличивает отделение мочевины, аспирин умень-
шает, но ограничивает мочевыводящие, аспирин
может поглотить эту функцию до ее конца. (Alison)

А. С. Сидоров

План ввезения арканина (гвоздешного порошка
мелкого) арканом так же употребляется коммунно
мол (К.Ф. Аркановский).

Молочная смесь на отравление арканом так же
используется, т.е. ввозимые молоко
так же употребляется.

Возвращение арканом на коммунно.

Возвращение арканом на коммунно, особенно в гни-
тельную его на аржане. В первый момент, изначаль-
ная доза арканом способствует уменьшению гни-
тельной коммунно, но повторная вызывает уже
паранюю. Которая объясняет так же гни-
тельную арканом, что первая доза паранюет
порнозаций аппарата коммунно, т.е. обжаривания
Splanchic. (уменьшение перистальтики), а последующая
доза еще паранюет и укорачивает (окончание паранюи)
и, следовательно, дает в окончательном результате
паранюю коммунно.

Но так как извешивания паранюи еще не
указанный орган производится при разном ус-
ловии (напр. одни извешивания только в гни-
тельную коммунно, другие - в гни-
тельную при известной дозе, другие - не при известной
и т.д.), что давало, конечно, и разноречивые резуль-
таты, то в недавнее время являлось необходимым
решить указанный вопрос, причем мы стараемся по-
ставить свои опыты так, чтобы окончательно на-

Pohl (1894), изследователски биланс разграничава и-
фактор и в него има две компоненти на гласения
външностен и външен изглед отразява външен
критериум, т.е. че компонентите на външността
гласения поведението.

Наше мнение по данному вопросу таково: спазм мускульной гортанной парализует голосоустройство аппарата, вследствие чего происходит удушье, а потом ввиду атрофии гортани распространяется и на надгортанник, вызываясь им абсцесс паратонзиллярный. На этом основании, по всей вероятности, атрофия в мускулах гортани (extr. belladonnae) и может вызывать появление припухлости.

(21) Я хочу сказать, что мы боимся чужбного пера, которое
может только порицание инициации, производят
чужд. надпочечной железы. Скор., угасение надпочечной железы умень-
шает эти инициации, не излучая кровяных элементов в инициацию.

На какие именно сведения приходится ответить, на основании их иррегулярно и, потому, на основании того же в кривых, или на их первом изгибе, которые записаны в кривой отклонения?

Министерство доказывает, что ответ на этот вопрос не может быть дан, потому что кривая записана на основании сведений, полученных в кривой.

Движение амплитуды по дуге и иррегулярности

Движение амплитуды по дуге иррегулярности является еще недостаточным, хотя есть основания думать, что амплитуда сначала повышается, а потом уменьшается.

Также можно видеть и влияние амплитуды на генеральные центры равновесия. По Амстердаму, центры возмущаются. Там же [1895.] издается в том же отношении другие примеры и на основании исследований сначала повышается возмущенность дуги, а затем уменьшается, а следовательно и иррегулярность иррегулярности уменьшается.

В предположении, что амплитуда возмущается как все же иррегулярности, так и дуги иррегулярности.


Влияние дуги иррегулярности на амплитуду

вещица сильно. Возбуждение выражается тахикардией, тремором, изнурительным знобчатым ознобом и густой потоватою приступами возбуждения, сопровождаемыми иногда судорожными явлениями. Если в этом прибавится жажда и невозможность проглатывания пищи, то недуг и узнается в этом расе симптома картина, напоминающая судорожное. Возбуждение является затемно поперху узнано и извещивающности.

Многие в гниении атропина на извещивающности первы представляются довольно разнообразными, но тотчас же, что назн и в замечании поименованного извещивающности, замечается предположение, что гниение атропина на извещивающности первы оказывается как уменьшение.

Движительное парали.

Видно гниетивное парали в расении в буге Solanaceae абсoluta vivificatione, но какде расение, поимено этого акадника, имену и бои содвигаются; парали они акадификация:



применение атропина и трисификации представляется извещивающности

мнѣ. Дармштутское изобретение аромату, по мнению
моему, неограниченно превосходит наше на переноску. (Дур-
манъ въ египтѣ бралъ подмѣшавая правую бугорку, вѣсѣ-
ской правой, такъ какъ при помощи ея употребленіи
можно было приучивать бугоръ на мажущей бугорку.

Или некомпонированъ бугоръ Дурмана Арабъ и Иллури
при употребленіи
"андалусіи" (Froudeau)

Скопозавинъ (изъ Scopolia atropoides) и неограниченно
соединяется со скополиномъ по зрѣлости (первый бугоръ
расширеніи по форме коронки бугоръ, искомъ аро-
мату)

Синъ и еще собою андалусіи - duboisin (изъ Duboi-
sia myoporoides), который признается по скопоза-
винному, по неограниченности. (2)

Протининъ, по легендѣ, наз. эфиродарма сини-
на протина въ ароматическомъ кислотѣ. Протининъ
соединяется при помощи основанія протина $C_6H_7(C_2H_5OH)$
 $N(CH_3)$ и ароматической протинной кислотой $C_6H_5.CN \begin{smallmatrix} CH_2OH \\ COOH \end{smallmatrix}$:
протинная кислота, черезъ воду, легко превращается въ аро-
матическую кислоту, измѣняющую въ карбонную кислоту и даю-
щую при окисленіи, какъ и протинная, промѣняющую кисло-
ту.

Протинъ соединяется и съ многими другими ароматиче-
скими кислотами, и добывая изъ этихъ соединений при-
стѣпаетъ, какъ ароматъ, напр. онъ соединяется со син-
тинной кислотой, и изъ этого получается протинная $C_6H_5 \begin{smallmatrix} CH_2OH \\ COOH \end{smallmatrix}$

Терапевтическое употребление атропина.

Атропин принадлежит к числу сильно действующих веществ ядовитых, а потому максимальная доза его, допускаемая нашей фармакопеей, в 6 раз меньше дозы стрихнина, а именно 0,001 для однократного приема и 0,003 в течение суток.

Терапевтическое применение атропина имеет место прежде всего в качестве сильно возбуждающего средства при коллапсе, и Luchsinger употребляет, это в параличе сердца, паралича, вызванного разрывом сердца, атропин всегда в сочетании вызывая робина, часто с сильным сокращением сердца.

Мы лишь полагаем, что это далеко не так: в том случае, когда замещение сокращения, или остановка сердца обуславливается возбуждением вагус'ов (напр. при отравлении арахисом, холестеринами, нейтрином), атропин, несомненно, принесет хорошие результаты. Но команда далеко не ограничивается одним только возбуждением раздражающих нервов; он может произойти при всяком только условии, которая способствует параличу сократительной силы, или сердечной мышцы. Раз эти сократительные парализованы, то сердце, вероятно, не будет и образует вентрис, поэтому под именем колатропина.

Однако среди этих условий есть и такие, которые не действуют на сердце (напр. удушье - тропизм)

не уменьшает своей эффективности в том случае, когда мы уменьшаем влияние тормозающего аппарата. И мы, следовательно, знаем, что в известном направлении отравления калийными солями, адреноформин, адреномин адронин и т.д. не только не возмущает деятельность сердца, но, наоборот, способствует развитию работы. Однако, тем не менее, перво-начальный аппарат сердца сохраняет еще некоторый запас энергии, который можно превратить в работу или расходовать, тем самым тормозов не может принести пользу. Но в том случае, когда центры, регулирующие деятельность, истощены, тем не менее и сами тормозов. В первом случае действия сердечного центра, при работе производимых преимущественно синхронизация (от возмущения тормозов), но еще существенные сокращения, адронин может быть полезен, но тем не менее адронин не уменьшает наступления смерти, когда отравление адронинными препаратами достигло почти полной стадии, вызывая полной истощения всего перво-начального прироста сердца.

Таким образом, преимущественно легко возбуждается именно паралич тормозающего прироста, но не наоборот по тому же обстоятельству, неизбежно отбрасывается на деятельность сердца.

Нельзя не отметить, что при употреблении адронина в качестве возбуждающего при наличии в тканях скелетных, мышц и проч. в адронин нет пользы.

Наконец, необходимо принимать во внимание не только возбудимость билие адреналина на сердце, но и способность его побуждать кривание габелли возбудимости сердечной деятельности сердца в прогнозируемом мозгу, следовательно, выражающуюся в критическом изначальном разрыве и нормального и нормального, но при разрыве и нормального, отрываемых адреналином адреналина до конца ания коллеса.

Затем же рассуждениями билие адреналина показана:

При изначальном нормальном, особенно у адреналина (весь изначальный адреналин - 0,0005).

В изначальной практике (весь адреналин для адреналина в адреналин).

При адреналине, когда адреналин парализует адреналин какого-то адреналина, выражающегося адреналина адреналина.

В качестве адреналина адреналина.

В нем заключается это адреналин адреналина, не адреналин и до адреналина адреналина. Очень возможно, что он изначальный адреналин адреналина крови. Как бы то ни было, адреналин адреналина адреналина адреналина адреналина. В адреналине адреналина, адреналин адреналина, адреналин адреналина адреналина, которые адреналин адреналин адреналин адреналина адреналина.

Рассуждения

крупной азбестовой бумагой. Водяным экстрактом гора-
ми ага (Рр. Atropini Sulzur. 0,06
Aq. destill. 8,0

M.D.S. По 2 камни 3 раза в день)

Применение атропина в виде раствора в воде на
основании опыта Крамбурга, а также в виде
раствора 1:1000 в воде, или в виде раствора
в воде или в воде. Водные растворы
выпускаются в виде атропина при зудах
кожи.

Препараты. Водная гора атропина 0,001, но
вред не причиняет пациентам и этой гора без вред-
ной опасности. Поэтому и мы применяем для себя
за водной гора 0,0005, в водной гора уже терапевти-
чески применимы; знад же водной гора,
можно давать и в виде раствора, но, смотря по ве-
роятности.

Рр. Atropini Sulzur. 0,01
Aq. destill. 10,0

M.SS. По 1/2 чайной.

Для лечения в виде атропина можно брать
Extractum belladonnae (накапливаемая гора - 0,06 на
применение и 0,25 - в виде гора для получения экстракта,
для этого - гора эта применяется). Обыкновенно
дают 0,01 - 0,02 экстракта (различные препараты
ки) по применению (порошки, пилюли и пр.)

Rp. Extr. belladonnae 0,01
Sach. albi 0,3
M. fiat pulvis.

D. 4. d. N 20
S.

Rp. Extr. belladonnae 0,02
Butyr. cacao, q. s
Ut fiant Suppositoria
D. 4. d. N 5
S.

Рр. магнол. нармиче упрощающе антогонизи
регенеру:

Rp. Atrop. Sulfur. 0,01
Aq. destill. 20,0 - 50,0
M.D. Sub Signo Veneni!
S. Magna kaimu

Отравление ампомносом.

Отравление ампомносом представляет собой острую
интоксикацию и характеризуется тем, что острое
упрощение ампомноса бывает как-то гру-
бо болезненным. Отравление характеризуется возбу-
ждением сознания, расширением зрачков, про-
тивоместными судорогами конечностей, учащением
дыхания, непроизвольными мочеиспусканием и
потением, а также судорогами мышц. В
лечении ампомноса в этом случае
важно помнить, что это острое

сти, ссылаясь на тое заключение результатов, которое оно даете, можно (одним из таких случаев или опубликовано в настоящее время). Кроме против такого мнения и возмущения Умбертинатт, доказывая, что морфия только ухудшает положение больного, но, только не менее, и в настоящее время больные скорее страдают от него. Но помощи морфия приносят еще и потому, что считают возможным употреблять при страдании аспромином аспромином пометочного - пилкартина в виду односторонности этого аспромином (аспромином быстро прекращается действие пилкартина, но не обратное).

Мы не можем не разговаривать пометочного мнения и показывая, что аспромином аспромина могут парализовать действие пометочного, но только пометочного извещения время, чтобы не парализующее действие можно обнаружить. Подтверждение нашему мнению мы можем привести в известном отношении изданию, когда употребляют аспромином (Здесь вводится пометочная кожа для морфия 1/2% раствора аспромина вместе морфия) менее введением пилкартина и от гнильственных веществ.

В другой стороне мы не можем безусловно рекомендовать и морфия, и вот почему: необходимо раз-

также два стадии отравления аспронитом: одну из этих стадий характеризует возбуждение центров и другой - угнетение их.

Несомненно, что морфин, введенный во время первого этапа - во время начального возбуждения - производит угнетение во состоянии болюнов, но при второй стадии возбуждения миновался, и наступило уже угнетение первичных центров, но морфин может также способствовать наступлению второго периода



Брауна (*Hyoscyamus niger*), принадлежащая к тому же семейству Solanaceae, как и красавка, во общем производит на организм и то же самое действие, но отличается от последней тем, что Брауна имеет угнетать только мозг и вообще возбуждает скорее. Некоторая часть почитается особенно возбуждающим по отношению Брауны. Также, браунки и листья, перенесшие особенно сильное действие мозга брауны, имеют от несильного сравнительно мозг vivification.

Во медицинской практике из препаратов Брауны обыкновенно употребляют Extractum hyoscyami.

Рр. Extr. hyoscyami 0,5

Ал. amygd. amar. 15,0 - 20,0

М. Д. С. По 10-15 капель (при Браунитме)

Это вещество алкалоидно-иоцидиальное, но терапевтического значения оно не имеет; а его функции алкалоидно-иоциды, хотя и употребляются иногда в качестве сомнопаров, в силу своей способности вызывать гнетивное действие своего мозга, но употребляемо оно изобретено. Как видно из описания вещества (отмечено несколько случаев отравления даже при употреблении его в качестве гидриата), возбудитель же по тому же месту поднимает гнетивный (возбуждение, замедление дыхания, коматоз, судороги конечностей). Дается в крайне малом дозе (максимальная доза его - 0,0005), напр.:

Рр. Hydrocyan hydriatom. 0,005

Aq. destill.

10,0

MSS. По $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ унции.

Насколько известно алкалоидно-скондринный (иоциды или иоциды скондринный), по своим свойствам близок скорее к аммоний и иоциду, отсюда видно, что гнетивное в нем имеет дозу, немалую аммоний. Движение оно на разрывную сторону, секреторные органы и его же выделяется скорее и прекращается скорее, чем гнетивное аммоний (подробности см. в работе Каменского 1895)

По своим свойствам оно превосходит все названные алкалоиды и употребляется иногда отравление даже при введении в пищу, которое которого иногда

микроамперы уже в количестве 1:50000 вольт.

Данный в качестве электролита, или введенный в массу, он является самым лучшим проводником по электропроводности, как-то: цинком в концентрированном, отщеплении золота, алюминия, оселение натрия, зрительная и слуховая дифференциация и много других веществ. Это потому, что он является и проводником и диэлектриком. Это потому, что он является и проводником и диэлектриком.

В электролитическом процессе при функционировании электролита наблюдается замечательное явление: в момент прекращения электролиза — сильная самовоспламенение.

Аммонийные азиды

Мукарин

Мукарин представляет собой основание, близкое к аммонийаммонийному основанию. Формула его $\text{N} \begin{matrix} \text{(CH}_3\text{)}_3 \\ \text{C}_2\text{H}_5\text{O}_2 \\ \text{OH} \end{matrix}$. Он добывается из мукаринов, которые некогда употреблялись в Северной Европе, а теперь употребляются и мукаринами Камбоджи для приготовления сильного наркотика, близкого к опиоидному основанию (Robert). Это основание, как полагают, производится аммонийно-водным, но без выяснения, является ли это

которое сопровождается только в сознательном зрительном.

Маленькие дозы мышьяка резко замедляют сокращения сердца независимо от того, укол ли вызывающий нервы, или перерезаны, и, вместе с тем, уменьшают работу сердца (Robert, 1866).

Большая доза мышьяка вызывает истерическую остановку сердца, которая не прекращающаяся после вброса большого количества атропина.

Замедление сокращений сердца преимущественно кратковременное явление (Stannidberg 1869), может быть, вследствие падения кровяного давления. Действие мышьяка сводится поэтому к тому, что он возбуждает сокращения вызывающих нервов в самом сердце (смысл в изложении фармакологии атропина). И. Доусон (1881) повторил вбросы мышьяка у собак впрочем парализовав сокращения vagi.

На зрачок мышьяк действует в направлении, обратном атропину: он возбуждает сокращения oculomotorii в мазу. Вследствие этого зрачок суживается, и наступают судороги accommodation - явления, прекращающиеся после вброса атропина. Но так как мышьяк, подобно ему, в конце своего действия останавливает нервный центр, то в конечном результате мы наблюдаем, как и при атропине, расширение зрачка.

Секреторная деятельность при мучкаринге уменьшается, но мочеотделение увеличивается.

Мелкодоко и крупки усиленно сокращаются (просто, понос), но без выработки, отсюда возбуждения симпатического узла в киниках. Усиление перистальтики желудка до настоящего момента киника (Начинает), который только не усиливается антрального.

2) преобладательно антрального мучкаринга не вызывает выделительного явления.

Терапевтического употребления мучкаринга не имеет.

Ареколин.

Ареколин это получается из пальмы Аса *Catechu* и в соединении с HCl дает соли - солянокислый ареколин.

Ареколин предложен Зиль, как сильно стимулирующее средство, но так как его действие на покров мучкаринга, прилив 0,0005 его, введенные прямо в кровь, вызывают уже резкое замедление сердца, то, имея токсикологический интерес, ареколин ввиду-ли может приобрести терапевтическое значение (подробнее

В. В. В. В. В.

Сборная въ армянскомъ см. въ работѣ К. О.
Арамянского)

Это грибовушное начало имеет Jaborandi принадлежит к той же группе агон, что и мукаринь с аризонинсом; но основное отличие от этих первых, состоит не в химической агонности, состоит в том, что периферические органы не на сердце почти не действуют (иногда даже, при отравлении мукарининсом, значительно замедляется, но это надвигается сравнительно поздно). Также очень большая количество мукаринина, введенная прямо в кровь животного, может вызывать кратковременную остановку сердца, а также вызвать ускорение сердечной деятельности от посылки вативанского паралича окончания дыхания (первое). Зато явления, имеющие обратное значение, при введении его, выступают на первый план. Также, если ввести мукаринин под кожу, или через рот животного, то основательное возрастание до поразительных размеров, и в течение 2-3 минутного опыта уже не уменьшается, а наоборот сильно. Впрыскивание 2-3 капли вызывает среднюю массу 350 грм. сердца, максимум 750 грм.!

Еще более интересно явление потоводеления: в ка-
ких-нибудь 2-3 часа потом, при микрокарпии,
выделяется воды 500 с.с., или даже 700 с.с., при этом
4° температура иногда падает на 2°. Общая потеря
в весе кожи, других желез и лимфы
— от 2000 до 4000 грм. (в начале развития ми-
крокарпии вода на кожу выделяется, кожа же и
лица краснеет). Висцеральное микрокарпическое
и на секреторную часть желез: так как панкреати-
ческий сок выделяется в двенадцатое кишечное,
только относительно (см. стр. 65); но не нужно ста-
вить и относительно выделения желудочного сока,
бронхиальной слизи, ушной серы. Опыт с выво-
женной поджелудочной железой показывает, что
увеличение секреторной функции, благодаря введению
ада на окончания секреторных нервов (всегда
возможно, что микрокарпия возбуждает и иннерви-
руемые концы секреторных нервов). По крайней мере
Мартин наблюдал отравление железой потовых и
слизистых желез и тогда, когда артерия, питаю-
щая железу, была перевязана до введения ада. Но
это было только перерывом при этом условии
перво, чтобы отравление железой прекратилось)

Существенные изыскания могут показывать, что
микрокарпия до известной степени ограничивает
потоводеление. Впрочем, это явление может быть
объяснено только относительно, что ограничено,

погружением пилкартина, терпает большое количество воды потов и слюны.

Иногда поговаривают об аргументации пилкартина, замечая, что пилкартина способна вызывать зрительное возбуждение, возбуждая осязание осязательной в осязательности, как в том случае, когда рисунок ее возбуждает право в континентальном смысле.

Термическое применение пилкартина.

На первом месте здесь должно быть поставлено употребление пилкартина при угрей, когда он способен вывести из организма вредные продукты обмена и тем самым облегчает работу почек, уменьшая возбудимость, а также и при экземе. Должно быть употреблено его и при некоторых инфекционных болезнях, напр., при гонорее.

Но если, конечно, пилкартина вводится на течение гонорей, то в чем состоит это влияние?

Способность ли он вывести токсины, отравляющие организм, или, может быть, он возбуждает деятельность почек (через, уменьшение мочи, надпочечников мочи), которая, побуждая, способна возбуждать некоторые органы — это — открытые вопросы.

Давать, пилюльки употребляют при кам-
рачной желтухе, в ушибах и опухах - при по-
ражениях ливерной и зараженной полости.

Уножа, после выписывания пилюльки, надо
дать примерный рецепт ниже.

Возьмите пилюльки можно погу кону и
per os.

Рр. Pilocarpini mur. 0,1

Aq. destill. 10,0

МДС. 1 пилюлька погу кону.

Симптомы отравления пилюльками употреб-
ления употребляют.

Уж пилюлька образует продукт распа-
дения - аборуса, который вызывает погу кону.

Уж пилюлька (которую употребляют на погу кону
пилюльки, по елике погу кону (Robert)) обра-
зуется аборусом, который вызывает погу кону.

Таким образом, что пилюлька, употре-
бляют для терапевтических целей, которые вы-
совершаются часто и вызывают для других веществ
ни, которые употребляют противопоказаний обра-
зова.

Фolia Jaborandi или Pilocarpus pennatifolius
(Rutaceae) почти не употребляют.

Возбудимость (Зерин)

Этого чрезвычайно ядовитый алкалоид (доза в 0,004 - 0,005, по Тарнаку. Вещество смертельно для собак) является грейсбургским параликом н. н.з. Камедарским добото. Перивитическое приращение, если не считать весьма ограниченное - в газной практике, для почти не имеет, но оно заслуживает подробного ознакомления с ним по причине сложности и своеобразности вызываемых им явлений. Взаимность не возбудимости состоит в том, что она совершенно различно действует на периферические органы и на центральную нервную систему. В то время как, под влиянием яда, лимфы энергично сокращаются, работа сердца усиливается, усиливается секрет жидк., повышается гравитация кишечника; центральная нервная система угнетается совершенно: животное выжато ядом, двигательные центры парализуются, движение затруднено в паралич отравления, с течением времени прекращается сознание, и животное погибает от задыхания.

Разработчик не знает подробно влияния яда на периферию.

Здесь наше внимание прежде всего останавливается

на это то непрерывное сокращение разности между
мнимым и реальным, которое наблюдается уже спустя
3-5 минут после введения адр в организм жи-
вотного. На основании только этого, мы можем
заключить, что мнимая возбудимость повышается,
но это становится еще более удивительным, когда
мнимую возбудимость мы будем извешивать
посредством раздражения толсто. Оказывается, что
возбудимость при этом повышается далеко за пре-
делы своей нормы.

Наблюдая затем влияние адреналина на
сердце, мы наблюдаем, что и здесь, после введения
адр, сердце начинает сокращаться непрерывно, пульс
своим видом не сильно отличается от нормального, а сокра-
щения сердца более замедленными.

Но опять обуславливается это замедление сокра-
щений? Не есть ли это явление физиологиче-
ским явлением?

Раздражая периферический конец нерва, мы
выраем тем самым предположить, что адр не
возбуждает, а скорее парализует, тогда как
вспомогательный, или замедления сердца не получается
более.

Но viszont и замедление пульсовых волн не без-
условно физиологично в обратном против на-
шего заключения. Это положение относительно и
наблюдается у животных и у человека при введении адреналина.

и Витковскому по мысли, что установка не полу-
чается, но все-таки выполняется, потому, что возбуж-
дается самая сердечная мышца. Это предположе-
ние удалось доказать и экспериментально. Ученая
препаративно отравленную сердечную мышцу
каким-либо ядом, парализующим мышцу, и тогда
самому попытка ее возбуждаться. Таким же явля-
ется то, что раздражение периферического конца
вагуса влечет за собой замедление сердечных сокра-
щений.

Это же возбуждение сердечной мышцы мы можем
доказать и симпатическим образом. Если сразу
перерезать установку мышечного, который воз-
буждается сердечные тонусы, то организм не
в состоянии удержать эту установку, причем
наступают различные сокращения сердца.

Однако при этом легко убедиться, что дей-
ствие мышечного не удерживается и только пере-
скакивается возбуждением сердечной мышцы. Правда,
раздражение в это время только возбужда-
ет первою и второю паузу, не смотря на про-
буктационный, возбуждающий, действие мышечного,
не вызывает даже остановки сердца. Но если мы
уменьшим возбуждение сердечной мышцы ядом,
парализующим мышцу (напр. апоморфином), то
сразу снова устанавливается (также как действие

приостановки на мигу уничтожено апноэ-
ное, а потому глицерин исчезает снова (здесь
переворот). Апноэ, конечно, прекращается этой
остановкой.

Термак склонен думать, что вентри-
сы учащаются сродни сокращениям приостановки
в то же время уничтожается сосудисто-бронхиальный
центр, по сроду. Благодаря своему возмущению, вна-
но компенсирует его участие. Уничтожаются и
сосудисто-бронхиальные центры, или, напротив, воз-
буждаются (по крайней мере в первые время,
по нашему мнению), а также остается только
то, что кровяное давление, при приостановке,
значительно повышается в начале глицерина ага.
Необходимо также считаться с влиянием су-
дорожного сокращения кишечника на высоту
кровяного давления (Берггольц и Тюттх). Несомнен-
но, механическое раздражение в кишечнике сосу-
да, которое вызвано механическим сокращением
мышечной стенки кишечника способствует
до некоторой степени раздражению нервов пери-
ферических кончиков нервных нервов.

Влияние приостановки на мигу и зрачков
Озвучив характер глицерина приостановки
на мигу аналогично глицерину на то же время
остановки апноэ-ночного апноэ, т. е. по

Подпись

мускарину, или арескоину, оно уменьшается отго-
ления слюны, оторжение нота, слеза и т. п., но
призводительно мучить и некоторую слезу со-
ответно принадлежащую оодежности. Мускарином
и арескоином, поисте атропина, вызывают секреции
не только, призводительно не, но и вазомоторные
Тенденция, вызываются и вазы. Отсюда линг-
вально замечается, что призводительно в данном
случае возмущает не секреторные нервы (кото-
рые уже парализованы атропином), но совсем
иные нервы. Но это обстоятельство не
исключает действия призводительно и на секре-
торные нервы.

Если обратимся теперь к изучению влияния
призводительно на зрачок, то и здесь мы уви-
дим, что сфера его влияния не ограничивается
только возмущением оculo-motorii, но и возмуще-
нием линзы, суживающей зрачок (*m. sphincter
pupillae*). Это можно поисте обстоя-
тельством и можно объяснить, почему с одной сто-
роны призводительно может сужить зрачок атро-
пинизированного глаза, что не производит ни
мускарином, ни пилоскарпином, ни другие антагонис-
ты атропина, и почему атропин с другой сто-
роны, поисте призводительно, не в состоянии вызвать
такого расширения зрачка, какое оно произво-
дит поисте мускарином и арескоином.

Но нужна ли предположить, что возбуждение зрачка происходит на счет вызванного рефлекторным параличом *Sympathici*?

Предположение это устраняется тем фактом, что возбужденный рефлекторным зрачком в состоянии расширяться при затворении глаза (состоятельно п. *Sympathicus* не парализован).

Влияние эргостимулина на киберника.

Сокращение киберника, при отравлении эргостимулином, идет настолько быстро, и мышцы сокращаются так сильно, что кровь совершенно отливается из сосудов киберной створки, и киберник представляется в виде белой ленты.

Чтобы выяснить, на что собственно действует эрг., на порцию или аппарат, или на самую мускулатуру киберника, Яковл предпринял несколько опытов. Он вскрыл у голубчатого жаба киберную створку в тень (38,5° Ц.) бальне из физиологического раствора поваренной соли. Сокращение киберника при этом не наблюдалось. После вприскивания небольшой дозы эргостимула появлялась чередующаяся дилатация киберника, которая тотчас же прекращалась, как только Яковл раздражал лезвием надпочечную железу (ан. примеч. под стр.). Но после введения новой дозы эргостимула, киберник почти сразу превращался в белую ленту, и раздражение надпочечной железы

не могло уже установиться этого непрерывного сокращения. Система неминуемо вращается, когда судорога мышечника возобновляется, раздражение надпочечника снова возбуждает установку дыхания мышечника. Однако иногда замечается, что непрерывности возбуждения не наблюдается непрерывного раздражения мышечника и не зависит от возбуждения Солнечного.

Результаты этих опытов однако не исключают возможности влияния раздражителя на дыхательные центры мышечника.

0 ~ ~ ~

Влияние раздражителя на первую систему, как мы уже сказали, выражается угнетением ее; при этом центры сосудо-двигательный и дыхательный поражаются особенно сильно. Есть основания думать, что мышечник и зубчатый мозг сердца также подвержены этому угнетению.

Первичное угнетение раздражителя

Зная, что раздражитель угнетает центральную первую систему, теоретически можно было бы допустить, что он окажется хорошим средством при судорогах, зависящих от возбуждения указанной системы. Но как это ни странно, раздражитель в умеренной дозе не только не ограничивает припадки мышечника, но, наоборот, увеличивает число их. У мышей, конечно, предположения о "интенсифицирующем" судорогам по не-

Не забравяйте и едно обстоятелство: първоначално парализиращото въздействие ега на задържаната функция е първото звено?

Существующие указания на хорошие результаты
лечения прижигательными атонами кишечки и канальца
опухолью, но вообще нужно сказать, что сам прижо-
гательный и нитрат какой-л. знанием, но только
в узкой практике.

Rp. Eserini Salicyl. 0,01

Aq. destill. 10,0

М. Д. С. По 4 номеру [многому же пу-

теперь можно быть уверенным, и для безопасности в
наш)

Криво зрима иже Кандагарского Завода ввѣ-
* поаврамена.

мень алкалоидъ эргинъ, гнѣисъуноуи, по Роберту,
иногда также эргинъ и совѣтъ не гнѣисъуноуи,
по мнению прочихъ фармакологовъ.

Другой алкалоидъ - канаваринъ гнѣисъуноуи
погодно стрѣлану.

Никотинъ.

Названный алкалоидъ также относится къ группѣ
антиспазматиковъ атропина и ацилини являюща (спо-
собности возбуждать периферическія окончания извѣст-
наго нерва) также называется пиккаринъ, муска-
ринъ и ариколинъ. Другими (способности сравнительно
быстро парализовать центральную нервную систему)
— аризоцилинъ. Это вещество значительно
обладаетъ сильной задачей изложенія фармакологич ага,
которая и будетъ изложена сравнительно кратко,
но съ указанием тѣхъ отличій, которыми соотвѣт-
но и будетъ характеризоваться самый никотинъ.
Самъ никотинъ принимать при 1-2 вѣ вѣ количествахъ
1-2 мгм, но отравление будетъ характеризоваться
сильными явлениями: у отравившагося появля-
ется обильное слюноотдѣленіе, тошнота, рвота и по-
тливость на низу. Въ то же время отъ начинающагося
паралича центральной нервной системы появляется

крайняя слабость, переходящая постепенно до обмороков, затрудняется дыхание, разстраиваются зрение и слух, наступают жар, киническая судорога, затем быстро возникает коматоз, наступают параличи дыхательного центра и всей центральной нервной системы и смерть.

Если от этой острой картины отравления мы перейдем к частному разложению гнилостной ады на различные органы, то найдем, что для зрачка, напр., это гниение видится выражаемое тем, что ады сначала возбуждает сокращения cymptomatologii и, следовательно, суживает зрачок, а затем cymptomatologii парализуются, и зрачок расширяется. Следовательно, таким же образом изменяется и accommodation: сначала, под влиянием ады, производят спазм accommodation, а затем ее парализуют.

Таким же возбуждающее сначала, а затем парализующее гниение производят ады и на секреторные органы. Под влиянием ады, таким образом, повышается секреция потовых желез, слюнных, кишечного канала и, может быть, почек; но эта повышенная секреторная деятельность представляет явление изнурительное: обильное потопотделение может сопровождаться сухостью кожи, опухание слизистых прекращением и т. п., хотя смерть может наступить и до явления паралича названного

Очень важно можно доказать в гистологии яда на курином. Правда, изменение перистальтики, происходящий до отравления куриным, — факт несомненный, но на kurie элемент этого органа претерпевает в гистологии никотина, далеко не известно. Предполагаю, что, при отравлении никотином, возбуждаются куриные узлы.

Домъ въ нѣмѣцкой на сѣвѣ. Печеръ
Шиндлеръ.

Влияние интоксикации на сердце сводится в первую очередь к возбуждению вагуса, а затем к его парализу, так что при интоксикации изгнание крови из сердца снижается, то сердце приближается к состоянию его замедления, затем короткую остановку в диастолу (около 1 минуты), а потом этой остановке — значительные ускорения.

Если бы такое же постановление было издано, то мы бы
хотели, чтобы оно было издано на срочном заседании
и в этот самый момент бы было принято постановление
председателя, чтобы ввиду того, что в настоящее время
не получено, но непосредственное постановление Совета
невозможно, то введение наказания должно быть немедленно
введено.


Обращение это является настоящим Манифестом, при
этом акцентуирую также: Это предостерегает (каж-
ется теперь еще не доказано), что в среду падает

основной доминантный узел - А, от которого идут
первые нервы к мышцам сердца.
Этот узел соединяется кровью с дру-
гими нервными узлами: одним симпатическим - В и
другим ускоряющим сердечные сокращения - С. Сим-
патический узел при помощи промежуточного аппара-
та соединяется в свою очередь с п. vago, ускоря-
ющий - с п. Sympathico. Если допустить такое при-
стствие узлов, то, по Шмидту, это можно об-
яснить, потому при ампутации нерва получают
остановку сердца на раздражении vagi, но - са-
мого Sinus venosi, и потому при искусственной остано-
вке во втором случае получается. Делать в том,
что при отравлении атропином доминанте эда надо
представлять так, что он парализует как ва-
гус, так и соединяющие, соединяющие между симпатиче-
ским и симпатическим узлом в самом сердце, и
остановку поэтому получают нерегулярно. При отравле-
нии никотином, кровь проходит поперек и на-
ч. Vagus, правда, парализуется, как и при атро-
пине, но остается еще доминантным симпатическим
узлом в сердце. Разрешение Sinus venosi
даже толкает к увеличению доминантности сим-
патического узла, возбуждение его по симпатическому
аппарату передается симпатическому узлу и оста-
навливается доминантность симпатического. Результатом

представляет

обращается установка самого сердца.


Мускулы гортельные не только на окончании дуги каротидной пера, но и на задермивающей узел. В ее прорезывании приподнима, посылку от и в состоянии быстрого установив сердца при параме vagus'a, произведенном микотомом.



Меня посылка
гортельная аномалия

Пунктир обозначает область, на которую, по Шмидтеру, распространяется гортельная эда.

А. - гортельный узел, Б. - задермивающий уз. В. - гортельный уз. v. - vagus, s. - Sympathicus.



Меня посылка
гортельная микотомия

Но спрашивается, что заставило Шмидтера предполагать приподнятие узла гортельного, когда явления при отравлении аномалией и микотомом легко объясняются предположением существования только одного задермивающего узла?

Дело объясняется тем, что микотом Шмидтера представляет и физию под эвением. Убедившись, что раздражение vagus'a от аномализированного микотомом не вызывает замедления, или установив

сердцу. Наконец, оно ускоряет сердечные сокращения вследствие того, что ускоряются нервы, проводящие в стволу вагуса, и парализуются симпатиком.

Однако ускорение это не является моментом же раздражения. Но раз ускорение началось, оно продолжается некоторое время спустя и после удара раздражителя. Отсюда предполагается, что раздражение передается не через первичные волокна прямо в лимбический, а при помощи ганглиозного аппарата. Максим. образом, ускорительный узел представляется как бы местом, где накапливается энергия раздражений, а потом это место трансформирует энергию в живую силу и вызывает уже извешенный эффект.

Если раздражать атропинизированное сердце непосредственно, то время ускорения совпадает со временем раздражения.

Влияние адреналина на кровяное давление и центральную нервную систему.

Различное действие никотиновой кислоты на вагус обуславливается собой и различие в состоянии кровяного давления. В первое время, когда вагус возбужден, кровяное давление стоит низко (момент застоя, задержка вливания крови и расширение периферических сосудов), поэтому с парализмом вагуса оно поднимается несколько выше нормы и наконец начинает снова опускаться, доходя перед смертью до нуля.

Что касается влияния никотины на центральную нервную систему, то и здесь еще остается, так сказать, вопрос самому себе, насколько возбуждающе и раздражающе и затормаживающе влияние.

Так или возбуждается, а потом парализуется дыхательный центр, дыхательные центры спинного мозга и даже головной мозг со всеми его высшими отправлениями. Возбуждение является очевидно самым выраженным в спинном мозге, так что сначала при никотине можно наблюдать не только типичные повышение рефлекторной способности, но даже судороги, возбуждение до спазма.

Если, напр., ладонью отряхивать кожу и даже и медленно умирать, а потом через сутки вернуться к никотину, то повышенные рефлексы можно констатировать в продолжение 1-3 дней, и только уже после этого времени наблюдается все постепенное понижение вплоть до самой смерти.

Нужно заметить, что, не смотря на все сходство фармакологии никотина с другими автономными агентами, автономизм своего выражения имеет не так ясно, как для его физиологических аналогов. Причина этого лежит, может быть, в свойстве никотина производить паралич органов, функций которых он возбуждает в первой степени возбуждения на раздражение.

Хроническое отравление никотином.

Изъ изучения фармакологии никотина мы уже знаем, какие явления происходят в организм при отравлении этим ядом. Мы знаем в состав табака, который мы курим, никотин входит, как одно из существеннейших и количественно преобладающих над другими действующими начал, но мы вправе утверждать, что аналогичные явления происходят в организм и при курении. Теоретически, пожалуй, можно было бы допустить, что при курении картина отравления будет даже более сложна, так как, помимо никотина, в состав табачного дыма входит много и других ядовитых веществ, как-то: никотианин (род камфары), синильная кислота, очень умеренно (5-10%), уксусная кислота, NH_3 , окись, креозот и кроме того антрацен, бензол, пирен и пикенин.

Содержится ли никотин в табачном дыме?

Предполагая, что никотин, разлагаясь при курении, в табачном дыме не содержится совсем.

Но предположение это не оправдалось и, следовательно, при курении табака, в организм входит никотин, который и может произвести хроническое отравление.

Количество никотина в табачном дыме колеблется в зависимости от сорта табака и его обработки. Но вообще в выкуренном сорте (западный табак) никотина 0,5-2%, в армянском 1,2-8%, в простом сорте 7-8%. Никотин падают в воздух и такие сорта, как, благодаря какой обработке,

Но при таком подходе к припадкам во внимание следует брать и время суток (Утро, День). Иногда, конечно, не следует забывать и о влиянии температуры тела на течение болезни, как при-
ступа.

Тяжелые случаи хронического отравления табаком:
Хроническое отравление вызывает следующие симптомы: кашель, головная боль, раздражение гортани; частые приступы и др. Симптомы отравления в области сердца: сердцебиение, стенокардия.

Отравления в желудочно-кишечной области: тошнота, рвота, понос, запор, анорексия, диспепсия, диспепсия (заболевания).

Отравления желудочно-кишечного тракта (анорексия, диспепсия)

Помимо этого также страдают от отравления табаком. Наблюдается: онемение пальцев, парестезии и даже незначительные парезы (Kjellberg).

Хроническое отравление табаком часто бывает трудно отличить от хронического отравления алкоголем.

Необходимо обращать внимание и на то обстоятельство, что многие из приведенных признаков хронического отравления могут наблюдаться и при других заболеваниях, среди которых наиболее часто встречаются следующие: хронический алкоголизм, хронический отравление свинцом, хронический отравление мышьяком.

иногда и при отравлении.

Не нужно думать, что табак, произведя вред,
и приносит пользу. Правда, употребление в по-
стоянное направление произведено мало, но нам,
напр., много известно и опубликованные опыты
проф. А. И. Судакова, который, изучая положе-
ние кислорода крови до курения и после курения,
нашел, что оно гораздо значительнее во втором
случае, чем в первом.

О дезинфицирующем свойстве табака извест-
но мало.

Табак имеет много и несомненно лекарствен-
ное значение (отавились с табачным курением для умень-
шения курильной перистальтики), но теперь не употре-
ляются в медицинской практике ни сам табак,
ни добываемый из него никотин.

Вещества, влияющие на деятельность сердца (сердечные средства)

Эти вещества представляют действительную
подоплеку нашей науки, так как фармакология
теоретически обречена, во всем заключается суф-
фистика нашей фармакологической физиологии, которые
достигаются при лечении известных болезней
сердца. Изучение фармакологии этих веществ имеет

[illegible]

Согласно этим предварительным замечаниям и указаниям на связь сердечных агоний с асфиксией, нами уже рассмотренными, переходим теперь к рассмотрению явления, наблюдаемого при отравлении организма сердечными ядами.

Если считать среднюю величину, с увеличением продолжительности мороза и с перерывами в инкубационном периоде, введенное прямо в кровь терапевтической дозой сердечного яда (5 капель 4-го Strophantini), то изменения в организме будут соответствовать следующим: кровяное давление неизменно понижается (2-3 см.) пульс будет замедлен, а самая пульсовая волна сгущается более вязкой.

Именно первым этапом совершенно и достаточно организуемая терапевтическое действие яда.

Но если, не довольствуясь терапевтической дозой, мы произведем повторное введение яда, то за первым этапом замедления сокращений сердца появится второй: замедление сердечных сокращений сопровождается более (почти без всякой постепенности) резким уменьшением сердечной деятельности, причем пульсовая волна становится весьма мелкой. Кровяное давление в этот период действия понижается еще более и держится некоторое время принужденно на одной и той же высоте.

Наконец в третьем этапе действия мы видим, что кривая кровяного давления образует волны,

Н. Гребенский

то погружается, то падая, и пульсовая волна отражается крайне неправильными, но в общем кровяное давление стоит еще высоко, и мы делаем отсюда вывод о прозападном сердце опасности. Но в том кровяное давление сразу снижается скачком вниз, и сердце моментально останавливается.

Однако опыт еще не кончен. Собака получает при этом судорожные вздохи и выдохи, и несмотря на весьма плохую аорту, и дыхание продолжается 2-4 минуты.

Если бы в момент остановки сердца мы стали производить искусственные сокращения из через грудную клетку и пытались воссоздать сердечную деятельность возбудительными веществами (в том числе и стрихнином, или атропином) мы увидели бы, что наши попытки остаются без результата.

Ученые же обыкновенно замечают сердечной деятельности и повышение кровяного давления, наименее во время первой стадии (для кровяного давления повышение наблюдается и во второй стадии)?

Первый вопрос можно было бы решить в том смысле, что сердце среднего возбуждается как при электрическом, так и голубой конусе вагуса. Но если бы было верно первое предположение (относительно возбуждения периферического конуса), то мы должны были бы наблюдать то же самое замедление и почти перерыв вагуса (см. Мускарин). Но самое же интересное перерыв вагуса в момент замедления сердца.

бессознательное устремление кисти к корням).

Следовательно, необходимо предполагать, что акт движения на разрыв непосредственно.

Изменение течения в бронхах стадий движения его записано, как это обыкновенно принимается, что парамидальная дуга является первой, так как разделение периферического конуса является и движением и течениями, но даже и замедления в двателестности сердца.

Наконец крайне неправильная, безпорядочная артикуляция двателестности сердца в предельной стадии движения от всасывания митрального аппарата и, наконец, самой сердечной мышцы.

Что касается кровяного давления, то приемы его повышения в первом этапе пути циркуляции (Мундт, Вильс, Барнард и др.) относятся кавальеру вращению в двателестности сердца, Вундт (Wundt) указывает на повышение в сокращении сердца.

Основания для первого мнения приводятся следующие: теоретическая работа, при отравлении сердечными средствами, становится выше, что воборот за изменение энергии; во время удивительной активности инициации рассматривается в дальнейшем совершенствовании. Следовательно, при каком-либо сокращении сердца в аорту вносится больше количества крови.

Выводы на выразительном языке сердца стараются доказать это и экспериментально, пользуясь изобретением или прибором. Сердце при помощи какой-либо

канном соединяется с сосудом, из которого в него поступает дефибрилированная кровь, а также и с манометром. После каннелирования движение крови в сосуде и том же направлении (к манометру).

Придавливая к крови каннелина уменьшаво давлении в манометре.

Но заключение этого мнения ишпоризовано только фактом, что при перерезке продолговатый мозг и п.п. Splanchnici, или, другим словом, не допустим перемены давления от его-геминативная централь в соединении брюшной полости, но она имеет еще на двателю пост сроду при этом условии и не уменьшается, — повышения кровяного давления почти не наступает, а потому мы должны допустить, что изменение в давлении обуславливается главным образом постатным фактором — сокращением венозных сосудов — и мало зависит от изменения сердечной деятельности.

Относительно перерезки п.п. Splanchnicorum важно и в другом отношении: оно указывает на двателю постатным фактором предположение, что сердечная деятельность является непосредственно на стороне сосудов, так как, если бы сердечная деятельность сокращала сосуды, была непосредственно под непосредственным воздействием (минимизация и первичные элементы), то кровяное давление должно было бы повышаться и при устранении влияния продолговатого мозга и венозных сосудов, что по своему давлению не наблюдается.

Видение армянских ереванцев на республиканские армянские
выставках доказательство и дружное мнение. Уверено, что
протекание государственного государственного закона
через государственные органы армянской республики это импер-
ативной комиссии министерства народного просвещения, но про-
блемы и в государственные органы были, но ввиду
этого армянские ереванцы значительно уменьшаются.

Многозначительность этого вопроса для нас и в
тоже, что уменьшение кровотока в государстве и в
многообразии и в государственном управлении и в
отсутствии органов, которые должны были бы
и в государственном управлении. Это же право
уменьшается, что как бы и в государственном управлении
не крови, была в государственном управлении и в
са уменьшение кровотока.

Иногда предостерегают упрямство в государственном
указании, особенно в государственном управлении
таким образом, что иногда через органы
протекания и в государственном управлении крови,
Затем - крови, отправленная наперекор, а потом
- снова и в государственном управлении, причем она - так в
государстве и в государственном управлении, потом протекания
отправленной крови, безжалостно кровотоку уменьшаются, и при про-
текании и в государственном управлении снова и в государственном
уменьшаются.

Иногда не менее, не менее на эти предостережения,
и не менее права государственного управления и в государственном

отграничиваем от органа, переносим на орган. находящийся в связи с другим соединенным органом и первым центром (Умбел, при котором гемисты ага имеют быть противоположно тому, которое наблюдается в отрезанном органе). Наме, напр., аргон уже известно популяционное гемисты отрезанного на соуде, а между тем Роберт, пропускает отравленную отрезанную кровь через соуды отрезанной кониосфы, не получив никаких результатов.

Открыты же Роберта с кровью, отравленной кониосма-маринсом и умбелом, еще более поразительны. Он пропускает эту кровь через забрюшное эмбриональное соуды, и сокращение соудов в этом случае все-таки наблюдается.

Но если мы допустим, что перерывы артерий все-таки несколько сокращаются от непосредственного на них воздействия ага, то необходимо помнить, какую роль играет в общем повышении кровяного давления при этом моменте.

Мы уже видели, что участие это, если оно и существует, — ничтожно и вряд ли может иметь практическое значение.

В самом деле, раз влияние соединяющихся центров устранено перерывкой продолговатого мозга и приближаясь к первому, — кровяное давление, как мы уже указывали, почти не повышается после сердечного сжатия. Следовательно, сердечная сжатия повышает кровяное

давление (у нормального человека), возникающая со 1) сохого-губчатый центр в промежуточном мозгу; со 2) возникающая сохого-губчатый центр в спинном мозгу, тогда как повышение давления происходит и после отключения промежуточного мозга. И затем, на втором плане - 3) повышенная энергия сердечных сокращений и 4) более тонизирующий образ, может быть, непосредственно на периферии артериального конца.

Изменение пульса.

Особенность пульса при отравлении сердечными средствами выступает в послужившей стадии наступления фазы, что совершенно ясно проявляется даже для нормального мозга. Особенность эта заключается в его полной аритмичности.

Однако изменение пульса можно хорошо наблюдать даже и при терапевтической дозе адр. Эти изменения состоят в фазе быстрого гистерического, возбуждения, по мнению Вейсбаха, стремления сердца даже, при напертом, вновь возбужденном состоянии в фазе гистерии. Но это явление может быть объяснено и иначе: фазе, при отравлении сердечными адреналином, симпатическая волна усиливается больше, но понятно, что далеко произойти усиление волны и отравленной это артериальной кровью.

На адреналиновом (надутом) сердце будет иметь место такое явление, что состояние его становится энергичнее (спазм сосудов) и адекватные перемены

в диастолу. Затем наблюдается возмущенная (перистальтические) сокращения паузы, во время которых образуются выпячивания в минимальной степени сужа, которая постепенно переходит в виду тугой аорты, и наконец сужа останавливается в резко выраженной степени, а прекращая еще слабо сокращаются некоторое время. Если после остановки сужа ввести в него кровь через аорту, - оно движется еще несколько сокращений. Вероятно, представляемая остановка сужа не была выражением его парализа, а обуславливалась, как думает Schmiedeberg, лишь "парестезией эластичности".

Ана, парализующие мышцы, также способны устранить эту остановку.

Отсюда, очевидно, можно заключить, что и мышечная деятельность латуньего сужа принимает участие в явлениях отравления сердечными средствами.

У млекопитающих поперечная сужа покрывает или в разе полудиагоны, или даже полной диастолы. Можно однако думать, что если бы сужа млекопитающих могло жить некоторое время после смерти организма, то и тогда мы могли бы наблюдать то же самое, что происходит в сужах млекопитающих (человека).

Влияние сердечных средств на почку и мочный круг кровообращения.

Мы рассмотрим влияние сердечных агентов на сужа

Рубинштейн

и возбудит на большой круг кровообращения, но из-
за того что было бы далеко и плохо, если бы мы не возму-
тили вопроса относительно движения сердечного круга
во-первых на почку и во-вторых на печень. Забо-
леваемость же между почками и сердцем с одной сто-
роны и сердцем и печенью с другой настолько
тесная и существенная, что импробовано эту за-
висимость не предполагается никакой возможности.

Если мы предполагаем существование в почках
какого-л. болезненного процесса, в нем, которого бу-
дет затронуто почечное кровообращение, то, несом-
но, процесс этот затронет также ^{печень} ~~сердце~~ ^{печень} ~~сердце~~, что-
бы пропало крови в ту часть сосудов и местного
кровообращения, которые пронизывают все бездельно
почку. Но не самое нужно сказать и относительно
но печени. Наоборот, заболевания сердца должны
вести к заболеваниям почек и печени.

Какие же бывают сердечные болезни на микро-
скопическом основании почек?

Почка как почка без изъединенных сердечных аор-
т не является ни морфологическим элементом почки,
а лишь изъединенное кровообращение в почку, но и на-
много большее значение может зависеть от
того, или другой состояние кровяного давления. Если
почка не стоит ниже того оптимального, какой на-
много дал морфологии, то сердечная болезнь, дающая

ураговането, ако азиче не сега не

отличается от агров сусупонных (см. сусупонный стр.)

Это различие между сусупонным агров на малой кру-
тотелости, то, не смотря на доброту вещества этого
вопроса, он есть-есть или заготовить, а не извешивание
отношений между давлением в малом и большом кругу
(Аннинский, Косов, Багд, Аннинский) и прийти к вы-
воду, что малый и большой круг представляются сущ-
ности не только одна от другой извешиванием отно-
сительно разности давления, выходящая на давление
в большом кругу, но это много извешивание давления
в большом кругу и даже в противоположном направ-
лении.

После этого подтверждается отчасти заключение вышес-
казанное. В то время как в большом кругу давление
в первое время было нормальное, затем постепенно сво-
ею максимумом и только после этого заключение на-
чалось; в малом кругу, наоборот, давление началось в на-
чале заключения ниже нормы, потом постепенно норму,
поскольку давление и в большом повышается только
тогда, когда давление в большом кругу начинает
падать (Аннинский)

Проф. Аннинский, на основании своих извешиваний, при-
шел к заключению, что digitalis имеет максимум давления
на уровне сердца и не производит заметного возмущения
на уровне кровотока и правый желудок.

Необходимо отметить еще следующее заключение агров

(наперетамни) понижается температура (в правой
кишечник). Это явление зависит от сжатия арте-
рий в брюшном пространстве и, следовательно, от более
значительного наполнения артерий на периферии тела
(см. странный стр.).

Патологическое употребление сердечных средств.

Самое название рассматриваемых веществ, или агентов
указывает уже на ту область, в которой они при-
меняются в терапии.

Не требуется здесь представлять полную клини-
ческую картину сердечных расстройств, так как
это относится к области частной патологии и
терапии; мы позволим здесь только вкратце косну-
ться этого вопроса, именно поспешая, поскольку это не-
возможно для выяснения истинного положения.

В течение различных острых заболеваний, чаще
всего в течение острого ревматизма сердца
наблюдается своеобразное заболевание (интоксикация),
при котором страдают клапаны (прогрессирующее утол-
щение и др.) и отверстия сердца (сужения). Типичное
образное изъединение клапана уже не в состоянии
полностью препятствовать к закрываемому им отверстию.

Расстройство работы постепенно, так как это на пер-
вых порах больной даже и не подозревает о соверша-
ющемся в нем болезненном процессе, тем более,
что сердце само старается компенсировать происшедшие

Возвращение крови в сердце происходит, когда капилляры не в состоянии захватить ангио-вентрикулярные отверстия нового сердца, и поэтому, что происходит в данном случае.

При гистологическом исследовании из предсердия в артерии выходящих, но при этом часть этой крови переключается снова в предсердия. Не имея оттока в аорту, кровь возвращается в сердце, но затем возвращается в том же месте крови, который возвращается из нового сердца. Многие образцы показывают переключение крови между предсердиями, что в свою очередь может объясняться функциональными нарушениями, кровоизлияниями, отеками.

Что же происходит в этом случае с сердцем?

Оно характеризуется сокращением сердца и неспособностью сокращаться, что приводит к функциональным, анатомическим, объясняется возможным новым изменением сердечной мышцы. Но кроме того, сердечные средства вызывают гистологию. Благодаря чему кровь совершенно оттекает из нового предсердия в артерии выходящих и не застаивается в сердце, а также вызывает систематическую работу, анатомическую, способствующую восстановлению функционального состояния крови в аорту. Все эти факторы взаимно и создают функциональные возмущения сердечных средств на фоне.

Возникли и другой случай, когда агро-ветеринарные отобранные случаи, когда Krebs в своем отношении к животным не удовлетворенно переключился в науку и так же, как и в первом случае кончился в итоге.

Како завој голицыма сирдце бивамо?

Прислать в наряд бухгалтеру для приобретения гинетической спазы и ее употребления в пищу.

2) Асимметрией и более значительная степень асимметрии
мозжечковидных, т.е. более она очевидна
в более совершенную организацию мозга предсказана;
более не симметрией мозжечковидной предсказана совершен-
но безразлично, ибо симметрия мозга записывается сим-
метрией.

Но не самая возмущенная извращения, какая мы
видимся для априор-визуального понимания, может
произойти и в понимании априорного: и здесь может
произойти или упрощение априорного знания, или отнюдь
не априорного понимания.

Если мы будем иметь дело с настоящим суждением, то заблуждение будет характеризоваться тем, что обычная система будет не в соответствии с действительной силой протекания крови в артериальную систему, и запертые аорты, компенсировавшись сначала инертно-природными силами, будут переходить, при возбуждении сердечной деятельности, в более и более. Сердце суждено, давши больше, при этом разстройстве, совершить ошибку более грубой, но так как такое

почти закрывается отверстие, но изгибание диафрагмы
будет различно для отверстия аорты. Но для этого
и различно величина перикардиальная система, которая будет
густотой, чтобы предотвратить кровь в аорту.

Итак в первом случае система сердца является
абсолютно полезной, а потому и крайне не-
замечательной.

Второй же случай происходит в том случае, когда
изуродованный аортальный клапан не вполне закрыва-
ется аортальное отверстие.

При этом в том случае кровь будет изгнана
отверстием в аорту, но при этом часть
крови опять вытекает назад и, не выходя для
себя прираща со стороны клапана, снова поступает
в желудок.

Представим теперь себе, что масса крови не
даст какой-либо сердечной системы. Перикардиальная
система предотвращает кровь в аорту, густотой и режёт ар-
териальную кровь, но когда наступает густота, кровь мо-
жет быстро оттекать от мозга назад, при этом
обратная волна будет только больше, чем естественная и
густота диафрагмы. Если же наоборот, то при этом
положении больного аорта может в том случае
показаться быть еще опаснее. Различная же погрешность
анализа может быть влиятельна и даже смертельна.

Выводительно, на основании теоретических соображений
подписано

пороча артериального кровотока представляются собой противопоказание для употребления сердечных средств.

Но пороча сердца часто является компенсированным, а сердечная деятельность, внося неблагоприятный момент при порочах артериального кровотока, компенсируется за счет прироста с другой стороны, именно: редуцируя сердечную деятельность, уменьшая систолу, уменьшая кровоснабжение в легкое, уменьшая кровоснабжение в почки и пр.

Во время этого и в данном случае при сохранении нормального сердечного кровотока при возникновении необходимого предосторожности (напр. пороки в кровотоке, загромождение внутреннего перитонеума в положении больного).

Поэтому чтобы избежать относительного перитонеального кровотока употребления сердечных средств мы должны кратко организовать его ситуационным образом: значение сердечных средств сводится с одной стороны к уменьшению оттока крови из сердца и увеличению легочного кровоснабжения, что достигается уменьшением диастолической фазы, и с другой стороны — к уменьшению наполнения сердца путем повышения энергии систолической фазы.

Из изложенного видно кроме того, что в данном случае для больного особенно важно, чтобы найдены продолжительной была диастолическая и краткой систола, в общем — наоборот.

Но тогда, не вправду ли мы требовать, чтобы фармакологи указали нам, какие из сердечных средств понадо-

или приводем для первого случая, и какия - для второго.

Мы не можем однако дать подробнаго изясненія, такъ какъ сравнительнаго анатомическаго изясненія сердца сердца въ данномъ направленіи не было сдѣлано. Конечно, при изысгованіи гортаннаго сердца сердца, можно было бы составить подробнаго сравнительнаго картографическаго произведенія и сими гортаннаго и легочнаго и приводемъ, на основаніи этихъ данныхъ, то или другія сердца сердца, въ оныхъ формахъ этихъ вопросовъ представляется значительнаго различія замечанія.

Клинически изясненія въ сердечной гортанности у больных въ первомъ разсказѣмъ констатируютъ подробнаго сердца сердца выростаются обыкновенно въ анатомическаго абнормальности: такъ какъ сердце гортанности, различныя сердца уменьшаются, ритмъ неправильный и ритмъ, сердечные тоны и пульсъ выростаются асимметрично, пульсовая волна сильная и полна.



Кардиологическое изысгованіе сердца сердца даетъ достаточный матеріалъ для того, чтобы объяснить эти изясненія въ гортанности сердца у больных. Остаются только не выясненные моменты изясненія сердца сердца въ возбужденіи самой мышцы больного сердца.

Изясненія сердца сердца на мышцу.

Вопросъ о вліянніи сердца сердца на самую мышцу.

ную ткань представляется далеко не выясненным, ибо
имеет возможность вполне изгнать массу сердца
от исторического аппарата и мембранного контура.

Если и были попытки решить вопрос на верховном
языке сердца, то против этих попыток можно
возразить, что 1) сердце адекватно возбудителю
на сердечной оси и не, как сердце мембранное
и 2) управление иннервации и кровообращения извне
сердечной массой далеко не в такой степени
посредством таких изменений, что переносит результа-
ты взаимодействия с тканью и иннервацией на специфич-
ную иннервацию и кровообращение представляется
еще не возможным. Движение же непрерывно на по-
перно-поперной линии характеризуется и возмущением
массы, а уменьшением ее. Не смотря на то, Шмидт
сводит к значению сердечной среды ввиду
ее способности возмущать сердечную массу.

Но все вышеизложенное сердечная среда сама и возмуща-
ет массу сердца, но возмущение это неустойчиво,
но крайне мало, и слабо. Но мы, конечно, далеки
от мысли утверждать, что все относительно
сердца уже давно, уже установленно в своей значимости.

Можно сказать, что в состоянии сердца возмущение
далеко неустойчиво, но оно зависит от внешнего
влияния сердечной среды.

Въ началѣ настоящаго года г-нъ Плещинскій изъ-
говаряе забвѣніемъ габенія Арбушъ въ бранный архивъ
отъ габенія въ Забвѣніе Арбушъ и намере, что отъ
габенія извѣстнаго напечатано.

Отсюда можно считать вполне вероятное предположение, что в период разстройства сердечной деятельности, когда кровяное давление большого круга понижено, питание сердечной мышцы совершается недостаточное вследствие низкого давления крови в коронарной артерии.

Но такое широкое изучение необходимо и для неопределенного обличения врагов, и для аргументации и взаимного сближения.

Выводятельно, если вправу будет пользоваться толь-
ко машинным коммиссионным вычислением, которое разовь-
ется первой ступени развития вычисления, т.е. замечается из-
менения в состоянии кровеносного давления, то в таком
случае повышение давления должно несомненно отразить-
ся благоприятным образом на питании сердечной мышцы,
а усиленное возбуждение трофоэпифиза прибора должно
упорядочить сердечную деятельность и уменьшить от-
каз быстро и безболезненно развиться сердечной мыш-
це.



Три назначения сердечных средств коммунистическое предположение то тому, то другому сердечному.

Но важно и правильное понимание того, который процесс
 он же является из употребления понятий. Препод-
 не понятием группы естественных естественных понятий
 по всей вероятности, адекватное понятие. Это в то
 что и переносимости того группа понятий естествен-
 ных понятий два понятия группы: первый, который
 является возмущением мороза, и второй
 понятием его. Это естествен, при котором первый
 понятие (переносимости) группа понятий понятий
 понятий, и это понятие, что первый понятие естествен-
 ных понятий понятий (переносимости понятий)

[illegible]

и некоторым другим средствам производятся две группы
операций, одна непосредственная, и со вторыми со-
путствует также применение в критическую обстановку
средств, не столько на то, что непосредственно они
наблюдения, сколько также, другая группа.

Влияние сердечных средств на дыхание.

Всем известно уже упомянутое в том, что сердечные
средства вызывают кровообращение в легких и воль-
но, следовательно недостаточное кровообращение и вызы-
вают отек легких в период разгара болезни. Это
известно в том, что в легких кровообращение доста-
точно для того, чтобы вызвать то же явление в со-
стоянии органов дыхания, которое мы наблюдаем при
названии сердечных средств (прекращение дыхания, бронх-
ов, кровообращения).

Но помимо известного воздействия сердечных средств
на органы дыхания при пороках сердца несомненно
также на влияние на эти органы и у нормального
человека.

Многие сердечные средства вызывают дыхание в об-
ществе сердца сгущенным образом (напряженность дыха-
ния усиливается).

В начале дыхания дыхательная функция замед-
ляется, или прекращается совсем; она восстанавлива-
ется постепенно до $\frac{1}{2}$ -1 минуты. Затем раз-
вивается процесс усиления дыхания, при этом количество вы-

азиатского возгуса возростает в значительной
степени.

Наконец новое состояние аргуса и падежа
кровоного дубения, азиатские же провозвещает в ме-
не 3-4 минуты. Какое же в этом состоянии
азиатское бичие кровоизлияния неким, но можно
думать о неосредствительном возгнании аргусов
среди на азиатских же генеро.

Условие

восточной азиатской аргусов.

Напереманка.

(Herba digitalis)

Напереманка азиатского не азиатского не
азиатского, как бичие бич аргусов аргус, а потому отню-
дешне и не азиатского бич аргусов бич аргус, а
наши же азиатского в азиатском аргусов аргусов.

Древнейшие названия напереманки - азиатского, а-
зиатского из на азиатского и азиатского (1844), азиатского
на азиатского бичие, не азиатского в аргус. Азиатского
позже (1871) азиатского аргус из азиатского азиатского
азиатского при азиатском азиатского напереманки
уже азиатского бичие, азиатского на азиатского а-
зиатского, ^{наше} не азиатского в аргус. Азиатского

губерние Тонкин, Камбоджа и другие государства. http://v

В то время была введена в гражданскую службу на-
переманку только одним из 1875 года, когда Мануэлю
намеревался в напереманку уже истребитель граждан-
ской, а именно: гражданство, антропический класс, гражда-
нство (распространение в воду) - намеревался антропический по-
мощь, гражданство и безгражданство беззастенчиво и неосознан-
но признать, не распространение в воду - гражданство.

Продукты расщепления глицерина и глицерина-
глицерина и глицерина представляют собой
содержащие воду (глицерин) и потому также влажны
до известной степени вследствие содержания сероводорода.

Негативовъ въспренъ и гниѣнбывшій въ началѣ перепечатан-
на въ похвѣрна новѣи переработанъ, и Киниани явилъ, что
гущинами Манахѣра, при получении его по способу
абонента, есть истинны и ясны началъ перепечатанна.

Результаты анализа: *Cruciana digitalinum verum*,
содержащая незначительные примеси и распадающаяся
в воде (в количестве 1:1000). Формула $C_5H_8O_2$.

Наша горбана производственна енергия въздуха-
на вана, напестанна не без основания предпостав-
ена притом сержантство сержантство, но она имате
то не не брела и ето небезопасна енергия.

Итак максимум небывающего становится гарантией ее
на определенное время отныне прежде всего производя-
щего иногда непременной формы, обреченности, но неиз-

Н. В. Бончак

нио некоторые препараты, ее разграничивали сгущением на изгибных оболочках медузы. Но другие были привнесены в море, что digitalis возбудило сами флорный центр. Преполовение это медузы за себя море оранко, что флора разбавляется и морская вода приема напертом, т.е. когда медузы гонимы это воскабливая урзу медузона отомки адр укс в состоянии оказано две гонимые и на центральный перемычку.

Если же непосредственно значительны, то заведомо из-
вестно, что субъект субъекта, заведомо от многообразия
нашего предмета и, конечно, быть, наиболее образно
оттого, что же оказывается парадоксальное бытие
на самом непосредственно-повседневном уровне.

Учреждениям, принимающим участие в проведении мероприятий, связанных с реализацией программы, предоставляется возможность участия в работе по реализации программы.

[illegible]

примамки (напр. багряноб. навозом и т.п.) и т.п.

Главное патологическое значение наперстка известно в период сердечной недостаточности, вызывая главным образом отек легких, а также и отек других органов.

Наперсников при этом не признаю. (Примеч.) В виду того, что еще не была выявлена в составе опавших с пернатками, возникающие в нашем кругу новые явления раз-
бавно происходят.

Во Франции, на основании данных экспериментальных исследований, при применении, как гидрогениза, так Digitalis в виде лекарственных форм абсорбция лучше, чем при применении препаратов на основе билина на аргентинском гидролизе. Во Франции также в 1992 году, при этом гидролизе, абсорбция, при применении билина в виде препаратов, составляет 1,22-2,66%, при этом абсорбция 6-7% при применении билина.

[illegible]

содержит барит, без него, за удержание 2-3 атмосфер, надобно
добавить такие другие препараты, чтобы за соответствующим
наименованием добывать газу соответствующим при при-
готовлении метана.

Винстон и Лаш при этом несут ответственность, показывая,
что есть такая же задержка в развитии.
генерации в приготавливаемых газу и переработке
окисления. По виду этого, можно думать, что переработка
и не в состоянии производить без этого количества на
задерживающей аппаратуре.

Несколько предположений, что такое же и сейчас,
содержимое в соответствующем состоянии задерживающей аппаратуре
интересно наблюдать в виде быстрой реакции замещения аэра
при получении аэрированного газа.

Впрочем, и сейчас в данном случае имеются некоторые ана-
логичные моменты.

Следующее явление, происходящее при этом, не
нужно думать и для дальнейшего изучения.

Рр. Инг. фл. digitalis
(20,5) - 180,0

2.1. По количеству воды, упавшей 2 раза
(при повторении опыта)

#

Рр. Инг. фл. digitalis
(24,0-2,0) 180,0

2.2.

(при приготовлении метана)

Нынешнее при таком заурядном, но зато достоянии
quantitas digitalis, брассе обзавести поваренные блюда и
менее 2 паза в день и очевидно бесчисленным образом
за составление мяса и конфектами бургонскими мо-
ди. Как замечание мяса мышкам не менее повар (50 и
менее в день), как конфекты мои бургонские куш-
максы, как поваренные блюда поваренные кушмаксы
и бургонские кушмаксы, но при этом поваренные блюда
густо препарированы не менее.

В аргументе поваренных блюд замечание мяса
аппетитно поваренных [0,0005] густо в день в поваренных
не менее поваренных.

Там же замечание digitalium verum, но поваренные
масса припарированы и в аргументе поваренных блюд
и в не менее поваренных. Массе Digitalium поваренных 37 арг-
ументов поваренных аргументов, аргументов массы пре-
парированы, и при этом в аргументе, что они арг-
ументы не менее.

Надлежащее на поваренные блюда не менее и поварен-
ных, масса как digitalium verum бургонские куш-
максы поваренные бургонские и густо аргументы.

При поваренных поваренных густо бургонские бургон-
ных, что аргументы в поваренных густо поваренных бургон-
ных поваренных, аргументы поваренных поваренных бургон-
и аргументы. Массе в аргументе Роберта в аргументе
но 10 бургонских поваренных и поваренных, что digitalis густо
не менее бургонских в 10 паза аргументы, масса digitalis поваренных.

Грабмюссон: improve раскрепощение науки и про-
гресса в области изобретения и в том числе в области
(Техника) (1875-1878). Промышленная наука образует:

(24,0-80) - 180,0

Воспаление слизистой оболочки носа и назначается в носу а-
то в воспаленной слизистой оболочки слизистой оболочки,
хотя воспалительный процесс распространяется на слизистую оболочку
носа и носовых пазух и в носовых пазухах и в носовых пазухах
носа (0,001-0,002). Купирование воспалительного процесса

Уже набухшая гниющая² дождевая вода³ омыла
брызгами наш плыль и носы.

(Semen *Staphantia* - *Aracynaceae*)

Время отныне погасло и разлитое вглубь пространства, распространяющееся в пространственный Азвучен.

Strophanthus hispidus u. *Strophanthus Kombe*.

Родовитая сосна растет у туземцев, где приращива-
ния сосновых деревьев еще в прошлом году устроены,
какие сведения из Бюро мнѣ.

Из рациональной функции вычтем $\frac{1}{x^2}$ и получим

сегментов сегмента 4-го Strophanthi, наклоненная вверх
коричневой, но на ней паразитическая, - 8 канул на один сегмент
и 30 канул на один.

Двухмиллиметровый наклоненный сегмент абакса го-
ворами вверху. Препараты извлекаются сегментными, а-
рабры паразитическая в бугор. Сегментными вверху
всасывания и вверху углубления из углубления. Показаны
от двучмиллиметрового двучмиллиметрового наклоненного, но зато и двуч-
миллиметрового в бугор паразитическая. Рядом с абаксой
и наклоненная (Möller)

Конический маринус

(Anonymum cannabinum - Anonymaceae)

Конический маринус абакса один из новых
сегментов сегмента, хотя уже несколько раз на-
зад употреблен в бугор извлечен в Америке.

Употреблен паразитический маринус вверху на-
клоненный. Франклин, но паразитическая паразитическая
извлечения и углубления паразитическая углубления того
всасывания сегмента 4-го U. U. Doreckman, который
показан весьма хорошо извлеченным от маринуса го-
ва в бугор сегмента, когда всасывание сегмента на-
клоненная. Доза - 8-10 канул 3 раза в день (Extr. fluid.)

Двухмиллиметровый наклоненный конический маринус
признается извлечения анонимуса, весьма наклонный

подобен

препятствую, не употребляя имени пономаря в переписи.

Helleborus (Ranunculaceae)

Br. *Epione pygmaea* nri. boga Helleborus'a, a mien-
no: niger, viridis u. guttatis; semper uer nix (viridis);
aperte utrumque hinc quibus speciat, homogene uno
maxime ut, hanc pinnam u. adunatam, murem qua-
rent in huncmodi epigynis huiusmodi.

Dicentra viridis var. *viridis* - var. *viridis* n. var.
viridis.

На черенка *Nelliborus* а, какъ изъясняю, въспаривъ
близости нррр. С. П. Комаринъ, въ изъясненіи Комаринъ
напрямую изъясню гониміи ехр. гледи *Nellibori* vividis
на черенкахъ и ботаника а-ромъ *Thermobaculus*.

Итак как Любомир измывался своим правом
пробавки жалованья в Боснии и на самом деле пробав-
ления, то и в присутствии новоселов убого из
описи, показывавшей, что в наем жилища эта
жалованья в наем деле не платилась в то время, когда
в Боснии-то обманывал (см. стр. 116)

Болытай Круу

Maurice Argyer

g. bregenia, 97 m.m. (cont. 100 m.m.)

17 m.m. (18.5 m.m. at 100°)

aya 1 88 m.m. (" - ")

14 m.m. (11 — 12)

Въ Дзержинскомъ (174 м. м. " — "

13 m.m.

long bluish. Est. 112 m. m.

{ 12 m. m. (: - -)

H. Vell. virid. 116 m.m. (10-11)

11 m. m.

В мерении брусни габени нормаль бурбунбамба.	
Босбуни брусни	Мамми брусни
127 m.m.	11,5 m.m.
166 m.m.	14,5 m.m.

Мамми нормаль габени в мерении брусни бурбунбамба
обращают внимание, что белобуси энцефалитический характер
аппетитивных свойств и инстинктивных свойств брусни
брусни в мерении брусни, и брусни норм, но в мерении брусни
брусни, что при этом характерная форма аппетит
нормаль.

Мамми брусни характер аппетит. Брусни бурбунбамба
на бурбунбамба брусни, но инстинктивных свойств брусни
нормаль брусни и брусни брусни норм, но в мерении брусни
брусни в мерении брусни при брусни брусни брусни брусни
нормаль брусни брусни.

Extraction fluidum Mellebori viridis Брусни брусни
нормаль в мерении брусни 10 брусни (1% брусни) на брусни
нормаль.

В брусни брусни бурбунбамба брусни брусни брусни брусни
брусни (брусни, брусни) и брусни и брусни брусни брусни
брусни брусни брусни брусни.

Grindelia robusta (Compositae)

Брусни брусни брусни, нормаль и брусни брусни
брусни брусни брусни брусни и брусни брусни брусни
Grindelia robusta на брусни брусни, но брусни и на брусни

Theriacum Scindeliæ robustæ - Extractum glycerum, br bucy
mawî agoburwom pascenîa, pascenîa br agoburwom
pascenîa agobur (om 30 kan. go mawî wosom na pascenîa)

(*Spartium Scoparium*. - Papilionaceae)

Препараты имеют применение в комбинации с анальгетиками - *Sparteinum Subcuticum*. Дозы от 0,01-0,02 (в растворе и микстурах)

Морской мур

Одно *Silla maritima*. Морские животные из этого отряда
уже гребными ларвами. Двухбугорчатое начало спинного валика
на спине и крошечные гребни по бокам спинного срединного, по краям

Кривоизогнутые бывают еще: сферические, эллипсоидные, цилиндрические и пр., не изогнутые ни в численном, ни в пространственном направлении.

Калина сизотра.

Kalium (Kali) nitricum.

Проп. Л. П. Тютчев, еще в 1867 г., указывал на хоро-
шее влияние минералов ^{соды} гашеная при разлитии в кончен-
ный сироп, но впоследствии ему пришлось наблюдать
большое количество случаев такого рода при французском
порочном сиропе, при этом же сиропе не оказывали ма-
лого влияния, почему-то в большой мере вливаясь
гашенной содой, как это было известно впоследствии,
каинату сиропу в небольшом количестве (вспомогательном).

Въ виду того, что впрямую произведенный
мнѣ рядъ наблюдений, благодаря которому онъ доказалъ,
что сонитра не только можетъ съ успехомъ замѣнить
наперстянку, но даетъ хорошие результаты и тогда, когда

В отношении чистой приращивания капитала ипотечный капитал сродни средству или посылке, но так как

в химическом на ряду с перемешиванием нами бензином употребляется еще два других бензины, то органического или же разложившегося вещества, хотя бензины эти различия в органическом и разложившемся от того, как они по необходимости при определенных условиях в водном растворе.

Такими бензинами являются:

Коопериты и Метформин.

Бензины эти замечательны в том отношении, что по своему химическому составу они весьма сильно отличаются от бензинов, выработываемых в наших органических условиях, в том раз. химическом отношении. Взаимодействие с водой можно представить следующим образом.

В органических выработываемых между прочим бензины состава $C_5H_5N_5$ (агенины), которые Кисель разлагается, как органические радикалы - агенины $C_5H_4N_4$ с группой NH (амин) и называется по агенин - амин.

Агенин, окисляясь, дает ряд производных: агенин - оксид, или метформин - $C_5H_4N_4O$, агенин - диоксид, или кооперит - $C_5H_4N_4O_2$ и наконец - агенин - триоксид или метформин - $C_5H_4N_4O_3$.

В кооперите атом водорода может быть замещен группой метила (CH_3), тогда происходят новые ряды соединений: метил-кооперит - $C_5H_3N_4O_2(CH_3)$, метформин $C_5H_2N_4O_2(CH_3)_2$ и, при замещении трех атомов водорода, кооп-

группы $C_5H_4O_2(CH_3)_3$.

Выводы: метаболиты, по Кассио, есть ги-мнотин-аг-
нист-аг-бензол, а корпоратив - три-агнотин-агнотин-аг-бензол.

Таким же из этих бензольных метаболитов. Ассимиляция
в раде (за исключением самого агнотина) более или менее
изучены и бензольные из метаболитов, или других производных,
вырабатываемых организмом животных и растений.

Также метаболиты найдены в моче (уро-метаболиты
= параксантин), а окисленный агнотин (урина $C_5H_5N_5O$)
вырабатывается в организме человека в моче, или
печени, или в моче (урина). Также как урина рибозы со-
держит урина в моче уринального каталитика, но, по
мнению Грина, совершенно агнотин-содержащая и
моче-содержащая, отсюда уринальный метаболит в мо-
лекул метаболит.

Таким образом, очевидно, что в моче человека
есть бензольные метаболиты, которые относятся к метаболитам
но-полосатых млекопитающих: у млекопитающих метаболиты (ка-
лицины и бензольные) они вырабатываются мочой и производят
окисление; (отсюда урина корпоратива вырабатывают производные
моче-рибозы мочевых (Robert)); у млекопитающих, при на-
употреблении, наблюдается еще выделение метаболитов в моче-
гидраты и гидратированные соединения метаболитов-полосатых
млекопитающих.

Но так как организм млекопитающих производит по сравнению
на млекопитающих метаболиты, то корпоративы относятся
для уринального агнотина не выделяются.

5° температура повышается при согревании, благодаря со-
буждающему действию на нервные (мозги и нервы),
значительно повышается (1,5-2°), а вместе с тем
уменьшается азотистый элемент и повышается белкового,
т.е. белковые процессы в организме становятся
преобладающими.

Макс-возбуждение волевого мозга (замечательно, что
возбуждение это не происходит во сне) сказывается, при
наличии глоток, декомпенсаций, а при бодрствовании — возбуждением
эмоциональным, интеллектуальным, волевым; возбуждение
прогнозируемого мозга — усиление деятельности глоточного
насоса (уменьшение глотания) и внешнего дыхания (полностью
исключается глотание) — глоток, и наоборот, при гиперемии
координирующей системы (а. в. в. в.), происходит усиление
внутреннего дыхания (глотание) и (у части животных) глот-
ки не наблюдается бодрствующи бодрствовании, как правило,
координирующей системы с мышцами!

Уменьшение объема производства, а также и оптово-розничной торговли.

Отправления изъёмных и гвардейских частей
в распоряжение комендантов и командиров совершенно прекра-
щаются.

Coffeinum natro-cinnamyllicum (50% Kapseln).

Успешное проведение работы в соответствии
с планом (как в основном, так и в деталях), при
адекватном выполнении и выполнении.

Rp. Cozzini nastro-ben-

zoi 0,1

Sacchari albi 0,3

+ M. f. pulvis.

Q. L. d. v. s. N° 10

S. 3 page br gens no nepomny

≠

Rx. Coffeini - 5.0

Sir. Singl. 120,0

МДЗ. По 4-5 минимумом точек в день (по-
средневый курс организатор)

Умо кацамена купе, но бидејќи е на одморачко одморачко-

*) Ввиду нехватки бумаги переписаны лишь необходимые сведения

Примечное направление копе егда и возмозно. Именит
же и переносит копе (субординирование, ерхуежение), но вонде
в мнзе ерпанас, гдз нмзе копе беемз рашпротранен
(напр. во Германи). Какже-и. ерпанас поаженит, како
же мнзе беемз поаженит в забавенит оне гво-

Сынако Мензель прилагает следующие симптомы про-
мисского отравления: кожная сыпь, онемение конеч-
ностей, тремор, рвота, тошнота, головокружение,
головная боль и пр.

Несомненно, что раздражения сердца (в период коммун-
кация) и умственный возмущение являются причинами протуберан-
тообразования во время беременности.

Теофилу

Дно болше берзета Accumulatus раса, спинациято нито
раса на злато изобилие, изуено погоре, нито не разв-
трянати нито корабите.

[illegible]

Исследования по обитанию грибовых насекомых в лесах
(Исследования), по их распространению в лесах в связи с изменением
климата. Леса в настоящее время представляют собою, главным
образом, в лесах - *Theridion* *salicis* (Dietrich)
изменяются по мере развития, развития и др.

Водородом называется, что является, при введении в воду
в воде, является замедлению горючести воды на карбо-
не воды, а затем и углекислоты и. Пробене является вода-
но, является на углекислоты, и является на углекис-
лоты является горючести, и является, что вода была и на-
ла, является в переносимости воды.

Затем же является вода является от водородной
гидратации воды является, а является - от является
на является водородной является, но не от
является водородной является, является в воде не
является является от является является.

Водородная вода, что является является на на-
та не, как и является. В водородной является от является
является является является, является является
является, является является является и пр.

Водородная является является является, является
является от является является, является.

Водородная является является является, является
является, при введении в воду, является на является
является. При является является является
является является является (а не является, как
я является при введении в воду) является является.

Водородная является в является не является
является, а является является является является
является является (является 5,0 в является). является
является является в является при является, не является

Как мочевина, тирозин и цистеин принимают
са при окислении серы; в других случаях, напр. при
гипоксигении, ванили и др. веществ.

M. 85. *Upezu mas (um gba) no enawon*
umaw.

сокращающія сосуды.

[illegible]

rozprawy wygłoszone, oraz biuletyn nasz bieżący, mo-

называются мабуны, вразомъ въ мунгуе муну.

Многъ ланъ сопранъи вразомъ въ вразомъ пробованія
составляющаго сопранъи поименованъ, но онъ не берется
многомъ ланъ поименованъ въ ланъ берется пробованія
мунгуе. Но же муну, муну мунгуе муну, и муну
пробованія пробованія, ланъ ланъ вразомъ, мунгуе
муну, въ ланъ муну вразомъ муну онъ сопранъи
мунгуе. Въ муну муну ланъ ланъ ланъ ланъ
и муну муну. Муну муну муну муну муну муну
муну берется муну пробованія муну ланъ муну.

Противъ сопранъи вразомъ ланъ ланъ ланъ ланъ
муну ланъ ланъ ланъ ланъ ланъ ланъ ланъ ланъ
въ ланъ ланъ ланъ ланъ, и ланъ ланъ ланъ ланъ, муну
муну ланъ ланъ ланъ, а ланъ ланъ ланъ ланъ ланъ ланъ
лланъ ланъ ланъ (муну).

Противъ (Secale cornutum)

Противъ ланъ ланъ ланъ ланъ ланъ ланъ ланъ ланъ
лланъ ланъ ланъ, но въ ланъ ланъ ланъ ланъ ланъ
муну ланъ ланъ ланъ (въ XVI в.)

Не муну ланъ ланъ ланъ, ланъ ланъ ланъ ланъ ланъ
лланъ ланъ ланъ ланъ ланъ ланъ ланъ ланъ ланъ
лланъ ланъ ланъ ланъ ланъ ланъ ланъ ланъ ланъ.

Ланъ ланъ ланъ, ланъ ланъ ланъ ланъ ланъ ланъ

данному вопросу вопроса несомненно образом представляется
и на основании фармакологии данного вещества, которое на
построении изобретения на основании этого случая представляется
оценкой и анализом изобретения по принадлежности к изобретению
различным образом.

Вопросом не так же, как и вопрос, связан с тем, что
можно уже потому, что вопрос фармакологии, производящий из-
менения со стороны, и по мере необходимости сказать, что
он является с тем же самым веществом, как и вещество
и другое, так как такое вещество может быть и не имеет и
до настоящего времени.

Также, Роберт является тем же самым веществом, но в пер-
вый раз он не является в фармакологии, а в-второй
не является тем же самым веществом. Для настоящего
времени в первом изобретении является веществом, которое
и, но и тем же самым веществом и является веществом, которое
является веществом, которое и, следовательно, и является
тем же самым веществом за исключением с тем же самым веществом.

Можно сказать, и сказать, что, по изобретению
является веществом Роберта, которое является тем же самым
веществом, которое по тому, что является тем же самым
веществом (в первом изобретении), или же второе вещество (второе
изобретение), которое является веществом, которое является тем же самым
веществом, которое является тем же самым веществом.

Также сказать, что, по тому, что является тем же самым
веществом в тем же самом веществе (до 35%), которое является тем же самым

Роберт

Всё это рассуждение, как мы уже говорили, имеет
цель дать изложенным фактам при более подробном
рассмотрении и тем не менее (напомним, однако, в виду
нашей задачи, а именно: рассмотреть), а именно — по-
пытаться в изложении и рассмотреть факты, как
они являются при рассмотрении фактов, и в то же время о
каждом из них.

Hande Zee mis uitdrukt, langzame zonsopgang en prominent Noordnoordwest

на немца. Востановилъ въздухъ изъ мѣстъ арменіи, которыхъ нѣтъ
здесь бывшихъ и нынѣ снѣгу въ году, востановилъ изъ переселен-
ческаго общества въ Вегенію востановилъ снѣгъ. Тамъ
Востановилъ востановилъ востановилъ востановилъ востановилъ
въ году) и, востановилъ востановилъ востановилъ, но не востановилъ,
востановилъ востановилъ востановилъ востановилъ востановилъ. Востановилъ,
востановилъ, нынѣ снѣгу въ году востановилъ на востановилъ востановилъ
востановилъ, востановилъ нынѣ и востановилъ востановилъ востановилъ
но востановилъ востановилъ востановилъ востановилъ востановилъ,
востановилъ востановилъ востановилъ востановилъ востановилъ.

Вскрытая гортань показала обшлагом опухоли мозга, Го-
рейна также замечало, что кровоотечение носит обширный
характер, или даже обшлагом распространялось. Сосуды
переперепреставались, сосуды суживались назад кровью
и габриел в ~~состоянии~~ агонии.

[illegible]

нес. Естественные законы-моральные характерны
и переработаны моралью в ~~мораль~~.

В произведении мысл. деятельности возбудяется естес-
то-губительный и гласный центр и закон мор,
по Роберт у, так же возбудяется и центр поведенной
двух ступеней мысли, заставляющие сопереживать маме.
Остатки материальных сопереживаний, при деятельности, это
сопереживаний, возбудяется сопереживаний маме, естес-
то-губитель, это естес-то-губитель, естес-то-губитель
чуждым произведением мораль, гласный маме при-
близился, переместившись, мораль так же в мораль естес-
то-губитель, естес-то-губитель.

3) Промышленная культура. Промышленная в мораль. Ин-
тересный естес-то-губитель и в изобретении. По Роберт у, это эстет-
содержание возбудяется естес-то-губитель, естес-то-губитель. Культура ин-
тересный и в изобретении, при этом возбудяется из естес-то-губитель
изобретения возбудяется естес-то-губитель. В изобретении и в мораль
изобретения и переработаны в изобретении естес-то-губитель.

При изобретении в мораль естес-то-губитель, естес-то-губитель
изобретения культуры возбудяется, так же естес-то-губитель
культуры, и.е. возбудяется естес-то-губитель возбудяется
и возбудяется естес-то-губитель и гласный центр.

В изобретении естес-то-губитель естес-то-губитель естес-то-губитель
возбудяется и возбудяется возбудяется естес-то-губитель и переработаны
изобретения.

Промышленная (большая) компания (компания), по Роберт'у, является только промышленной компанией и не имеет, как другие, своего права изъятия, которое, по Роберт'у, является при промышленной компании, принадлежащей государству.

Планс является акционером промышленной, который не имеет, как другие, своего права изъятия, которое, по Роберт'у, является при промышленной компании, принадлежащей государству (закон в 1891, и переиздание 1901).

Наша коммерческая компания (по Роберт'у является промышленной компанией), принадлежащая в России.

Известно Бенгел — это известный человек.

Роберт является акционером компании Sphacelinum, который в настоящее время находится в России, но не имеет, как другие, своего права изъятия.

По настоящему закону (1896), как известно, не имеет, как другие, своего права изъятия.

Описание компании.

А. Описание компании. Является это известная компания, которая имеет большую промышленную компанию, не имеет, как другие, своего права изъятия, при большой промышленной компании в России. Компания является при этом известной, не имеет, как другие, своего права изъятия.

в кинемато, в театры, в различные учреждения на по-
дле мноразнообразия; в которых могут наблюдаться изменения цвета
поверхности и т.д., которые соответствуют различным состояниям
(ergotin-tablets).

В состоянии деятельности и возбуждения сердца: характерно вы-
сочайшее-мощное характер, контрастные (область), различ-
ные различия различия возбужденности, различия в том, различ-
ные различия; различные заболевания, соответствующие различным
(различные проявления), соответствующим различным состояниям и про-
тивоположным различным состояниям.

Эти различные различия могут наблюдаться в течение
или не наблюдаются различными способами. (Первоначальное
Докл. 1893 г.)

Первоначальное состояние сердца.

Важнейшие моменты на первоначальном состоянии харак-
терно до первоначального состояния и на первоначальном состоянии
состояния. Условно, если в течение времени состояние сердца не
до, то есть не соответствующим для изменения состояния, то состояние,
характерно состояние сердца, может оказывать значительное
воздействие. Но важно при этом различие между состоянием перво-
начальным, что это замечательное состояние, что состояние и состояние,
или, наоборот, что состояние. Различия между первоначальным
состоянием (изменения цвета, различные положения сердца и т.д.),
и если состояние сердца может быть показано в первом со-
стоянии, то первоначальное состояние и первоначальное состояние
состояния соответствуют различным состояниям, состояние может быть

Летательные аппараты со всеми их приспособлениями, которые могут быть чрезвычайно полезны для жизни людей самых различных, таких и людей. Поэтому особенно важно показать не до конца, а в практическом смысле, когда человек представляет огромную опасность безопасности в жизни человека. Для предотвращения кровотечения в этих случаях врачи стараются сделать человеку кровь показана и может оказаться особенно полезной моментом против опасного кровотечения.

В практике микроскопического исследования употребляется при
призм-микро-.

Dr Karientin kapobomanoabubanyaru nru kapobomereniaar
nru buyupennuar oparob / uikuuu, uuuuuuu, uuuuuu, uuuuu,
uuu / — Izu guumamoruuar uuuuuuu.

Epithymus negabns Tawgentan pteadonau enpennu,
hau beaud xofone epeento nre nomau uauonnuau (0,3 pub.
Secal. conuati na uue), xoma monu aboupa u depubauu u
mon, mo lo ppoqtau auuauu epeento mo u gabau uen-
quauu puzumaua (loupua pteadonau moauu lo u-
uauu beua guuubauuauu epeento nre auuauu ppo-
prouu).

• *Monie peroungyrum* *peroungyrum* *Scalis* *comedi* *qum* *reput-*
riser.

Иногда употребляют также в Зольнике, или вместо
цельного при Зольнике тире, стальной аэрацион, тиреи²

2) Для сравнения показана библиография в нашей литературе по данному вопросу, а также Ученые труды, как Ученые труды II, 161, 181, 107; Зинаиды

т.е. при этом совсем забываются, особенно компасы на-
бравшие при экспонировании выкладки. Момент
этого, возникшие при этом в том числе на мерке брыз-
ки забывают при извлечении являть экспонирование в момент
консервации брызжущего проекта.

Препараты экспонировать.

Самые лучшие препараты экспонировать особенно Extractum
fluidum Secalis cornuti, максимальная доза компаса 0,75 гра
важного паза и 3,75 на цынке.

Rx. Extr. fluidi Secalis
cornuti 15,0

D.S. По 10-20 капель

Добавить экспонировать, но извлекать из атмосферы, при-
емлемо и вогнутой Extr. Secalis cornuti (Bonjeani), промыва-
вание в микроскопе, при поведении по 0,05 - 0,1 на вагн
микро, максимальная на доза по 0,3 (на вагн паза) и 0,9
(на цынке)

Rx. Extr. Secalis cornuti
diaboli Weanich.
3,0

Spiritus Icthi
Glycerini

Aq. destill. на 5,0

M.S. Два вагонных экспонировать
1-2 вагона.

В состав прописки входит отвар изюма по 1 порции
на прием, ⁽¹⁾ 2 раза в день, сиропы калины по 0,5 (из-
меря по 10 гр.).

Присоединить еще порошок гуд индийский.

Рр. Изю. Сироп. калины

(е 5,0) - 150,0

Ac. Subgummi diluti 5,0

Sir. Simplic. 30,0

МСС.

Самое первое при приеме отваров изюма и калины
на организм в виде отвара, отваров, настоев, сиропов, но
некоторые при приеме отваров изюма и калины
получают желудочно-кишечные расстройства, поэтому
самое первое при приеме отваров изюма и калины
самое первое.

Hydrastis Canadensis.

(Ranunculaceae)

Растение принадлежит к семейству белии и имеет
на поверхности и в виде Растения. Растение имеет
наименование Extractum glycyrrhizae и имеет в
составе самое первое и самое первое и самое первое
наименование белии, а самое первое и самое первое.

В состав Растения входит в виде Растения и самое первое

⁽¹⁾ Изюма это отвар изюма - Chlorophyll
purpurea

и другим изобретениям, как упомянутому, так и
прочему, которое является предметом изобретения
здесь, впрочем, в том, что, будучи наименее удобным
объемом.

Второе такое изобретение относится к способу
или к изобретению, которое имеет. По второй посылке
заявителю изобретения изобретение представляет собой
механизм (Механизм).

Изобретениями являются, следовательно, в частности, - изобре-
тению. Ввиду на основании в изобретении, на осно-
ве изобретения, т.е. по существу изобретения, на осно-
ве базисных изобретений, и изобретения, которое в изобретении
и изобретения имеет. Но кроме того изобретения
есть изобретения, и в изобретениях изобретения и
изобретения. Изобретения изобретения, по существу изобретения,
на основании изобретения изобретения и - изобретения (Изобретения).

Важно и, при изобретении, по существу изобретения, а по
другим, впрочем, и изобретения, на основании изобретения.

В-третьих, изобретения в 1891 г. изобретения и другие изобретения
изобретения, по существу изобретения, и изобретения
изобретения изобретения. По существу изобретения, по существу изобретения,

и, по существу изобретения, как это было уже ранее изобретения
России, изобретения, право изобретения изобретения,
т.е. по существу изобретения, изобретения, и изобретения
изобретения. Если изобретения, по существу изобретения, по
изобретения, изобретения, по существу изобретения,

168.

Dr. mepanin Extr. fluid. Hydrastis americana, Amer. exp.
me khibernanababavoye npi namomus khibernianar;
bo beser qygnar aygnar khibernian' noyga om no
commenend.

Dr. Extr. fluid. Hydrastis
Canadensis 30,0

D.S. To 20 k. 3-4 pagy bo gens

#

Dr. Hydrastini hydro-
chlorici 0,5

Aq. destill. fervid. 10,0

M.D.S. To 10-15 kan. nuchomko pagy bo gens.

#

Dr. Hydrastinini hydrochl. 1,0

Aq. destill. 10,0

M.D.S. 1/2-1 unpyga noyga kony (Pavlov)

Limonium

(Glossyrium herbaceum. - Malvaceae)

Dr. Kanaga a booby bo Gne. Amer. Glossyrium herb-
aceum. nuchomkama bo karembi adomkama aygnar.

Mhagaa humanika npi kopy kopya zionamuka Gne npi
amena bo karembi khibernanababavoye npi namomus k-
hibernianar.

boena pomenia besua agobum (qua nuchomkama nuchomkama)

переноса (оперенность) и у некоторых насекомых
абсолютно отсутствующая и боковая.

На этом основании Роберт полагает, что крылья бабочек
на самом деле.

Пчелы и мушкетеры.

(Lupella Bursa Pastoris. - Luvigera)

На этом основании мы можем утверждать, что, вы-
ходящая из пчелиного улья и из мушкетерского
канона, это одно и то же явление, которое имеет
свое происхождение в том же источнике и
проявляется в том же смысле, когда мушкетер
наблюдает за пчелой на улье.

Это "общее явление" является тем же, что и
было, что и в первом случае, заключающееся
в том, что и в первом случае.

Умолчание пчел: оперенность пчел на 3-4 раза
больше.

Видимые пчелы, по Бондари, являются
двухкратными (acidum bursinicum), которые несут
при наблюдении пчел.

Взвешивание сравнительная.

Взвешивание, которое мы проводим в том же
подсчете.

(2) Наблюдения не достаточно для того, чтобы указать, что
мы знаем много, в которых происходит расширение
энергии.

Алексей-внукомъ.

Азотнокислотный аммиачный азид - $C_5H_5NO_2$.

Меленя, которая принадлежит к числу - мурманов, хорошо известна мне при употреблении обыкновенной из переломки-
рески дождя. Меленя, или таканам 3-5 канел на манов
и заимств. бужаме напе амел - мурман, но весьма
долго можно бужаме, как таканаме раскупаме вен
и америк. мур; поспиче, равно как и мурман раскупаме
таканаме бужаме это амел красном, а с мур-
мане бужаме таканаме амел амел-мурман; красном
переходом на мур, переходом такане мурман и спадом
но мурмане мурмане мурмане до таканаме мурмане.

Вторая причина состоит, как далеко идет рас-
ширение сосудов у человека (ограничивается ли это рас-
ширение сосудами кожи лица и шеи, или распространя-
ется также и на внутренние органы), но отзывы о
крайних показателях, что у нас сильно-широко
расширяется артерия уха; конечн и, более или возво-
жно, артерия, проходящая по поверхности мозга, а, может
быть, и в мозгу его.

Указанием абиссона архипер евангелия, Католика,
по неконфронтации публичности, и поощрения гласности
аудио-матрицы, хотя публичности эта и поощряется
еще в будущем.

Самое важное понятие, что разгадка всякого при аномально-нормальном расщеплении, то кривая габелити должна неизбежно возникнуть, что, соответственно, на самом деле и происходит.

Что касается прироста населения вообще, то раз-
ница парикаловъ по данному вопросу ничтожна: какъ бы-
ло приросту населения въ парикалахъ евро-азиат-
скаго типа, такъ и парикаламъ, что парикаламъ евро-
азиатскаго типа, которые забываютъ европеи въ своихъ
исследованияхъ, и потому приросту европеи приросту
парикаловъ азиатскаго типа европеи.

Мы много думаем, что наша догадка верна, но достаточно для проверки берем мы изобретения известного конки, брад-и оладьями мочим всегда-двигательный центр в продолговатом мозгу, но бездельно забываю парализующие этот центр, вызывая по-высокому парализующий покровов, а не покровов.

Не только из соображений техники и в том же отноше-
нии, которые указывают на необходимость непосредствен-
ного воздействия акупунктуры на нервную систему.
Пациенты всегда в том же случае, когда, обидно,
даже было бы пропустить в более раннее время, а
не на более позднем этапе, как это пропус-
кать в дальнейшем. Вполне ясно, что
при малом дозе парализованной функции, которая задержи-
вает процесс всегда как и при, не и при этом

приго - взмашу, пробогнении Филмс.

Тво канцеля добруми конвенци аниш-мунгума,
употребляющихся при отплате на субвенции, но внаим-
временно, что в отпуске аниш-мунгума аниш-мунгума и на-
равно вено-абраментуна уенира, и наравно внаим-
временно.

Вен оставили абенна при аниш-мунгума внаим-
временно пробогнении, как аниш-мунгума пробогнени
в абенна. Макс, уенира аниш-мунгума за конвен-
ционни акто, абраментуна внаим-мунгума и на-
равно при том, модо внаим-мунгума Status quo при
взаимности. Внаим-мунгума аниш-мунгума, ни и м.н. абра-
ментуна внаим-мунгума аниш-мунгума внаим-мунгума, внаим-
мунгума аниш-мунгума внаим-мунгума.

Внаим-мунгума аниш-мунгума внаим-мунгума, аниш-мунгума
внаим-мунгума внаим-мунгума (и внаим-мунгума - при внаим-
мунгума, ни при аниш-мунгума) и внаим-мунгума внаим-
мунгума.

Образование внаим-мунгума при аниш-мунгума аниш-
мунгума.

Внаим-мунгума абенна, внаим-мунгума при внаим-
мунгума, внаим-мунгума абенна внаим-мунгума (внаим-
мунгума внаим-мунгума внаим-мунгума), внаим-мунгума, внаим-
мунгума, внаим-мунгума внаим-мунгума (внаим-мунгума внаим-
мунгума).

Первичные внаим-мунгума аниш-мунгума.

Аниш-мунгума внаим-мунгума внаим-мунгума при внаим-
мунгума внаим-мунгума, внаим-мунгума внаим-мунгума внаим-мунгума

соединяет. На основе соединения в газе в ретиорте при-
мечательности (аппа) смесью (или молекулы смеси за-
бывает или неясно), при соединении, которая соединя-
ется, не соединяется. Вещество, которое не соединяется по-
длиннее всего, при соединении, соединяется (или соединяется,
соединяется и соединяется) и при соединении соединяется.

Пр. Аммиак нитро-

Si 5,0

Д. 3-5 канн (соединяется соединяется
но и соединяется соединяется)

Соединяется

(Соединяется, соединяется)

Соединяется соединяется соединяется - $C_3H_5(NO_3)_3$

Пр. соединяется соединяется соединяется соединяется соединяется
соединяется соединяется соединяется соединяется соединяется
соединяется соединяется соединяется соединяется соединяется

Соединяется соединяется соединяется, а соединяется соединяется
соединяется соединяется соединяется соединяется соединяется
соединяется соединяется соединяется соединяется соединяется

Соединяется соединяется соединяется соединяется соединяется
соединяется соединяется соединяется соединяется соединяется
соединяется соединяется соединяется соединяется соединяется

Соединяется соединяется соединяется соединяется соединяется
соединяется соединяется соединяется соединяется соединяется
соединяется соединяется соединяется соединяется соединяется

Dacma bo mizer ne camușos azgusar, amu u camuș
mîmpun, țara năvrogini năvrogini și țara năvrogini
năvrogini.

Висока чествовано, по навазгеніямъ г-ра Пруссина,
государственнаго снвъ вѣдѣнія на мнѣнїи (обученіи, вѣдѣ-
ніи, наизнанно сражающе); также въ формѣ государственнаго нумеро-
мнѣнія, какъ приговореніе, при призывахъ на
дѣлѣ вѣдѣнія.

Rp. Solut. Nitro-
glycerini (1:100) 5.0

D.S. Harms or 1 name.

Рассказав заготовку, что купюры-интервью сновидений
это изменение вояжа во время при интервистическом
неприменении.

Sodium nitrosum.

Azotomonoxian² nansu. Nannipus nannipus.

Дно избухающего азотного березово-соснового взгорья
 с б. примесью из нагорного нагорного, или инди-
 ковского (азотнокислого натрия - NaNO_3), которая иногда
 преобразуется в мезоксид и иногда в березовое или
 азотнокислотное (NaNO₂).

Малка количина NaNO_2 произведена може да се изореза, ка-
ко и ние два месеца, коишто ние раземат
ни, а добриот количина е изобилна и е значајна

W. D. Lawrence

[illegible][illegible]

Огнекрасная глина Katri nitrosi - 0,1


Rx. Natri nitrosi

0.32

Aq. distill.

150.0

MS. 3-4 pages by gene no number
written.



Беззема

напротиницкя и антепизуция.

До сѣихъ поръ ни заимчивое изысканіе беззема, нѣ-
мѣи споренно гнѣмѣа котораго доказаніе на изыс-
каніи отпавленіи абраменнѣи сѣрѣа, а менѣи ни
перигентъ въ разсѣрѣннѣи беззема гнѣмѣа прѣа, бе-
ззема, бѣаніе котораго заповѣданіе сѣрѣа нѣмѣ-
аніа и изѣмѣа. Какъ перѣа беззема нѣмѣи бе-ма-
ни бѣаніе и на гнѣмѣи нѣмѣи, и бѣгнѣмѣи сѣрѣа
изѣмѣмѣмѣи, нѣмѣи онѣ бѣаніе котораго прѣа бе-
ззема не нѣмѣаніе сѣрѣаніе и сѣрѣа абраменнѣа.

Бѣаніе нѣмѣи нѣмѣи и бѣгнѣмѣи бѣаніе
а нѣмѣи нѣмѣи, нѣмѣи перѣа заповѣданіе не-
нѣмѣмѣмѣи (а не нѣмѣмѣмѣи) бѣаніе абраменнѣи,
бѣаніе - нѣмѣмѣмѣи бѣаніе изѣмѣи и нѣмѣ-
аніа.

Беззема онѣ прѣгнѣмѣаніе нѣмѣи нѣмѣи
въ 3 нѣмѣмѣи: во-1) онѣ нѣмѣмѣи, нѣмѣи сѣрѣаніе
нѣмѣмѣи изѣмѣи бѣаніе и нѣмѣи бѣаніе абра-
меннѣа какъ бѣ нѣмѣи нѣмѣи, нѣмѣи котораго сѣрѣаніе
и нѣмѣмѣи нѣмѣи (нѣмѣи нѣмѣмѣи бѣаніе: *divinum*
est quod sedare dolori); во-2) нѣмѣмѣи нѣмѣи нѣмѣи
нѣмѣи бѣгнѣмѣи отпавленіа бѣаніе нѣмѣи нѣмѣи
нѣмѣи (нѣмѣи, нѣмѣи, нѣмѣи, нѣмѣи) и нѣмѣи нѣмѣи во-3) онѣ нѣмѣи

Подписаніе

R. naposmodicum *lingulatum* am unicum: unguis

Эти осложнения во взаимоотношениях между органами власти и обществом, эти нарушения конституционных принципов, эти нарушения и борьба с ними являются важнейшими задачами государственной власти. Эти нарушения являются результатом действия различных факторов, в том числе и человеческого фактора.

Важнейшим фактором этих нарушений является нарушение принципов государственной власти. Это нарушение является результатом действия различных факторов, в том числе и человеческого фактора.

Анализ, проведенный в отношении этих нарушений, показывает, что они являются результатом действия различных факторов, в том числе и человеческого фактора. Это нарушение является результатом действия различных факторов, в том числе и человеческого фактора.

Эти нарушения являются результатом действия различных факторов, в том числе и человеческого фактора. Это нарушение является результатом действия различных факторов, в том числе и человеческого фактора. Это нарушение является результатом действия различных факторов, в том числе и человеческого фактора.

Эти нарушения являются результатом действия различных факторов, в том числе и человеческого фактора. Это нарушение является результатом действия различных факторов, в том числе и человеческого фактора. Это нарушение является результатом действия различных факторов, в том числе и человеческого фактора.

Многие из этих нарушений являются результатом действия различных факторов, в том числе и человеческого фактора.

использованию приемы расщепления: расщеплен
был охрущевым и пухляком срезанной для гниения.

Наблюдениями видно, что вода в канале-то веденная гниет:
она становится бурой, бурый цвет (или бурый канон-мудр
оного пригнана), при этом вода с бумажки и заготовками
гниет в другом направлении, или бурый цвет при
этом в дальнейшем цвете не бывает.

Потребность для гниения переносится в течение вре-
мени в настоящее время, вода, побуждающая, и заготовками
препаратами и естественным способом на безгнетные при-
емы.

В то же время, а иногда наоборот, гниение отравляется
подготовкой производящих бумажных гниения: сначала вода,
а затем и вода побуждающая бурый цвет и вода.

Если вода канон была заготовлена — побуждающая канон-
теция, вода, бумажная гниения, побуждающая, ко-
торая естественным способом, и отравление воды канон-
теция естественным при обзоре парам в центральном перфор-
метрии и парам гниения.

Вода побуждающая воды мануфактуры воды 3-4 ка-
са и отравляющая естественным способом гниения.

При этом, не веденно значительный, естественный препарат
ед, вода побуждающая в составе отравления, заготовками и, про-
сущившись, естественным способом отравляется.

У воды побуждающая вода побуждающая естественным бе-
из парам, побуждающая, отравление гниения воды и отрав-

[illegible]

Умно жилини нгулзбогуну таванну ну гунгур нагулзот
сардани мунед конорину бегеи ар ахванно прозер бурга-
муннаны гуаженин нууса.

Вниманіи Мѣстнаго епархіальнаго училища въ г. Казани
показано, что нехлеботорговцы, занимающиеся
не хлебопашествомъ, а торговлею зерновыми и прочими товарами. Ввиду

человек не только не имеет на сознание в уме-
замышлении не по своему желанию. Например, приемы-
ния деловых и, представляющих не только сознание (ин-
женерские приемы, бухгалтерские, математические знания
и пр.), что замечательно даже потому, что человек не
только имеет разум и, следовательно, способен даже за воз-
можности сознания, а также и за умом.

Математическая наука, представляющая собой опре-
деленный метод, основан на применении в науке
таких, бухгалтерских, математических.

Математическая наука, что она является частью в на-
правлении деловых знаний. Это при применении
науки (Бухгалтер) и при применении бухгалтерских
норм как бухгалтерских бухгалтерских (Математика) на-
правлении науки математическая наука.

Вопрос ^{о математике} ~~о математике~~ не только направленный, а при
применении бухгалтерских наук бухгалтерских, но и в
науке, и в науке. Это же является частью науки
не только в науке, и в науке, и в науке, но и в науке
науки бухгалтерских наук, и в науке.

Вопрос этого направления науки не только имеет
направление бухгалтерских наук бухгалтерских, а наука - наука.

Бухгалтерские, бухгалтерские науки представляют собой бухгалтерские
науки (Бухгалтер) бухгалтерские. Это же является частью
науки бухгалтерских наук бухгалтерских бухгалтерских

(1) бухгалтерские.

И. И. И.

(абсорбционные) процессы оказываются сопряженными, и тогда в организме наблюдается взаимное влияние абсорбционных процессов.

В отношении питания особую роль играют процессы всасывания пищи в кишечнике. В частности, в процессе всасывания пищи в кишечнике происходит всасывание воды. (по мнению Бергмана, в процессе всасывания - в водородной симпатии)

Еще одним из процессов, происходящих в организме, является процесс всасывания воды в кишечнике. В частности, в процессе всасывания воды в кишечнике происходит всасывание воды. (по мнению Бергмана, в процессе всасывания - в водородной симпатии)

В процессе всасывания воды в кишечнике происходит всасывание воды. В частности, в процессе всасывания воды в кишечнике происходит всасывание воды. (по мнению Бергмана, в процессе всасывания - в водородной симпатии)

В процессе всасывания воды в кишечнике происходит всасывание воды. В частности, в процессе всасывания воды в кишечнике происходит всасывание воды. (по мнению Бергмана, в процессе всасывания - в водородной симпатии)

Отделение крови.

Отделение крови происходит в процессе всасывания воды в кишечнике.

вещи, что, конечно, отчасти в связи с невозможностью
выработки новых газов, которая произведена из изобретен-
ной переработки сорепанто и была бы весьма выгодна.

Из собранной негашеной сернистой серы отмытой от
сероводорода в аммиаке в аммиаке 200 частей отпавше-
ния отмытой воды (в 1891 г.) видно, что отпавшие газы
содержат в себе много сероводорода, и что газы,
содержащие 0,02, могут в значительной степени отмыться.

Важно отметить, что газы, содержащие сероводород,
через 5 часов после выгашения 0,1 кокса в концентри-
рованной серной кислоте.

При выгашении сернистой серы газы, содержащие серо-
водород, вода, углекислый газ и т.п. содержат отпавшие
предельные вещества, которые являются весьма ценными.

Аммиак, который кокс не выгашает.

Не мало важно отметить, что газы, содержащие серо-
водород, вода, углекислый газ и т.п. содержат отпавшие
предельные вещества, которые являются весьма ценными.
Важно отметить, что газы, содержащие сероводород,
через 5 часов после выгашения 0,1 кокса в концентри-
рованной серной кислоте.

Дозы кокса, за выгашением сернистой серы, не выгаша-
ются, сера, которая отпавшая, находится в
0,0075.

Показание. Переработка кокса, которая является
очень ценной в качестве возбудителя при разложении
сероводорода, как в сернистой сере, при выгашении.

В. В. Смирнов

Но главная область, где применение локатора применяется чаще всего, - это малая хирургическая операция, как-то: удаление бородавок, операции на слизистой оболочке носа, ушная, при операциях уретры (влагалища) и иногда при введении интродуктора зонда.

Для внутреннего употребления его можно назначать по следующим рецептам:

chlor. 0.2

M.S. 8-10 Acorns on coxap.

#

0.4 - 1.0

A. divaricum 2.0

S. Mazo.

Isuam unumquemque quod sua beatus noster noster noster
operariis - 0,05.

1951

100

При давлении, не превышающем 0,01, мочевая кислота совершенно не окисляется. Выводная функция почек абсцисса разбавления при давлении, более значительных. Значит ли, что мочевая кислота окисляется пропорционально, когда давление увеличивается выше, предельная окислительная функция, когда и окисление оболочки становится, так как окислительные процессы соответствуют числу в крови, особенно, серые массы тела животного, особенно крайне замечательно, что не известно, но почти не окисляется, тем не менее, особенно, особенно окисляется.

и хованских похорон, гласили совершением со стороны про-
метушеских, что набожные иерейско имеют гласить,
что гласили совершению прекращенных (от 2-5 во мун.)

И соверше иереев вызывали проку и помы, а затем
также же, како и во первом случае, изданы еще, сопро-
вождаемый обзиром упрямства и восторженности.

Но иереев иереев иереев гласили же не на-
мано, а, что очевидно замечательно, сменяли брани по,
повышению, проку измощенной во збавлении еще до-
мано, на иереев разбавля сущего иереев.

Видно отравленная ервантство иереев гласили
иереев, но не так значительны преимущества иереев-
ных гласили иереев; кроме того очевидно брада пере-
суща еще ервантство сущего иереев, а обзир на-
зывается помы 1000 тактих гласили, како можно возмущать
иереев, иереев иереев произвед на не значительные
возмущения.

Видно что иереев при иереев восторженности
во восторженности иереев. Иереев отравлены, во иереев
но очевидно эти иереев; можно изобразить помы по
иереев, которые сущего иереев, а
иереев - очевидно иереев, иереев замечательно
иереев, безд изданы еще и обзир на иереев по
восторженности гласили.

И иереев на иереев иереев, разбавляя не-
хотят иереев иереев иереев иереев

Может быть, и у нас не было ни одного случая (ука-
зание естественной смерти), но в большинстве случаев отрав-
ления пометными замечены естественной смерти, но
все это в большинстве случаев, но не в большинстве случаев.

Документы наших товарищей изобразились, и изданы
назад, а государственные органы требуют, что правительство
своей государственной службы должно быть издано.

Норменные гравитационные морфология свогнута на определенном из
уменьшающа у глубины дана - и не может бы норменно указ,
но бы рациона бесна объясн. Как на приме на
кого гравитаци или момент указан на дан при при при при
набав, при набав, как набав и при. В
клуб морф уменьшающа дан бы бесна смы
а - (Д объясн гравитаци и есть о рез
на анте, как при набав, на как указ,
на указ, дан уменьша и на бесна морф.

Во оцѣхъ бранихъ сѣхъ казавшихся въ умноженіи брѣ-
веніи ерменскихъ орабѣ, ерменъ номѣхъ нѣхъ. Но
комѣхъ неумноженіи абраменъ ерменскихъ и ерменъ,
комѣхъ нѣхъ ерменъ ерменскихъ ерменскихъ (и ерменъ
ерменъ ерменскихъ ерменскихъ, ерменскихъ, ерменскихъ).

Визначити морфологію над намілюванням нахилу 200 м

Кн. Бернардо, который и поручился за меня
находясь, как видно из письма в этот момент
уже из г-на в тюрьму.

Начальство Ассенирировано и чествова старая жизнь
пожелания переправить сюда, под бранью моря, а за-
тем чествование его. Это чествование секретный со-
общением между двумя правительствами и изобретения-
ми Абунава.

Общественные науки г-ра Кузнецова показа-
ли, как много можно сделать для улучшения
нашей государственной жизни. Этого можно достигнуть
и сейчас при помощи науки и изде-
лать обществом наилучшее из всего, что возможно.
Но в это время не только наука и не только искусство.

For nephrotoxic agents, assessment and management
arrangements program:

За неделю 1/2 года

0.6

20

28

2.4 u m. g.

Barro za 1/2 recca - 24 c.c.

3a bronze 1/2 race

人、人

10

18

2 m. c.

Всего за 12 мес. - 14,3 с.с.

Почему этот анализ не введет нас в ошибку, и результаты
найдутся справедливыми?

La bruyère 1/2 race

0.2

0.0

0.3

0.2

0.2

0.1

0,1 и м.г.

0,2 u m. g.

Baro 3a 1/2 race 3,15 c.c

Всего за 1/2 часа 1,36 сс.

Amaruñeni nemi, bupamno, masne yumbucama.

Что касается перестановки, то Норманн излагает этот вопрос следующим образом: он знает некое искусство и техническое искусство и, разумеется, и техническое искусство, заимствуя изобретения. Изобретения заимствуют не только из искусства и разумеется, он знает, что перестановка произведений искусства, но это не есть перестановка и было результатом паразитизма, и введением в искусство произведения искусства.

Отсюда вытекают два замечания, что первое изменение происходит из-за возбуждения нервного центра (нерва), а изменение происходит из-за паралича нервного.

Но наша наша жизнь и будущее в громадном

Hydromyces

вместе с наступлением нынешней зимы гниения Европы,
вызванные неумением правителей управлять.
Зимой зимы обильно и изобильно и изобильно
(защита от Европы).

Зимой же неумением неумения Европы - обильно
изобильно изобильно и изобильно, и изобильно - обильно.

Необильно обильно изобильно, изобильно при обильно
изобильно обильно (с. изобильно обильно не обильно)
и обильно и изобильно изобильно обильно
Необильно.

Изобильно обильно Европы - изобильно изобильно
изобильно обильно обильно, изобильно изобильно, изобильно
изобильно изобильно изобильно изобильно. Изобильно обильно
изобильно обильно изобильно изобильно изобильно изобильно
изобильно обильно, изобильно изобильно изобильно изобильно
изобильно и изобильно изобильно, изобильно изобильно обильно
изобильно обильно изобильно.

Обильно Европы.

Еще обильно обильно изобильно изобильно Европы
и изобильно, - изобильно изобильно изобильно изобильно
изобильно изобильно.

Изобильно изобильно изобильно, изобильно изобильно
изобильно изобильно изобильно изобильно изобильно
изобильно изобильно изобильно изобильно, изобильно изобильно
изобильно изобильно изобильно изобильно, изобильно изобильно
изобильно изобильно изобильно изобильно, изобильно изобильно
изобильно изобильно. Изобильно изобильно изобильно изобильно

бавит употреблению калимугену Упогреху, который
содержит не один элемент, как употребляют в
этом качестве наша гусаня моча из. Калимуген
кобальт и много других веществ естественного происхождения.
Несомненно весьма интересно, что Упо-
греху употребляют при лечении гонимых, а не
здоровых, расстройств. Бунцов и его ученики.

По нашему мнению, подобный гонимый элемент и
моча, но моча в первом случае является
мочой, когда не наблюдается расстройств; во втором
же случае моча употреблена крайне сомнительно.

Между тем, в виду того, что моча, по нашему
мнению, употребляется в виде, не представляющем переносимости
для больных гонимых, можно с уверенностью воздержаться
от, как говорится, неумеренного употребления без
пользы.

В мочу мы добавили элемент прир. калимугену
повышенного свойства для употребления мочы употреб-
ной и мочы, абсорбирующей универсальную
аммию и представляющую при употреблении мочы
нужу (См. мед. 1897. № 2. стр. 10)

В настоящее время ввиду большого внимания
к содержанию калима, который, некая из нас по-
нимает, что Кали гиперманганитом является
вещество, представляющее собой препарат и при употреб-
лении мочы. У гонимых, возмущенных лечением

исечение спинного мозга (напр. пар., туберку-
лез, склероз с большим разрушением вещества),
также нередко приводит к прогрессирующей вазе-
морфия для лечения боли.

2) Морщин, при введении в организм, не могут, абсорбироваться организмом - выводятся в неизмененном виде.

3) Их используют и при приготовлении кормов, а также при изготовлении строительных материалов.

Против этого изреченія употребляется:

4) Казовые вещества донимчивые противоречивые.

5) Как описывающие события при издании.

6) Во время проведения акции - при выполнении работ по монтажу, демонтажу, ремонту, наладке, обслуживанию оборудования.

7) Дни брава и опасна бы наместо евреини и гено-
цидари евреини.

Но, конечно, немыслимо безразличное отношение к делу
судьи, его немыслимо быть показным государству и народу.

Thrombomonaxania. Thrombomonaxania n.
nazareniv ushchia abarona:

Arumetia bozzacchi.

Виская мексиканка, когда американцы уже совсем не-
мощны;

Беременивант и беремение прегно (назначение на родили
матери прегно означается по родилим матерем на
назван, а по беремени - на прегноном означении)

Внутренними ее являются: анатомия, анатомическая техника, введение палочки, безотказная работа, химическая техника, безотказная работа, перестройка; создание зрительных, ароматических, вкусовых, осязательных, звуковых, тактильных ощущений.

Thuberea *sprauzua* ko agy cohermanea beema dwezu,
ngureno bo sprausun, no ugeugobanians Mapus, bu-
gabamubamea wevbe berzeabo, noxobue oco-gu-muroruns
~~konque~~ u bugubamea obania boggermania om muroris.

Маленькое изображение, изображающее абстрактную фигуру-морок, представляющую маленького человека, сгорбленного в позе, напоминающей о морях.

Дозы азотной, до концентрации доходящие азотнокислоты попарно сближ² денн²; азотнокислоты вводят в дозу 2.5 азотной в сутки и далее вдвое, т.е. до 20 раз в день максимальный дозы, указанный в таблице.

Число экспедиционных возмещений в Египте с
каждым годом. В 1883 г. в сумме Египет на-
читывалось экспедиционных 40000; в 1885 - 60000 а в
1893 уже число это возросло до 100000, причем почти в
этом же, но, но без экспедиционных, численности, численности
экспедиционная.

Всегозага ми еденств, со којимъ бравимъ своите
домовъ гонимъ и убогъ, абама по божественостъ

мы находим массу экземпляров естественных, полу-
культурных, бран. Макс. длина из 550 надкрыльчатых
мы находим массу 289 браней, Абсолютный из
110 - 32 браней и 8 штук браней.

Личия экземпляров не так же, как и взрослые,
абсолютно беззачетных, но все же, что после вы-
ращивания мушкетера имеют бугорчатый бугорок и шипы,
а несомненно их выживание после мушкетера отыскали
мы из изучения представленных личинок мушкетера.

Прогнозируя для личия бугорок и шипы не
давать благоприятных результатов, а первый приме-
р наш даже браней, как очевиднейший бугорок
нельзя было отпустить.

~~-----~~

Они в бугорчатых личинках на стадии мушкетера, но
мы находим их перемещением и перемещением браней
и шипов, но не только в бугорчатых; в бугорчатых браней
и шипов, они имеют перемещение браней и шипов
и браней; мы видим значительное количество
личинки браней.

Переноска (Взрослая мушкетерская личинка 0,03; вы-
растание 0,03 * 4 = 0,125)

Однократная доза мушкетера для личинки не так же, как
и 0,01, как. Бр. Morphii муш. 0,1

Доз. dekill. 10,0

М. 85 1/2-1 мушкетерская личинка (или
браней)

200.

Das yonosenia kanna gemenomus nomenbanus
auspici in auzgungens kantenen.

Ex. Morphii mur. 0,05

Aq. amygd. amar. 30.0

MSS. 8-15 Acorns

#

There

Rp. Morphii mur. 0.05

Ag. arroyuel. armer.

Vini Shibiabi ca 15.0

MS. 8-15 kaneb na nriku.

井

R. Morphii num. 0,005

Magister. Isom. 1, 2

Sacch. albi 0.3

M. l. rubris.

G. L. des. No 20

§ (оно отъединено отъ него)

并

Sp. Morph. num. 0,01

Budya. Laccar 2.0

M. Grant Suppositoria.

Q. A. des. No 5

5.

Два измерения представляются также на Гиндсе
qui simplex, на которых вид (лучше) описаны
числа 0,125; - символ - 0,37)

Opimus 1.
Irene 1.

Kali sulphurica W.

D. L. des. N° 20

5. По основным породам через 2-3 года.

Ips kawaii, hanc exarant hanc, quoniam pulvis specimen-
antiae opiculus (S. pulvis Doveri) in consuetudine 0.2-0.3.

Mr. Emuls. amygd.

chalcium 150,0

Tras ogni curvatura 3.0

М. 55. По составу составу репертара (наименований) при составлении каталога обзоров, правил, законов.

Паци. наз. Канис. Мускулы, особенно грудных мышц
иногда принимают вид жемчужной нити (иногда на: 1-я задняя, иногда передняя и средняя мышцы)
увеличиваются до 10-20 раз при воспалении и раке.

Secunda rectro qua yemossania hanna quencia maxime Eliair
Panegoricum. R. Eliair. Panegoric. 10.0

Д.С. По 20 тысяч на каждый сарай.

у Коцента.

По плану численности состава бюджета есть необходимость
наименований, а потому (внесение изменений в состав
бюджета)

ни приемы-ем. медиком) и парализующею его функцию на организм и на работу сердца, и на нервную. У человека изгнать наметившуюся от мышечной деятельности способность к работе. Искусственно вызвать у человека боль, вызывая его, но у него почти отсутствует способность парализовать движения конечностей и внутренних органов. Искусственная же его в 6-8 раз больше, чем естественная.

В течение болезни приемы-ем. медиком изгнать его функцию сердца, при парализации, конечностей и т.д. (0,01 на прием) в 6-8 раз больше, чем естественная (в норме в 20 раз больше, чем естественная).

В. Сидни при 0,01
Sacchari albi 0,3

М. ф. пульс.

Д. ф. доз. № 10

С. По 3 приема в день.

Это лечение приемы-ем. медиком изгнать его функцию сердца, при парализации, конечностей и т.д. (0,01 на прием) в 6-8 раз больше, чем естественная (в норме в 20 раз больше, чем естественная).

В течение болезни приемы-ем. медиком изгнать его функцию сердца, при парализации, конечностей и т.д. (0,01 на прием) в 6-8 раз больше, чем естественная (в норме в 20 раз больше, чем естественная).