УДК 539.18

В.В. СКОБЕЛЕВ

**РАДИАЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ К КУЛОНОВСКИМ УРОВНЯМ ЭНЕРГИИ
И ИЗЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДОПОДОБНОГО АТОМА
В СВЕРХСИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ**

Рассчитана вероятность и интенсивность излучения водородоподобного атома в сильном магнитном поле $B \gg Z^{2\alpha^2} B_0$, $\alpha = e^2/c\hbar = 1/137$, $B_0 = m^2 c^3 / e\hbar = 4,41 \cdot 10^{13}$ Гс. Обсуждается роль поляризации электронно-позитронного вакуума.

Ключевые слова: излучение, магнитное поле, водородоподобный атом.

1. Введение. Одномерный водородоподобный атом

В ряде случаев наличие сильного магнитного поля приводит к упрощению соответствующего математического аппарата.

Так, например, в [1, 2]¹ было показано, что в достаточно сильном магнитном поле релятивистская квантовая теория взаимодействия электронов и фотонов (нейтрино, аксионов) приобретает двумерно-ковариантный вид в подпространстве (0,3) (ось 3 – вдоль поля), что значительно упрощает вычисления (см. также п. 2).

С другой стороны, в [3] показано, что в сильном магнитном поле величиной

$$B \gg Z^2 \alpha^2 B_0, \tag{1}$$

$$\alpha = e^2 / c\hbar = 1/137,$$

$$B_0 = m^2 c^3 / e\hbar = 4,41 \cdot 10^{13} \text{ Гс},$$

где m – масса электрона (далее здесь и в п. 3 используем обычные единицы, сохраняя в формулах постоянные c и $\hbar$), трехмерная задача о движении электрона в поле ядра вырождается в одномерную, что, очевидно, на порядок упрощает расчеты.

Согласно [3], состояния двукратно вырождены по четности, а волновая функция имеет вид

$$\Psi_n^{(\pm)} = \begin{cases} \chi_n, & z > 0, \\ \pm \chi_n, & z < 0; \end{cases} \tag{2a}$$

$$\begin{cases} \chi_n = K_n \exp\left(-\frac{x}{2}\right) x \Phi(1-n, 2; x), \\ K_n = \left(\frac{Z}{2nz_0}\right)^{1/2}, \\ x = \frac{2Z}{n} \frac{|z|}{z_0}, \quad n=1, 2, 3, \dots, \\ z_0 = \hbar^2 / me^2, \end{cases} \tag{2b}$$

где Φ – вырожденная гипергеометрическая функция [4], а квантованные значения энергии совпадают с обычными²:

¹ При конкретном расчете в работе [2] сделано упущение: не указано дополнительное ограничение на величину поля $|eB| \gg \kappa_m^2$ ($\kappa_m \sim r_n^{-1}$ – максимальный переданный импульс, r_n – радиус ядра).

² Отметим, что в кулоновском поле существует зависящее от магнитного поля значение энергии e_0 на основном уровне Ландау (формула (8) § 112 [3]). В работе рассматриваются переходы между кулоновскими уровнями дискретного спектра, разность энергий которых (а значит, вероятность и интенсивность) не зависит от e_0 .

$$E_n = -\frac{(Ze^2)^2 m}{2\hbar^2 n^2}. \quad (3)$$

Для теории «одномерного» атома основным является следующее интегральное соотношение 7.622.1 [4], справедливое при любых $\text{Re } s > 0$ ³:

$$\int_0^{\infty} e^{-st} \Phi(a, 2; t) \Phi(\alpha, 2; \lambda t) dt = A(s) F(a, \alpha; 2; \lambda(s-1)^{-1} (s-\lambda)^{-1}), \quad (4)$$

$$A(s) = (s-1)^{-a} (s-\lambda)^{-\alpha} s^{a+\alpha-2}.$$

Здесь $F(\alpha, \beta; \gamma; z)$ – гипергеометрический ряд [4].

Если ввести безразмерную плотность вероятности

$$w_n = \left[\frac{\chi(x)}{(n-1)! K_n} \right]^2, \quad x = \frac{2Z}{n} \xi, \quad \xi = \frac{|z|}{z_0},$$

то для водорода ($Z = 1$) численные расчеты дают следующие графики функции $w_n(\xi)$ для нескольких значений n (рис. 1).

Рис. 1

Эти графики можно следующим образом проиллюстрировать, давая альтернативное полуклассическое решение упомянутой задачи 3, § 112 из [3]. Именно, в «области движения электрона» от $-z_n$ до z_n образуется стоячая дебройлевская волна с узлами на границах и в центре, так что в этом интервале должно укладываться четное число полуволин

³ Это имеет место, если Φ и F представлены конечными рядами, как в нашем случае (a и α – целые и отрицательные либо равны нулю).

$$2n = \int_{-z_n}^{z_n} \frac{dz}{(\lambda(z)/2)} = 4 \int_0^{z_n} \frac{dz}{\lambda(z)},$$

где

$$-\frac{Ze^2}{z_n} = E, \quad \lambda(z) = \frac{h}{|p_z|} = \frac{h}{\sqrt{2m\left(E + \frac{Ze^2}{z}\right)}}.$$

После простых преобразований получаем

$$n = \frac{2Ze^2}{h} \left(\frac{2m}{-E}\right)^{1/2} \int_0^1 dy \sqrt{\frac{1-y}{y}}.$$

Интеграл равен $\pi/2$, и для энергии E_n снова имеем значение (3). Таким образом, число «пучностей» на полуоси z равно n , что и подтверждает рис. 1.

2. Радиационные поправки к кулоновскому потенциалу и значениям энергии

Как известно, поляризация электронно-позитронного вакуума приводит к модификации кулоновского потенциала и, следовательно, к перестройке уровней энергии, в том числе и одномерного атома.

В наших целях значение индукции магнитного поля удобно разбить на две области:

$$\begin{aligned} \text{a) } B_0 \gg B \gg Z^2 \alpha^2 B_0, \\ \text{b) } B \gg B_0, \end{aligned} \quad (5)$$

причем в обеих областях имеет место одномерная интерпретация водородоподобного атома.

В области «а» поправка к кулоновскому потенциалу была найдена в работе [5] и имеет вид

$$\begin{cases} \delta_a \phi = \frac{(Ze)}{r} \frac{\alpha}{45\pi} \left(\frac{B}{B_0}\right)^2 \left[2 - \frac{7}{2} \sin^2 \theta\right], \\ r \gg \lambda_C, \quad \lambda_C = \hbar / mc, \end{cases} \quad (6)$$

где θ – угол между $\mathbf{r}$ и $\mathbf{B}$,

$$\begin{cases} \delta_a \phi = -\frac{7\alpha}{9 \cdot 2^7} \frac{(Ze)}{\lambda_C} \left(\frac{B}{B_0}\right)^2, \\ r \ll \lambda_C. \end{cases} \quad (7)$$

Поскольку $z_0 \gg \lambda_C$, то в одномерном случае имеет значение поправка (6), а независящая от координат поправка (7) вообще не меняет физических результатов.

Очевидно, в одномерном случае следует положить $\theta = 0$, и поправка равна

$$\delta_a \phi = \frac{(Ze)}{|z|} \frac{2\alpha}{45\pi} \left(\frac{B}{B_0}\right)^2.$$

Таким образом, учет поляризации вакуума в области «а» значений поля сводится к замене

$$Z \rightarrow Z \left[1 + \frac{2\alpha}{45\pi} \left(\frac{B}{B_0}\right)^2\right] \quad (8)$$

в формулах п. 1, что, в свою очередь, приводит к ультрафиолетовому сдвигу всех спектральных линий.

Для определения поправки к потенциалу в случае «б» воспользуемся стандартной процедурой. Именно, поправка определяется через поляризационный оператор фотона $P(k)$ [6] (далее постоянные $\hbar$ и c опускаем)

$$\delta_b \phi = \int e^{i(kr)} \left[-\frac{4\pi(Ze)}{(k^2)^2} \right] P(k) \Big|_{k_0=0} \frac{d^3 k}{(2\pi)^3}. \quad (9)$$

В свою очередь, поляризационный оператор связан с поляризационным тензором $P_{\mu\nu}(k)$:

$$P_{\mu\nu}(k) = P(k) \left(g_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} \right). \quad (10)$$

В сверхсильном магнитном поле $B \gg B_0$ поляризационный оператор был вычислен в работе [7] с использованием развиваемого двумерно-ковариантного формализма, причем расходимость устранялась в предположении калибровочно-инвариантной структуры $P_{\mu\nu}(k)$ (10). Покажем здесь, что расходимость сокращается «сама по себе» в рамках формализма, а калибровочно-инвариантная структура (10) получается при этом «автоматически».

По определению, поляризационный тензор в однопетлевом приближении равен

$$P_{\mu\nu}(k) = 4\pi\alpha i \int d^4 x e^{i(kx)} \text{Tr} \left\{ \gamma_\mu G(x) \gamma_\nu G(-x) \right\}, \quad (11)$$

где $G(x)$ – зависящая от разности координат часть функции Грина в сверхсильном магнитном поле [1, 2]. Подставляя её в формулу (11) и переходя к двумерным γ -матрицам и сверткам [1, 2], получаем

$$P_{\mu\nu}(k) = \frac{2i\alpha\gamma}{(2\pi)^2} \exp\left(-\frac{k_\perp^2}{2\gamma}\right) \int d^2 p \text{Tr} \left\{ \gamma_\mu \frac{\hat{p} + m}{p^2 - m^2} \gamma_\nu \frac{\hat{p} - \hat{k} + m}{(p-k)^2 - m^2} \right\}, \quad (12)$$

$$k_\perp^2 = k_1^2 + k_2^2.$$

Формально это выражение логарифмически расходится. Покажем, однако, что в силу свойств γ -матриц в двумерном подпространстве (0,3) расходимость исчезает. После фейнмановской параметризации и трансляционной замены переменной выражение (12) приобретает вид

$$P_{\mu\nu}(k) = \frac{2i\alpha\gamma}{(2\pi)^2} \exp\left(-\frac{k_\perp^2}{2\gamma}\right) \int_0^1 dx \int \frac{d^2 p}{[p^2 + k^2 x(1-x) - m^2]} \text{Tr} \left\{ \gamma_\mu \hat{p} \gamma_\nu \hat{p} - x(1-x) \gamma_\mu \hat{k} \gamma_\nu \hat{k} + m^2 \gamma_\mu \gamma_\nu \right\}.$$

Логарифмически расходящееся слагаемое в скобках исчезает в силу свойств двумерных γ -матриц [1, 2]:

$$\gamma_\mu \hat{p} \gamma_\nu \hat{p} \Rightarrow \gamma_\mu \gamma^\alpha \gamma_\nu \gamma_\alpha \equiv 0,$$

вследствие чего $\text{Tr} \{ -// - \} = 2 \left\{ -2x(1-x) k_\mu k_\nu + k^2 x(1-x) g_{\mu\nu} + m^2 g_{\mu\nu} \right\}$.

Выполняя также интегрирование по $d^2 p$, получаем

$$P_{\mu\nu} = -\frac{\alpha\gamma}{\pi} \exp\left(-\frac{k_\perp^2}{2\gamma}\right) \int_0^1 dx \frac{dx}{[-k^2 x(1-x) + m^2]} \left\{ -2x(1-x) k_\mu k_\nu + k^2 x(1-x) g_{\mu\nu} + m^2 g_{\mu\nu} \right\}$$

или

$$P_{\mu\nu} = -\frac{2\alpha\gamma}{\pi} \exp\left(-\frac{k_\perp^2}{2\gamma}\right) \int_0^1 dx \frac{k^2 x(1-x)}{[-k^2 x(1-x) + m^2]} \left(g_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} \right) - \frac{\alpha\gamma}{\pi} \exp\left(-\frac{k_\perp^2}{2\gamma}\right) g_{\mu\nu}.$$

Последнее слагаемое здесь должно быть отброшено («вычтено») как независящее от импульсов в (0,3), и, таким образом, поляризационный оператор равен

$$P(k) = \exp\left(-\frac{k_\perp^2}{2\gamma}\right) P(k^2), \quad P(k^2) = -\frac{2\alpha\gamma}{\pi} k^2 \int_0^1 \frac{dx x(1-x)}{[-k^2 x(1-x) + m^2]}. \quad (13)$$

Интегрирование по x приводит к следующему результату [7]:

$$P(k^2) = \frac{2\alpha\gamma}{\pi} \left[1 - \frac{2}{\sqrt{\Delta}} \ln \frac{\sqrt{\Delta} - k^2/m^2}{\sqrt{\Delta} + k^2/m^2} \right], \quad \Delta = \left(\frac{k^2}{m^2} \right)^2 - 4 \left(\frac{k^2}{m^2} \right), \quad k^2 < 0. \quad (14)$$

Вычисляя поправку к потенциалу в случае «b» (9), подставляем значение $P(k)$ (13), (14) и переходим к цилиндрическим координатам:

$$\delta_b \phi = -\frac{4\pi(Ze)}{2(2\pi)^3} \int P(-k_3^2) \frac{\exp \left[i(k_\perp r_\perp \cos \varphi + k_3 z) - \frac{k_\perp^2}{2\gamma} \right]}{(k_\perp^2 + k_3^2)^2} d\varphi dk_\perp^2 dk_3. \quad (15)$$

Интегрируя по углу, находим

$$\delta_b \phi = -\frac{(Ze)}{(2\pi)} \int \frac{\exp \left(ik_3 z - \frac{k_\perp^2}{2\gamma} \right) J_0(k_\perp r_\perp) P(-k_3^2)}{(k_\perp^2 + k_3^2)^2} dk_\perp^2 dk_3.$$

Очевидно, что $(k_\perp^2)_{\text{eff}} \sim (k_3^2)_{\text{eff}}$, и поскольку (см. далее формулу (16) и комментарии) $(k_3^2)_{\text{eff}} \ll \gamma$, то второе слагаемое в экспоненте можно опустить. Таким образом,

$$\delta_b \phi = -\frac{(Ze)}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dk_3 e^{ik_3 z} P(-k_3^2) \int_0^{\infty} \frac{k_\perp dk_\perp J_0(k_\perp r_\perp)}{(k_\perp^2 + k_3^2)^2}.$$

Интеграл по $dk_\perp$ можно взять с использованием соотношения 6.532.4 [4], применяя операцию дифференцирования по параметру. Выполняя также элементарное преобразование интеграла по dk_3 , получаем

$$\delta_b \phi = \frac{(Ze)}{\pi} r_\perp \int_0^{\infty} dk_3 \frac{\cos(k_3 z) P(-k_3^2)}{k_3} K_0'(r_\perp k_3), \quad (16)$$

где производная K_0' берется по аргументу.

В силу сделанного предположения $(k_3^2)_{\text{eff}} \ll \gamma$ выражение (16) справедливо в области значений $r_\perp \gg 1/\sqrt{\gamma}$. Если также считать $r_\perp \gg \lambda_c$, то $(k_3^2)_{\text{eff}} \ll m^2$ и (см. (13), (14)) $P(-k_3^2) \approx \frac{\alpha\gamma k_3^2}{3\pi m^2}$, после чего находим, интегрируя по частям:

$$\delta_b \phi = \frac{\alpha\gamma(Ze)}{3\pi^2 m^2} \int_0^{\infty} dk_3 \left\{ -\cos(k_3 z) K_0(r_\perp k_3) + z \sin(k_3 z) k_3 K_0(r_\perp k_3) \right\}.$$

Используя интеграл 6.671.14 [4], а также значение его производной по параметру, находим для рассмотренных значений $r_\perp$:

$$\delta_b \phi = -\frac{\alpha\gamma(Ze)}{6\pi m^2} \frac{r_\perp^2}{(r_\perp^2 + z^2)^{3/2}}.$$

В этой формуле нельзя перейти к одномерному случаю $r_\perp = 0$ в силу принятых условий, а для этого следует положить $r_\perp = 0$ в исходной формуле (15):

$$\delta_b \phi \approx -\frac{4\pi(Ze)}{2(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{\infty} dk_3 e^{ik_3 z} P(-k_3^2) \int_0^{\infty} \frac{\exp \left(-\frac{k_\perp^2}{2\gamma} \right)}{(k_\perp^2 + k_3^2)^2} dk_\perp^2,$$

где мы проинтегрировали по $d\phi$ (что сводится к умножению на 2π). Поскольку $(k_3^2)_{\text{eff}} \sim m^2$ (см. далее (17), (18)), то $(k_1^2)_{\text{eff}} \sim (k_3^2)_{\text{eff}} \sim m^2 \ll \gamma$, и экспоненту во втором интеграле можно опустить, что дает

$$\delta_b \phi = -\frac{4\pi(Ze)}{2(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk_3 e^{ik_3 z}}{k_3^2} P(-k_3^2). \quad (17)$$

Вводя обозначения $x = \frac{k_3}{m}$, $a = \frac{z}{\lambda_C}$, получаем с использованием (14)

$$\delta_b \phi = -\frac{2(Ze)\alpha}{\pi^2 \lambda_C} \left(\frac{B}{B_0} \right) \int_0^{\infty} dx \cos(ax) D(x^2), \quad D(x^2) = \frac{1}{x^2} \left\{ 1 - \frac{2}{\sqrt{x^2(x^2+4)}} \ln \frac{\sqrt{x^2(x^2+4)+x^2}}{\sqrt{x^2(x^2+4)-x^2}} \right\}. \quad (18)$$

Заметим, что в интегралах (17), (18) нет нужды деформировать контур интегрирования с переходом к $\text{Im}P$, как это делается в четырехмерном случае [6], поскольку в двумерном подпространстве выражение P сходится и конечно.

Из-за сходимости интеграла на $x \sim 1$ при $a \ll 1$ можно опустить $\cos(ax)$ в интеграле (18) и $\delta_b \phi$, как и в случае «а», не зависит от координат:

$$\delta_b \phi \approx -\frac{2(Ze)\alpha}{\pi^2 \lambda_C} \left(\frac{B}{B_0} \right) J, \quad J = \int_0^{\infty} dx D(x^2) \approx 0,617.$$

В интересующем нас случае $a \gg 1$ основной вклад в интеграл будет в области $0 \leq x \leq 1$, так что

$$\delta_b \phi \approx -\frac{2(Ze)\alpha}{\pi^2 \lambda_C} \left(\frac{B}{B_0} \right) \int_0^1 dx \cos(ax) D(x^2).$$

Этот интеграл можно оценить следующим образом. Представим $D(x^2)$ в виде ряда

$$D(x^2) = \sum_{k=0}^{\infty} C_k (x^2)^k. \quad (19)$$

Интеграл от отдельного члена ряда равен

$$C_k \int_0^1 dx \cos(ax) (x^2)^k = C_k \frac{1}{a^{2k+1}} \int_0^a dy \cos y (y^2)^k \approx C_k \left\{ \frac{\sin a}{a} - \frac{2k}{a^{2k+1}} \int_0^a dy \sin y \cdot y^{2k-1} + \dots \right\},$$

причем каждый последующий член ряда в a раз меньше предыдущего.

Оставляя лишь главный (первый) член ряда и учитывая, что, согласно (19),

$$\sum_{k=0}^{\infty} C_k = D(1) = 0,14, \text{ получаем в случае } a \gg 1$$

$$\delta_b \phi \approx -\frac{2(Ze)\alpha}{\pi^2 \lambda_C} D(1) \left(\frac{B}{B_0} \right) \frac{\sin\left(\frac{z}{\lambda_C}\right)}{\left(\frac{z}{\lambda_C}\right)}. \quad (20)$$

Решить одномерное уравнение Шредингера с такой поправкой к потенциалу, разумеется, невозможно. Но можно оценить поправку к энергии δE по теории возмущений:

$$\delta E_n = \int_{-\infty}^{\infty} dz (-e\delta_b)\phi(z)\Psi_n^2,$$

где Ψ_n определяется формулами (2). После простых преобразований имеем

$$\delta E_n = \frac{2n\alpha D(1)\left(\frac{B}{B_0}\right)}{\pi^2} |E_n| \int_0^\infty dt e^{-t} t \Phi^2(1-n, 2; t) \sin(bt), \quad b = \frac{n}{2Z\alpha}, \quad (21)$$

где E_n – энергия невозмущенного состояния (3).

Для вычисления этого интеграла достаточно в формуле (4) положить $\lambda=1, s=1-ib$ и взять мнимую часть полученного выражения.

С учетом значения $b \sim 1/\alpha \gg 1$ результат имеет вид

$$\delta E_n \approx \frac{32(Z\alpha)^3 \alpha D(1)\left(\frac{B}{B_0}\right) |E_n|}{\pi^2 n} = \frac{16(Z\alpha)^3 \alpha D(1)\left(\frac{B}{B_0}\right) (Ze^2)^2 m}{\pi^2 n^3}. \quad (22)$$

Следует упомянуть еще о двух видах поправок к кулоновским уровням энергии: 1) поправка на собственную энергию электрона, 2) зависящая от магнитного поля поправка к уровням (3).

В случае $B \gg B_0$ (диапазон (b)) обе поправки логарифмически зависят от (B/B_0) [3, 8], в то время как найденная поправка (22) – линейно. Оценки показывают, что при $B > (\sim) 10^{16}$ Гс поправка (22) доминирует.

В узком диапазоне (a) значений поля сделать оценки вкладов «1», «2» не удалось.

3. Излучение одномерного водородоподобного атома

Вероятность дипольного излучения в единицу времени при переходе $n \rightarrow n'$ равна [9]

$$A_{mm'} = \frac{4}{3} \frac{e^2 \omega^3}{c^3 \hbar} (z)_{n'n'}^2, \quad \omega = (E_n - E_{n'})/\hbar, \quad (23)$$

где $(z)_{n'n'} = \int_{-\infty}^{\infty} dz z \Psi_{n'}^* \Psi_n$.

Очевидно, $(z)_{n'n'} \neq 0$ лишь для переходов чет. $\leftrightarrow$ нечет.

Тогда в соответствии с определением (2) легко получить, что

$$(z)_{n'n'} = \frac{Z_0}{4Z} \frac{n^{5/2}}{n'^{3/2}} J_{mm'}; \quad (24)$$

$$J_{mm'} = \int_0^\infty dt t^3 e^{-s_\lambda t} \Phi(1-n, 2; t) \Phi(1-n', 2; \lambda t), \quad s_\lambda = \frac{1}{2}(1+\lambda), \quad \lambda = n/n'. \quad (25)$$

Из сравнения с формулой (4) видно, что $J_{mm'} = \frac{d^2}{ds^2} (AF) \Big|_{s=s_\lambda}$. После вычислений для матричного элемента получаем

$$z_{n'n} = 8(-1)^{n'} \left(\frac{Z_0}{Z}\right) \frac{(nn')^{5/2}}{(n-n')^4} \left(\frac{n-n'}{n+n'}\right)^{n+n'} \tilde{F}, \quad (26)$$

$$\tilde{F} = \left(\frac{2nn'}{n+n'} - 1\right) F(1-n, 1-n'; 2; -x) + xF', \quad x = \frac{4nn'}{(n-n')^2},$$

а производная F' берется по аргументу.

Для вероятности (23) с учетом значения ω находим

$$\begin{cases} A_{mm'} = \frac{32}{3} \alpha (Z\alpha)^4 \left(\frac{c}{\lambda c}\right) J(n, n'), \\ J(n, n') = \left(\frac{n-n'}{n+n'}\right)^{2(n+n')} \frac{(n-n')^{-5} (n+n')^3}{(nn')} \tilde{F}^2. \end{cases} \quad (27)$$

Соответственно вероятность перехода с уровня « n » на все «нижележащие» кулоновские уровни равна

$$A_n = \frac{32}{3} \alpha (Z\alpha)^4 \left(\frac{c}{\lambda_C} \right) J(n), \quad J(n) = \sum_{n'=1}^{n-1} J(n, n'). \quad (28)$$

Время жизни в возбужденном состоянии $\tau_n = [A_n]^{-1}$. Значения функции $J(n)$ для нескольких « n » приведены в табл. 1. Интенсивность излучения при переходе $n \rightarrow n'$ равна

$$W_{nn'} = N_n \hbar \omega A_{nn'},$$

где N_n – число атомов в состоянии « n ».

Таблица 1

n	2	3	4	5	6
$J(n)$	$2 \cdot 10^{-3}$	$8 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$	10^{-4}

С учетом формулы (27) и значения ω находим

$$W_{nn'} = \frac{16}{3} N_n \alpha (Z\alpha)^6 (mc^2) \left(\frac{c}{\lambda_C} \right) I(n, n'), \quad I(n, n') = \left(\frac{n-n'}{n+n'} \right)^{2(n+n'-2)} \frac{\tilde{F}^2}{(nn')^3}. \quad (29)$$

Полная интенсивность при переходах на все кулоновские уровни $n' < n$ равна

$$W_n = \frac{16}{3} N_n \alpha (Z\alpha)^6 (mc^2) \left(\frac{c}{\lambda_C} \right) I(n), \quad I(n) = \sum_{n'=1}^{n-1} I(n, n'). \quad (30)$$

Значения функции $I(n)$ приведены в табл. 2.

Таблица 2

n	2	3	4	5	6
$I(n)$	10^{-3}	$6 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-4}$	10^{-4}	10^{-4}

Заключение

Вспомогательный к основному материалу статьи расчет поляризационного оператора фотона в рамках развиваемой нами двумерно-ковариантной техники расчета фейнмановских диаграмм в сильном магнитном поле продемонстрировал логическую замкнутость теории, выражающуюся в отсутствии расходимостей.

Из табл. 1 и 2 следует, что вероятности и интенсивности переходов $n \rightarrow n' (n > 2)$ малы по сравнению с характеристиками перехода $2 \rightarrow 1$, который, таким образом, доминирует в спектре излучения.

Наличие в спектре излучения лишь головной линии серии Лаймана $2 \rightarrow 1$ и фактическое отсутствие остальных будет указывать на наличие магнитного поля с величиной (1) в области формирования излучения (магнитные нейтронные звезды и белые карлики). Более детальное суждение можно сделать при анализе относительных сдвигов частот линии $2 \rightarrow 1$, обусловленных радиационными поправками в случаях « a » и « b » (5) и следующих из формул (8), (22) соответственно:

$$\left(\frac{\Delta\omega}{\omega} \right)_a \approx \frac{4\alpha}{45\pi} \left(\frac{B}{B_0} \right)^2, \quad \left(\frac{|\Delta\omega|}{\omega} \right)_b = \frac{|\delta E_2 - \delta E_1|}{E_2 - E_1} \approx \frac{112}{3\pi^2} (Z\alpha)^3 \alpha D(1) \left(\frac{B}{B_0} \right). \quad (31)$$

Обнаружение спектральных сдвигов (31) в излучении астрофизических объектов будет свидетельствовать о наличии магнитных полей в диапазоне « a » или « b » (5).

Автор выражает благодарность А.П. Сухину, а также Р.В. Сачкову и П.Д. Караваяву за техническую помощь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Скобелев В.В. // ЖЭТФ. – 2001. – Т. 120. – С. 786.
2. Скобелев В.В. // ЯФ. – 2001. – Т. 64. – С. 1557.
3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. – М.: Наука, 1974. – С. 150, 527.
4. Градштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. – М.: Наука, 1971. – С. 692, 746, 875.
5. Loskutov Yu.M. and Skobelev V.V. // Phys. Lett. – 1971. – V. 36A. – P. 405.
6. Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Релятивистская квантовая теория. Ч. 2. – М.: Наука, 1971. – С. 64.
7. Скобелев В.В. // Изв. вузов. Физика. – 1975. – № 10. – С. 142.
8. Janović V. // Phys. Rev. – 1969. – V. 187. – P. 2275.
9. Соколов А.А., Лоскутов Ю.М., Тернов И.М. Квантовая механика. – М.: Учпедгиз, 1962. – С. 165.

Московский государственный индустриальный университет, г. Москва, Россия Поступила в редакцию 13.07.09.
E-mail: v.skobelev@inbox.ru