

Московский
государственный
университет

Всесоюзное
орнитологическое
общество

ОРНИТОЛОГИЯ

ВЫПУСК 23

Издание основано в 1958 г.

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1988

были добыты. Вместе с тем Н. И. Яблонский (1902) указывает, что лесной дупель водится повсюду в горах Южного Алтая, и упоминает, что 10/IX 1900 г. в верховьях р. Курчум добыл 4 экз. Во всяком случае пребывание лесного дупеля в горах севернее оз. Маркалоо не исключено, но требует фактического подтверждения, тем более что он гнездится в соседней Бухтарминской долине.

Н. Н. Березовиков

Птицы из Красной книги СССР на территории Зауральской лесостепи. В апреле—октябре 1982—1984 гг. в долине Тобола и Тоболо-Ишимском междуречье маршрутными учетами обследована площадь свыше 1000 км². Учеты проводились раз в 2 недели. Протяженность маршрута по 5 км в каждом из 59 ландшафтных урочищ; всего пройдено 3 тыс. км. В северной лесостепи работали в окрестностях поселков Старо-Шадрино (Упоровский р-н) и Южно-Дубровное (Армизонский р-н) Тюменской обл., в южной — в окрестностях г. Макушино и с. Белое (Куртамышский р-н) Курганской обл.

Кудрявый пеликан (*Pelecanus crispus*). На плёсах и мелководьях оз. Черного в мае—августе пеликан был обычен (до 7 особей/км²). В августе 1983 г. здесь встречали скопления до 17 особей.

Тундряный лебедь (*Cygnus bewickii*). Встречается в лесостепном Зауралье только на пролете. Одна птица летела в стае лебедей-кликунов на высоте 1500 м в южном направлении 6/X 1982 г.; 4 тундряных лебедя пролетели 7/X 1984 г. также в стае кликунов на высоте 400 м на юг. На крупном соленом оз. Елнач в южной лесостепи видели 4 отдыхающих на воде особей 5/V 1984 г.

Краснозобая казарка (*Rufibrenta ruficollis*). 3 птицы встречались нам на пойменных полях 4/X 1982 г. и 1 — на крупном пресном озере 8/X 1984 г.

Савка (*Oxyura leucocephala*). 1—3 птицы (5 встреч) летом 1984 г. (с 7/VI по 13/VIII) отмечались на водораздельных крупных пресных и соленых озерах южной лесостепи. Характер пребывания не выяснен.

Скопа (*Pandion haliaetus*). Одна птица встречена на р. Тобол 10/IX 1982 г., 2 одиночные птицы летели в южном направлении в районе оз. Черного 7/IX 1983 г. на высоте 80 и 100 м.

Орлан-белохвост (*Haliaeetus albicilla*). В долине Тобола отмечено 5 птиц в сентябре 1982 г. На междуречье орлана видели в сентябре 1983 и 1984 гг. 6 раз. В долине Тобола он, по-видимому, гнездится: в 1982 и 1984 гг. этот орлан 5 раз встречался летом в березово-сосновых лесах и их окрестностях.

Степной орел (*Aquila nipalensis*). В южной лесостепи (окрестности г. Макушино) встречен 1/IX 1984 г. над небольшим озером сплавинного типа зарастания и 11/IX 1984 г. — на остепненных лугах-выпасах.

Беркут (*Aquila chrysaetos*). В сентябре 1984 г. у с. Белого осмотрено пустое гнездо. По словам местных жителей, оно заселяется много лет. Здесь же 7 раз в течение лета наблюдали беркута на маршрутах. Не исключена возможность гнездования в северной подзоне, так как его видели там летом (одна встреча). На междуречье 27/IX 1984 г. отмечали одиночного беркута, летящего на юго-запад на высоте 400 м.

Сапсан (*Falco peregrinus*). Одну птицу видели в долине Тобола 22/VII 1982 г. летящей над крупным зарастающим оз. Веденяцким, другую — 25/V 1983 г. — в районе оз. Черного.

Азиатский бекасовидный веретенник (*Limnodromus semipalmatus*). Две птицы пролетели 12/VI 1982 г. над пойменными закустаренными болотами.

Т. К. Блинова, В. Н. Блинов

К авифауне Ульяновской обл. Довольно полный список птиц Ульяновской обл. опубликован в приложении к книге «Птицы Волжско-Камского края. Воробьиные» (1978). Ниже приводятся материалы, дополняющие этот список, а также новые сведения о некоторых редких видах.

Большая белая цапля (*Egretta alba*). Держалась 27/IX 1984 г. вместе с серыми цаплями на прудах Ульяновского нерестово-выростного хозяйства (УНВХ) близ с. Рязаново Мелекесского района. Кроме того, мертвая птица найдена на пруду около с. Каргино Вешкаймского района в начале сентября 1984 г.

Лебедь-шипун (*Cygnus olor*). 11/VI 1981 г. в Барышском районе на р. Барыш браконьерами убиты 2 шипуна. Один из них был окольцован 17/VII 1980 г. в Аскании-Нова (кольцо № А-157256). В октябре 1983 г. на прудах УНВХ мы встретили 2 пары взрослых лебедей-шипун с летними выводками, состоящими из 5 и 7 молодых. По словам рыбководов, в 1980—1982 гг. здесь гнездилась 1 пара, а в 1983 г. кроме 2 гнездящихся пар на этих прудах и труднодоступной старице р. Бирли держалось 18 неразмножавшихся птиц. В 1984 г. нами там же были найдены 2 гнездящиеся пары (вывели 7 и 4 молодых) и 9 негнездящихся особей. По сведениям рыбоведа В. Бухарского, количество холостых достигало 22, а выводков было 3.

Огарь (*Casarca ferruginea*). 27/VI 1979 г. в Старомайском заливе Куйбышевского водохранилища (у пос. Старая Майна) был замечен выводок огарей из 5—7 пу-